

Эконометрика. Лекция 3

10 декабря 2014 г.

Лекция 3

- Прогнозирование
- Выбор “наилучшей” модели

Прогнозирование

Модель: $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \varepsilon_i$

Точечный прогноз: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_i + \hat{\beta}_3 z_i$

Интервальное прогнозирование

- Доверительный интервал для $E(y_i|x_i, z_i)$:

$$E(y_i|x_i, z_i) = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i$$

- Предиктивный интервал для y_i :

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \varepsilon_i$$

Две ошибки прогноза и их дисперсии

Ошибка при прогнозировании условного среднего $E(y_i|X)$:

$$\text{Var}(\hat{y}_i - E(y_i|X)|X) = \text{Var}(\hat{y}_i|X) = \text{Var}(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_i + \hat{\beta}_3 z_i|X)$$

Ошибка при предсказании конкретного значения $y_i = E(y_i|X) + \varepsilon_i$:

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{y}_i - y_i|X)|X) &= \text{Var}(\hat{y}_i - E(y_i|X) - \varepsilon_i|X) = \text{Var}(\hat{y}_i - \varepsilon_i|X) = \\ &= \text{Var}(\hat{y}_i|X) + \text{Var}(\varepsilon_i|X) = \text{Var}(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_i + \hat{\beta}_3 z_i|X) + \text{Var}(\varepsilon_i|X)\end{aligned}$$

Оценка дисперсии

- $Var(\hat{y}_i|X)$, $Var(\epsilon_i|X)$ неизвестны, зависят от σ^2
- $\widehat{Var}(\hat{y}_i|X)$, $\widehat{Var}(\epsilon_i|X)$ известны
- Используем стандартные ошибки: $se(\hat{y}_i) = \sqrt{\widehat{Var}(\hat{y}_i|X)}$

Доверительный интервал:

- Асимптотический: $\frac{\hat{y}_i - E(y_i|X)}{se(\hat{y}_i)} \rightarrow N(0, 1)$

$$E(y_i|X) \in [\hat{y}_i - z_{cr} se(\hat{y}_i); \hat{y}_i + z_{cr} se(\hat{y}_i)]$$

- При предположении о нормальности: $\frac{\hat{y}_i - E(y_i|X)}{se(\hat{y}_i)} \sim t_{n-k}$

$$E(y_i|X) \in [\hat{y}_i - t_{cr} se(\hat{y}_i); \hat{y}_i + t_{cr} se(\hat{y}_i)]$$

Предиктивный интервал

- Асимптотический: $\frac{\hat{y}_i - y_i}{se(\hat{y}_i - \varepsilon_i)} \rightarrow N(0, 1)$

$$y_i \in [\hat{y}_i - z_{cr} se(\hat{y}_i - \varepsilon_i); \hat{y}_i + z_{cr} se(\hat{y}_i - \varepsilon_i)]$$

- При предположении о нормальности: $\frac{\hat{y}_i - y_i}{se(\hat{y}_i - \varepsilon_i)} \sim t_{n-k}$

$$y_i \in [\hat{y}_i - t_{cr} se(\hat{y}_i - \varepsilon_i); \hat{y}_i + t_{cr} se(\hat{y}_i - \varepsilon_i)]$$

Чудо-доска. Пример вычислений.

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	8.53539	0.05183	164.68	<2e-16 ***
log(carat)	1.74685	0.07505	23.27	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.2771 on 38 degrees of freedom

vcov(mod)

	(Intercept)	log(carat)
(Intercept)	0.002686470	0.002078281
log(carat)	0.002078281	0.005632675

Четыре модели:

- $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \varepsilon_i$
- $\ln(y_i) = \beta_1 + \beta_2 \ln(x_i) + \varepsilon_i$
- $\ln(y_i) = \beta_1 + \beta_2 x_i + \varepsilon_i$
- $y_i = \beta_1 + \beta_2 \ln(x_i) + \varepsilon_i$

Чудо-доска. Интерпретация-вывод

Итого: две популярные версии

- $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \varepsilon_i$. С ростом x на единицу y растет на β единиц.
- $\ln(y_i) = \beta_1 + \beta_2 \ln(x_i) + \varepsilon_i$. С ростом x на один процент y растет на β процентов.

Полулогарифмические модели

- $\ln(y_i) = \beta_1 + \beta_2 x_i + \varepsilon_i$. С ростом x на единицу y растет на 100β процентов.
- $y_i = \beta_1 + \beta_2 \ln(x_i) + \varepsilon_i$. С ростом x на один процент y растет на 0.01β единиц.

Дамми-переменные

- Объясняющая переменная, принимающая значение 0 или 1, называется дамми-переменной (dummy variable)
- Например, переменная *male_i* равна 1 для мужчин и 0 для женщин.

С помощью дамми-переменных можно описывать разные части выборки

Пример 1. Базовая модель.

$$wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \varepsilon_i$$

Зарплата мужчин и женщин в среднем одинаковая при равном опыте и образовании

Пример 2.

$$wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \beta_4 male_i + \varepsilon_i$$

Для мужчин: $wage_i = (\beta_1 + \beta_4) + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \varepsilon_i$

Для женщин: $wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \varepsilon_i$

Пример 3.

$$wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \beta_4 male_i + \beta_5 male_i exper_i + \varepsilon_i$$

Для мужчин: $wage_i = (\beta_1 + \beta_4) + (\beta_2 + \beta_5) exper_i + \beta_3 educ_i + \varepsilon_i$

Для женщин: $wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \varepsilon_i$

Пример 4.

$$wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \beta_4 male_i + \beta_5 male_i educ_i + \varepsilon_i$$

Для мужчин: $wage_i = (\beta_1 + \beta_4) + \beta_2 exper_i + (\beta_3 + \beta_5) educ_i + \varepsilon_i$

Для женщин: $wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \varepsilon_i$

Пример 5.

$$wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \beta_4 male_i + \beta_5 male_i educ_i + \beta_6 male_i exper_i + \varepsilon_i$$

Для мужчин: $wage_i = (\beta_1 + \beta_4) + (\beta_2 + \beta_6) exper_i + (\beta_3 + \beta_5) educ_i + \varepsilon_i$

Для женщин: $wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \varepsilon_i$

Факторная переменная принимает несколько значений

$season_i \in \{ \text{зима} , \text{весна} , \text{лето} , \text{осень} \}$

- 1 Выбираем базовое значение факторной переменной: зима.
- 2 Вводим 3 (четыре сезона минус один базовый) дамми-переменных:

$vesna_i, leto_i, osen_i$

Пример

$$icescream_i = \beta_1 + \beta_2 price_i + \beta_3 vesna_i + \beta_4 leto_i + \beta_5 osen_i + \varepsilon_i$$

Зима: $icescream_i = \beta_1 + \beta_2 price_i + \varepsilon_i$

Весна: $icescream_i = (\beta_1 + \beta_3) + \beta_2 price_i + \varepsilon_i$

Лето: $icescream_i = (\beta_1 + \beta_4) + \beta_2 price_i + \varepsilon_i$

Осень: $icescream_i = (\beta_1 + \beta_5) + \beta_2 price_i + \varepsilon_i$

Частая ошибка!

Включить дамми-переменные на все значения факторной переменной и константу в регрессию. Благородные доны и дуэньи так не поступают!

Пример с ошибкой (!).

$$wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 male_i + \beta_4 female_i + \varepsilon_i$$

Выполнено соотношение $1 = male_i + female_i$.

частая ошибка — нарушение предпосылки

- 8 с вероятностью 1 среди регрессоров нет линейно зависимых
- Синонимы в матричном виде: $\text{rank}(X) = k$ или $\det(X'X) \neq 0$ или $(X'X)^{-1}$ существует

Регрессоры линейной зависимы. Не существует единственных оценок МНК.

Проверка гипотез о нескольких ограничениях сразу

$$wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \beta_4 male_i + \beta_5 male_i educ_i + \varepsilon_i$$

Для мужчин: $wage_i = (\beta_1 + \beta_4) + \beta_2 exper_i + (\beta_3 + \beta_5) educ_i + \varepsilon_i$

Для женщин: $wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \varepsilon_i$

$$H_0 : \begin{cases} \beta_4 = 0 \\ \beta_5 = 0 \end{cases}$$

H_a : хотя бы один коэффициент (β_4 или β_5) отличен от нуля

Проверка гипотезы

- 1 Оценить неограниченную модель (unrestricter, ur)

$$wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \beta_4 male_i + \beta_5 male_i educ_i + \varepsilon_i$$

Посчитать RSS_{UR}

- 2 Оценить ограниченную модель (restricted, r)

$$wage_i = \beta_1 + \beta_2 exper_i + \beta_3 educ_i + \varepsilon_i$$

Посчитать RSS_R

Два подхода:

3.1. Асимптотически:

$$\chi^2 = \frac{RSS_R - RSS_{UR}}{RSS_{UR}/(n - k_{UR})} \rightarrow \chi_r^2$$

3.2. При нормальности ошибок, $\varepsilon_i|X \sim N(0, \sigma^2)$

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_{UR})/r}{RSS_{UR}/(n - k_{UR})} \sim F_{r, n-k_{UR}}$$

r — количество ограничений в H_0

Вывод:

- ❶ Если $F_{obs} > F_{cr}$ или $\chi_{obs}^2 > \chi_{cr}^2$, то H_0 отвергается

Пример у чудо-доски

Примечание.

RSS ограниченной модели всегда больше:

- $RSS_{UR} = \min_{\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots} RSS$
- $RSS_R = \min_{\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots, \hat{\beta}_4=0} RSS$

TSS в моделях равны, т.к. $TSS = \sum (y_i - \bar{y})^2$

Следовательно, $ESS_{UR} > ESS_R$ и $R^2_{UR} > R^2_R$.

Самый простой случай

Модель $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \varepsilon_i$

Гипотеза H_0 : все наши регрессоры абсолютно бесполезны

$$H_0 : \begin{cases} \beta_2 = 0 \\ \beta_3 = 0 \end{cases}$$

Всего $(k - 1)$ ограничение.

Гипотеза о незначимости регрессии.

Чудо-доска: F-статистика для гипотезы о незначимости регрессии

Проверка гипотезы о незначимости регрессии

Модель $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \varepsilon_i$

$$H_0 : \begin{cases} \beta_2 = 0 \\ \beta_3 = 0 \end{cases}$$

$$F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)} \sim F_{k-1, n-k}$$

Чудо-доска. пример вычислений.

Снова БСХС — предпосылки

Если:

- ❶ Истинная зависимость имеет вид $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \varepsilon_i$
 - В матричном виде: $y = X\beta + \varepsilon$
- ❷ С помощью МНК оценивается регрессия y на константу, x_i , z_i
 - В матричном виде: $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$
- ❸ Наблюдений больше, чем оцениваемых коэффициентов β : $n > k$

БСХС — предположения на ε_i :

- ❶ Строгая экзогенность: $E(\varepsilon_i | \text{все регрессоры}) = 0$
 - В матричном виде: $E(\varepsilon_i | X) = 0$
- ❷ Условная гомоскедастичность: $E(\varepsilon_i^2 | \text{все регрессоры}) = \sigma^2$
 - В матричном виде: $E(\varepsilon_i^2 | X) = \sigma^2$
- ❸ $Cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j | X) = 0$ при $i \neq j$

БСХС — предпосылки на регрессоры

- 7 векторы отдельных наблюдений (x_i, z_i, y_i) — независимы и одинаково распределены
- 8 с вероятностью 1 среди регрессоров нет линейно зависимых
- Синонимы в матричном виде: $\text{rank}(X) = k$ или $\det(X'X) \neq 0$ или $(X'X)^{-1}$ существует

БСХС — асимптотические свойства (плюс новое)

При $n \rightarrow \infty$:

- $\hat{\beta}_j \rightarrow \beta_j$ по вероятности
- $\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{se(\hat{\beta}_j)} \rightarrow N(0, 1)$ по распределению
- $\hat{\sigma}^2 \rightarrow \sigma^2$ по вероятности
- новое: $\chi^2 = \frac{RSS_R - RSS_{UR}}{RSS_{UR}/(n - k_{UR})} \rightarrow \chi_r^2$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{RSS}{n - k}$$

БСХС — при нормальности

Если дополнительно известно, что $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$:

- Оценки эффективны среди несмещенных
- $\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{se(\hat{\beta}_j)} | X \sim t_{n-k}, \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{se(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k}$
- $RSS/\sigma^2 | X \sim \chi_{n-k}^2, RSS/\sigma^2 \sim \chi_{n-k}^2$
- новое: $F = \frac{(RSS_R - RSS_{UR})/r}{RSS_{UR}/(n - k_{UR})} | X \sim F_{r, n - k_{UR}}$

Лишние переменные

- Истина: $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \varepsilon_i$
- Оценена регрессия: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_i + \hat{\beta}_3 z_i$
- Потеряна: эффективность

Пропущенные переменные

- Истина: $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \varepsilon_i$
- Оценена регрессия: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_i$
- Всё плохо!

Мораль:

- Если в теории предполагается зависимость от переменной z , то её лучше включить в модель, даже если она не значима.
- Если переменные значимы, то их лучше оставить в модели, даже если теория говорит, что зависимости от них быть не должно.

Увидеть то, чего нет

- Как проверить не пропущены ли переменные, которых нет?
- RESET-тест Рамсея

$$H_0 : y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \varepsilon_i$$

H_a : Есть неизвестные нам пропущенные регрессоры

Алгоритм теста Рамсея:

- 1 Оценить модель: $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \varepsilon_i$

Получить прогнозы \hat{y}_i

- 2 Оценить модель:
$$\hat{y}_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \beta_3 z_i + \gamma_1 \hat{y}_i^2 + \gamma_2 \hat{y}_i^3 + \dots + \gamma_p \hat{y}_i^{p+1} + \varepsilon_i$$
- 3 Посчитать F -статистику проверяющую гипотезу о равенстве всех γ_i нулю.

Рамсей: при верной H_0 и нормальности остатков $F \sim F_{p, n-k-p}$

Пример чудо-доска

Простые показатели качества

① R^2 . Растет с добавлением регрессоров, $R_{ur}^2 > R_r^2$

②
$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{RSS/(n-k)}{TSS/(n-1)} = 1 - \frac{\hat{\sigma}^2}{TSS/(n-1)}$$

Чем больше R_{adj}^2 тем меньше $\hat{\sigma}^2$.

Информационные критерии

Модель плохая если:

- плохо предсказывает (RSS большой)
- сложная (много коэффициентов, большое k)
- ③ Информационные критерии:
 - Акаике $AIC = n \ln(RSS/n) + 2k$
 - Шварца $BIC = n \ln(RSS/n) + \ln(n)k$

- Гипотеза о нескольких ограничениях
- Прогнозирование
- RESET-тест Рамсея

Далее: о неприятностях :)

- пример с логарифмированием цен бриллиантов
- четыре графика (чтобы понять лог-лог лог-лин лин-лин лин-лог)
- пример с включением лишних дамми-переменных
- Больше графиков
- рассеяния и очень много наблюдений
- количественная-качественная
- много качественных
- фасетки
- маленькое исследование в R
- `waldtest()`
- RESET-тест