

Лабораторная работа № 6

Задача об эпидемии

Хамдамова Айжана

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Случай $I(0) \leq I^*$	8
4.2	Случай $I(0) > I^*$	9
5	Выводы	11

Список иллюстраций

4.1	Задание начальных значений	8
4.2	Решение систему ДУ	8
4.3	Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп	9
4.4	Вторая модель	10
4.5	Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп	10

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать модель SIR (задача об эпидемии)

2 Задание

Вариант 40

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 12900$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 190$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 59$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) \leq I^*$; 2) если $I(0) > I^*$.

3 Теоретическое введение

Компартментальные модели являются очень общим методом моделирования. Они часто применяются к математическому моделированию инфекционных заболеваний. Население распределяется по отделениям с помощью меток – например, S, I, или R, (Susceptible, Infectious, or Recovered). Люди могут прогресс между отсеками. Порядок расположения меток обычно показывает структуру потоков между компартментами; например, SEIS означает восприимчивый, подверженный воздействию, инфекционный, затем снова восприимчивый[[wiki_sir?](#)].

Зарождение таких моделей относится к началу 20 века, важными работами которого являются работы Росса в 1916 году Росс и Хадсон в 1917 году, Кермак и Маккендрик в 1927 г., и Кендалл в 1956 году. Модель Рид–Мороз также был важным и широко упускаемым из виду предком современных подходов к эпидемиологическому моделированию.

Модели пытаются предсказать такие вещи, как распространение болезни, или общее число инфицированных, или продолжительность эпидемии, а также оценить различные эпидемиологические параметры, такие как репродуктивное число. Такие модели могут показать, насколько вмешательства общественного здравоохранения могут повлиять на исход эпидемии, например, на то, какой метод является наиболее эффективным для выпуска ограниченного количества вакцин в данной популяции.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Случай $I(0) \leq I^*$

Рассмотрим случай, когда число заболевших не превышает критического значения I^* , то есть считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Зададим систему дифференциальных уравнений, описывающих нашу модель, а также начальные условия данные в задаче.(рис. [4.1])

Случай I

```
2]: using DifferentialEquations, Plots

# Исходные данные
N = 12900
I0 = 190
R0 = 59
S0 = N - I0 - R0
u0 = [S0, I0, R0]
p = [0.1, 0.05] # b - коэффициент заражения, c - коэффициент выздоровления
tspan = (0.0, 200.0)

2]: (0.0, 200.0)
```

Рис. 4.1: Задание начальных значений

Используя библиотеки DifferentialEquations.jl и Plots.jl решим систему дифференциальных уравнений и построим соответствующий график.(рис. [4.2])

```
[13]: function sir_isolated(u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (b, c) = p
    dS = 0 # Нет новых заражений
    dI = -c * I # Только выздоравливают
    dR = c * I
    return [dS, dI, dR]
end

probl = ODEProblem(sir_isolated, u0, tspan, p)
sol1 = solve(probl, Tsit5(), saveat=0.1)
plot(sol1, label=["S" "I" "R"], title="I(0) ≤ I*", xlabel="Время", ylabel="Число людей")
```

Рис. 4.2: Решение систему ДУ

В результате получаем следующий график динамики изменения числа людей в каждой из трех групп (рис. [4.3]). Видно, что численность здоровых людей (S) не меняется, поскольку мы рассматриваем случай, когда все больные изолированы, то есть здоровые не заражаются. Число больных уменьшается, а число людей с иммунитетом увеличивается.




Рис. 4.3: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

4.2 Случай $I(0) > I^*$

Рассмотрим случай, когда число заболевших превышает критическое значения I^* , то есть считаем, что инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

Зададим систему дифференциальных уравнений, описывающих нашу модель, а также начальные условия данные в задаче.(рис. [4.4])

Используя библиотеки `DifferentialEquations.jl` и `Plots.jl` решим систему дифференциальных уравнений и построим соответствующий график.

Случай II

```
4]: function sir_spread(u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (b, c) = p
    N = S + I + R
    dS = -(b * S * I) / N
    dI = (b * S * I) / N - c * I
    dR = c * I
    return [dS, dI, dR]
end

prob2 = ODEProblem(sir_spread, u0, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat=0.1)
plot(sol2, label=["S" "I" "R"], title="I(0) > I*", xlabel="Время", ylabel="Число людей")
```

Рис. 4.4: Вторая модель

В результате получаем следующий график динамики изменения числа людей в каждой из трех групп (рис. [4.5]). Видно, что численность здоровых людей (S) уменьшается, поскольку мы рассматриваем случай, когда больные заражают здоровых. Число больных людей сначала увеличивается, а затем уменьшается, поскольку люди успевают выздоравливать и приобретать иммунитет (это зависит от заданных коэффициентов заболеваемости и выздоровления).




Рис. 4.5: Динамика изменения числа людей в каждой из трех групп

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я исследовала модель SIR.