## 国家市场监督管理总局

# 特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20245001

#### 特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品

#### 爱他美亲熠

## **Aptamil ESSENSISPHP**

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】乳糖、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、棕榈油、葵花籽油、椰子油、低芥酸菜籽油、醋酸视黄酯、棕榈酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、dl-α-生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸铜、磷酸氢镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸三钙、氯化钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、多聚果糖、5'单磷酸胞苷、5'单磷酸腺苷、5',一肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、柠檬酸脂肪酸甘油酯、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯、柠檬酸、短双歧杆菌 M-16V。

#### 【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2022	271	100
蛋白质 <b>(g)</b>	10. 7	1. 43	0. 53
脂肪 <b>(g)</b>	24. 4	3. 27	1. 21
亚油酸(g)	2. 76	0. 37	0.14
α-亚麻酸(mg)	316	42	15. 6
碳水化合物(g)	52. 2	7. 0	2. 58
维生素 A(μg RE)	361	48	17. 9
维生素 D(μg)	6. 3	0.84	0.31

维生素 E(mg α-	5.8	0.78	0. 29
TE)			
维生素 K <sub>l</sub> (μg)	26	3. 48	1. 29
维生素 B <sub>l</sub> (μg)	371	50	18. 3
维生素 B <sub>2</sub> (μg)	749	100	37
维生素 B <sub>6</sub> (μg)	216	29	10. 7
维生素 B <sub>12</sub> (μg)	0.64	0. 086	0. 032
烟酸(µg)	2240	300	111
叶酸(μg)	64	8. 6	3. 17
泛酸(µg)	2518	337	125
维生素 C(mg)	66	8.8	3. 26
生物素(μg)	14. 3	1.92	0.71
钠(mg)	182	24	9. 0
钾 <b>(mg)</b>	519	70	26
铜(µg)	316	42	15. 6
镁(mg)	44	5. 9	2. 18
铁(mg)	3. 76	0. 50	0. 19
锌 <b>(mg)</b>	3. 54	0. 47	0. 18
锰(µg)	31	4. 15	1. 53
钙(mg)	389	52	19. 2
磷(mg)	281	38	13. 9
碘(µg)	72	9. 6	3. 56
氯(mg)	302	40	14. 9
硒(μg)	12. 2	1.63	0.60
胆碱 <b>(mg)</b>	91	12. 2	4. 50
肌醇 <b>(mg)</b>	32	4. 29	1. 58
牛磺酸(mg)	27	3. 62	1.34
左旋肉碱(mg)	10. 4	1. 39	0. 51

二十二碳六烯酸	69	9. 2	3. 41
(mg)			
二十二碳六烯酸	0.30	0.30	0.30
(%总脂肪酸)			
二十碳四烯酸(mg)	97	13. 0	4.80
二十碳四烯酸	0.42	0.42	0. 42
(%总脂肪酸)			
低聚半乳糖(g)	5. 4	0.72	0. 27
多聚果糖(g)	0.60	0. 080	0. 030
核苷酸(mg)	16. 8	2. 25	0.83

**备注:** 每 100ml 标准冲调液由 13.4g(约3平勺)加 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品为特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品,乳蛋白经加工分解成小分子乳蛋白、肽段和氨基酸。本品添加了低聚半乳糖、多聚果糖、短双歧杆菌M-16V,标准冲调液能量密度约为65kcal/100mL。

#### 【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

**【食用方法和食用量】**口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师的指导下,根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法: 配制本品时应使用罐内所附的专用量匙,1 平匙本品(约 4.47g)加 30mL 温开水(约 40  $^{\circ}$   $^{\circ}$  )冲调得到标准冲调液。

## 【净含量和规格】900g

## 【保质期】21 个月

**【贮存条件**】请将本品存放在阴凉干燥通风处,勿置于冰箱内。每次使用完毕后,请盖紧罐盖。开罐后,请务必在一个月内食用完毕。

## 【警示说明和注意事项】

- 1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2. 不适用于非目标人群使用。
- 3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4. 本品可作为单一营养来源满足 6 月龄以下目标人群的营养需求。6 月龄以上特殊医学状

况婴儿食用本品时,应配合添加辅助食品。

- 5. 不恰当的冲调不利于婴儿的健康。每次请只准备一次的喂量,喂完后多余的奶液请丢弃
- , 勿留到下次食用。
- 6. 本品标准冲调液的渗透压约为 360m0smo1/kg, 供使用参考。

**注**: 企业上市产品的标签、说明书,还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。