

附件 2

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20235001

特殊医学用途婴儿乳蛋白深度水解配方食品

纽太特

Pepti Junior

【产品类别】乳蛋白深度水解配方

【配料表】葡萄糖浆、浓缩乳清蛋白粉、中链甘油三酯、低芥酸菜籽油、葵花籽油、棕榈油、醋酸维生素 A、棕榈酸维生素 A、维生素 D₃、dl- α -生育酚、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、金枪鱼油、花生四烯酸油脂（发酵法）、5'-单磷酸胞苷、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、抗坏血酸棕榈酸酯、磷脂、柠檬酸、柠檬酸脂肪酸甘油酯。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2123	280.24	100
蛋白质(g)	13.60	1.80	0.64
脂肪(g)	26.60	3.50	1.25
亚油酸(g)	2.80	0.37	0.132
α -亚麻酸(mg)	320.00	42.24	15.07
亚油酸与 α -亚麻酸比值	8.8	8.8	8.8
碳水化合物(g)	53.40	7.05	2.52
维生素 A(μ g RE)	376.30	49.67	17.72
维生素 D(μ g)	8.00	1.06	0.38

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
维生素 E(mg α -TE)	6.50	0.86	0.31
维生素 K ₁ (μ g)	26.55	3.50	1.25
维生素 B ₁ (μ g)	378.00	49.90	17.80
维生素 B ₂ (μ g)	770.00	101.64	36.27
维生素 B ₆ (μ g)	301.00	39.73	14.18
维生素 B ₁₂ (μ g)	0.75	0.1	0.035
烟酸(μ g)	3360.00	443.52	158.27
叶酸(μ g)	66.30	8.75	3.12
泛酸(μ g)	2518.20	332.40	118.62
维生素 C(mg)	100.80	13.31	4.75
生物素(μ g)	14.00	1.85	0.66
钠(mg)	148.80	19.64	7.01
钾(mg)	508.80	67.16	23.97
铜(μ g)	306.40	40.44	14.43
镁(mg)	37.60	4.96	1.77
铁(mg)	5.76	0.76	0.27
锌(mg)	3.76	0.50	0.18
锰(μ g)	57.00	7.52	2.68
钙(mg)	381.60	50.37	17.97
磷(mg)	269.60	35.59	12.70
钙磷比值	1.4	1.4	1.4
碘(μ g)	84.60	11.17	3.98
氯(mg)	409.60	54.07	19.29
硒(μ g)	10.20	1.35	0.48
胆碱(mg)	95.20	12.57	4.48
肌醇(mg)	26.84	3.54	1.26
牛磺酸(mg)	28.00	3.70	1.32

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
左旋肉碱(mg)	11.20	1.48	0.53
二十二碳六烯酸（DHA）(mg)	48.00	6.34	2.26
二十二碳六烯酸（DHA）(%总脂肪酸)	0.19	0.19	0.19
二十碳四烯酸（AA）(mg)	64.00	8.45	3.01
二十碳四烯酸（AA）(%总脂肪酸)	0.26	0.26	0.26
核苷酸(mg)	17.50	2.31	0.82

备注：每 100mL 标准冲调液为 13.2g 本品加 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品为特殊医学用途婴儿乳蛋白深度水解配方食品，将乳蛋白水解成肽段和氨基酸，添加了中链甘油三酯（MCT）（约 137g/kg）作为脂肪的部分来源，适用于 0~12 月龄对食物蛋白过敏的婴儿。每 100mL 标准冲调液所含能量值约为 280kJ。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄食物蛋白过敏婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用量和食用方法应在医生或者临床营养师的指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调方法：每 1 平匙本品（约 4.4g）需用 30mL 约 40℃温开水冲调而成。配制本品时应用罐内所附的专用量匙。

【净含量和规格】450g

【保质期】18 个月

【贮存条件】请置于阴凉干燥处存放，食用完后盖上盖子。开罐后，请在一个月内食用完。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或者临床营养师指导下使用。
- 2.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 3.本品不适用于非目标人群使用。
- 4.对于 0~6 月的婴儿本品可作为单一营养来源；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。添加辅助食品（特别是鸡蛋、海产品及其他奶制品）时，应遵从医生或者临床营养师的建议。
- 5.配制不当和使用不当可能引起健康危害。未经过医生建议切勿改变配制方法。
- 6.本品未添加乳糖（含量<0.5g/100g），标准冲调液渗透压约为 220mOsmol/kg，供临床使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。