

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20235002

特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品

启赋®敏适

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】乳糖、植物油（葵花籽油、椰子油、低芥酸菜籽油）、乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、磷酸氢二钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸三钙、碘化钾、硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'单磷酸胞苷、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、L-缬氨酸、L-酪氨酸、L-苯丙氨酸、L-组氨酸、柠檬酸。

【营养成分表】

| 营养成分 | 每 100g | 每 100kJ |
|-------------------------------|--------|---------|
| 能量(kJ) | 2146 | 100 |
| 蛋白质(g) | 9.75 | 0.45 |
| 脂肪(g) | 26 | 1.21 |
| 亚油酸(g) | 3.2 | 0.15 |
| α -亚麻酸(mg) | 380 | 17.71 |
| 碳水化合物(g) | 59.9 | 2.79 |
| 维生素 A(μ g RE) | 459 | 21.39 |
| 维生素 D(μ g) | 6.8 | 0.32 |
| 维生素 E(mg α -TE) | 10 | 0.47 |
| 维生素 K ₁ (μ g) | 27 | 1.26 |
| 维生素 B ₁ (μ g) | 500 | 23.3 |

| 营养成分 | 每 100g | 每 100kJ |
|--------------------------|--------|---------|
| 维生素 B ₂ (μg) | 1070 | 49.86 |
| 维生素 B ₆ (μg) | 360 | 16.78 |
| 维生素 B ₁₂ (μg) | 0.96 | 0.045 |
| 烟酸（烟酰胺）(μg) | 5400 | 251.63 |
| 叶酸(μg) | 81 | 3.77 |
| 泛酸(μg) | 4800 | 223.67 |
| 维生素 C(mg) | 69 | 3.22 |
| 生物素(μg) | 9.7 | 0.45 |
| 钠(mg) | 195 | 9.09 |
| 钾(mg) | 510 | 23.77 |
| 铜(μg) | 410 | 19.11 |
| 镁(mg) | 46 | 2.14 |
| 铁(mg) | 4.7 | 0.22 |
| 锌(mg) | 5 | 0.23 |
| 锰(μg) | 95 | 4.43 |
| 钙(mg) | 345 | 16.08 |
| 磷(mg) | 192 | 8.95 |
| 碘(μg) | 68 | 3.17 |
| 氯(mg) | 380 | 17.71 |
| 硒(μg) | 13 | 0.61 |
| 胆碱(mg) | 48 | 2.24 |
| 肌醇(mg) | 32 | 1.49 |
| 牛磺酸(mg) | 28 | 1.3 |
| 左旋肉碱(mg) | 9.6 | 0.45 |
| 二十二碳六烯酸(mg) | 63 | 2.94 |
| 二十二碳六烯酸（%总脂肪酸） | 0.26 | 0.26 |
| 二十碳四烯酸(mg) | 63 | 2.94 |

| 营养成分 | 每 100g | 每 100kJ |
|---------------|--------|---------|
| 二十碳四烯酸（%总脂肪酸） | 0.26 | 0.26 |
| 核苷酸(mg) | 15 | 0.7 |

【配方特点/营养学特征】本品采用水解工艺，乳清蛋白经加工分解成小分子乳清蛋白、肽段和氨基酸。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

【食用方法和食用量】口服，食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调时请用专用量匙，1 平匙配方粉约为 4.357g。需用 13.07g 配方粉加 90mL 温开水冲调配制成 100mL 标准冲调液。冲调方法如下：（1）冲调前洗净双手，奶具清洁后至水中煮沸。（2）饮用水煮沸后，待其自然冷却至约 40℃。（3）将温开水倒入奶瓶中。（4）用专用量匙舀取粉末刮平后，倒入奶瓶。（5）将使用后干燥的量匙放回罐内支架上，并盖紧罐盖。（6）摇动已盖紧瓶盖的奶瓶，直至粉末完全溶解。喂哺前请检查温度。

【净含量和规格】350g, 380g, 400g, 800g

【保质期】24 个月

【贮存条件】产品应放在阴凉、干燥处。开罐后请务必盖紧塑料盖，并在 4 周内食用完毕。开罐后的产品存放在阴凉、干燥处，请勿放入冰箱冷藏。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 5.本品可以作为单一营养来源满足 0~6 月龄目标人群的营养需求。6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。请注意在添加食物时，特别是婴儿谷物及含奶食品时，应先咨询医生的意见。
- 6.对已出现牛奶蛋白过敏的婴儿，请务必先听取医生或临床营养师的建议。
- 7.每次只调配一次用量。请遵照冲调方法，冲调后应立即使用。未喝完的奶液请勿保存，务必丢弃。未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法、不恰当的贮存和喂哺方式均有可能影响

婴儿的健康。

8.喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。

9.请在婴儿适龄时用奶杯替代奶瓶。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。