

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20230024

特殊医学用途全营养配方食品

立佳泰

【产品类别】全营养配方食品

【配料表】麦芽糊精、植物脂肪粉[麦芽糊精、植物油（低芥酸菜籽油、玉米油、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯）、中链甘油三酯、酪蛋白酸钠、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾、抗坏血酸钠]、大豆肽粉、水解乳清蛋白粉、海藻糖、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钠）、亚麻籽油粉（亚麻籽油、葡萄糖浆、辛烯基琥珀酸淀粉钠、单，双甘油脂肪酸酯、抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物）、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d1- $\alpha$ -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、磷酸氢二钠、磷酸氢二钾、氯化钾、硫酸铜、碳酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘化钾、亚硒酸钠、黄原胶、食用香精。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ
能量(kJ)	1727	100
蛋白质(g)	16.0	0.9
脂肪(g)	8.0	0.5
亚油酸(mg)	1168	68
$\alpha$ -亚麻酸(mg)	380	22
碳水化合物(g)	68.2	3.9
维生素 A( $\mu$ g RE)	300.0	17.4

营养成分	每 100g	每 100kJ
维生素 D( $\mu$ g)	7.00	0.41
维生素 E(mg $\alpha$ -TE)	6.80	0.39
维生素 K <sub>1</sub> ( $\mu$ g)	22.60	1.31
维生素 B <sub>1</sub> (mg)	0.82	0.05
维生素 B <sub>2</sub> (mg)	0.82	0.05
维生素 B <sub>6</sub> (mg)	0.82	0.05
维生素 B <sub>12</sub> ( $\mu$ g)	1.80	0.10
烟酸(mg)	5.00	0.29
叶酸( $\mu$ g)	121.0	7.0
泛酸(mg)	1.80	0.10
维生素 C(mg)	72.0	4.2
生物素( $\mu$ g)	16.0	0.9
钠(mg)	426	25
钾(mg)	533	31
铜( $\mu$ g)	317	18
镁(mg)	94.3	5.5
铁(mg)	5.30	0.31
锌(mg)	4.2	0.2
锰( $\mu$ g)	1189.0	68.8
钙(mg)	377	22
磷(mg)	340.0	19.7
碘( $\mu$ g)	34.0	2.0
氯(mg)	200	12
硒( $\mu$ g)	25.0	1.4

【配方特点/营养学特征】本品属于全营养配方食品，蛋白质来源于大豆肽粉及水解乳清蛋白粉，添加了中链甘油三酯（添加量约为 27.6g/1000g）。本品可作为单一营养来源满足目标人群营养需求。

**【组织状态】**粉状

**【适用人群】**10 岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的人群。

**【食用方法和食用量】**口服或管饲。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调方法：170mL 温开水（40℃～60℃），加入 45g（使用本品附赠量勺，约 5 勺）本品，充分搅拌均匀，配制成 200mL 标准冲调液。冲调好的本品应立即饮用。

**【净含量和规格】**360g

**【保质期】**24 个月

**【贮存条件】**本品未开罐时常温保存于阴凉干燥处。开罐后，本品应盖紧盖子贮存于阴凉干燥处，并请于一个月内食用完毕。

**【警示说明和注意事项】**

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 本品可作为单一营养来源单独食用。
5. 严禁肠内营养禁忌症人群、对本品所含物质过敏或有代谢障碍人群使用。
6. 不适用于半乳糖血症的人群。
7. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。
8. 冲调本品时，请保证环境卫生及操作过程规范，使用期间应避免细菌污染，勿用微波炉加热，以免烫伤。
9. 管饲系统应当正确使用。
10. 本产品标准冲调液的渗透压约为 430mOsmol/kg，供使用参考。

**注：**企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。