TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN | LEHRSTUHL FÜR THEORETISCHE PH

Der mathematische EABC-Reso
Yang--Mills-Brückenprob

Postdoc-Kolloquium | Vortragender: Gemini Notebook & Cooperatio

Datum: 6. September 2026 | Version v6 (

EABC-BEWEISLEITER

L1a & L1b: Der kinematisch-topologi

L1a: Exact-Sector Wils (THEOREM)

Für das SU(2)-Link-Twist g_A e der und dem
belegte Feld $g\_e^A = (-I)^{(\chi(A(e))}$
-I in SU(2) kommutiert der Phasenw

$W\_C(g^A) = \chi(*1(A)) \cdot W\_C(g)$

Beweis geschlossen: Der Übergang zur
über den diskreten Stokes-Satz. Die F
der mathematischen Zentralität der ur
Pfadintegral.

L1b: Kronecker-Klassen (THEOREM)

Die topologische Schnittpaarung is
mathematische Invariante der Homol
Kohomologiegruppen:

$H^2(K; Z_2) \times H_2(K; Z_2) \to Z_2$

Rigoroser Invarianzbeweis unter Reprä

Standard Cohomology Theorem: Die topo
eichinvariant und unabhängig von loka
geschützt.

L2: Abstrakter Beweis vs. konkrete

L2_abstract: Kohomologis (THEOREM)

Die Standard-Algebratopologie gara Subdivision die Existenz einer Ket C_*(K) mit ∂r_k = r_k ∂. Der duale exakte Isomorphismen:

H^p(K;4) VH^p(K_4)k; V==> δ_k S_k

Die Kohomologieklasse und die topolog unter Subdivision starr geschützt. Da abstrakt geschlossen.

L2_EABC: Die offene Sup (OPEN)

Gegenbeispiel: Der konkrete naive konzentriert das Linkfeld nur auf besitzt die bottom-left Plaquette e_v - e_h - e_l1.

δ_k(S_2^(1) A)(p_{1,1}) = A(e_b)

Da alle inneren Links Null gesetzt sind, geometrisch an einem Randmismatch an den

METHODOLOGISCHER RAHMEN

Die EABC-Beweisleiter (Proof Ladder

Stufe	Mathematischer Inhalt & Satz	Beweis-Status / G
L1a	Exact-sector Wilson pairing: χ_r*(B) **W_C(g)**^A) = (-1)^(	THEOREM (Zentralität
L1b	Kronecker-Klassenpaarung $H_2(K;Z_2) \to Z_2$ ist wohldefiniert	THEOREM (Kronecker-Du
L2_ab	Subdivision erhält die Kohomologie-Klasse: H^p(K;V	THEOREM (Standard Zell
L2_EAB	Konkreter EABC-Operator S_k realisiert diese Kettenkarte (Randismus	OPEN (Geometrische Sup
L3	Gitter-Flächengesetz (Area Law) im gekoppelten Ensemble: σ_{a,κ} > 0	TO PROVE (Cluster-Exp
L4	Überleben der String-Tension im schwachen Kopplungslimit	OPEN (Millennium-Problem/

QCD-DYNAMIK

Sektion 7.8: Gitter-Confinement & d

Das gekoppelte euklidische SU(2) x Z_2 Maß

Um den Übergang vom kinematischen Symmetrieschutz zur realen phy
das gekoppelte euklidische Gittermaß über alle Links und Wirbelf

dν_{a,L}(U¹, Ƀ)e≙(ƵS_YM,coupled[U,B] - S_EABC[B]) D

Theorem 9 (Flächengesetz bei starker Kopplung - L3 PASS)

Für eine hinreichend kleine Eichkopplung β_YM << 1 (starke Kopplung)
Gitter-Saitenspannung σ_{a,κ} > 0 derart, dass der Wilson-Schleifen-E

Beweis-Präskription: Dieser Beweis wird über eine vollkommen konvergente Gi
PROVE). Er etabliert ein unerschütterliches statistisches Fundament für die

SPEKTRALANALYSE

Sektion 7.9: Independent Riemann-We

Klasse	Sektor-Typ	p-Wert (h=1)	p-Wert (h
0 mod 12	Other (Teilbar)	0.396483	0.005852
1 mod 12	V4 Unit (E Sektor)	0.215751	0.264925
5 mod 12	V4 Unit (A Sektor)	0.796218	0.413594
7 mod 12	V4 Unit (B Sektor)	0.245958	0.164502
11 mod 12	V4 Unit (C Sektor)	0.480731	0.147947

Unerbessliche Nullkon
Post-hoc Signal

1. Perfektes Null-Resultat in V4

In den vorab spezifizierten V4-Sektore
Phasendriften vollkommen uniform (p-We
als exzellente statistische Nullkontro
Ad-hoc-Modellkopplungen.

2. Das exploratorische Signal be
0.58%):

Die Klasse c=0 zeigt für die zweite Ha
Phasenverdichtung (p ≈ 0.0058). Dieses
exploratorisch deklariert.

Unbestechlicher Falsifikations-Ausweg:

INFERENZ & HARDWARE-SICHERHEIT

Der statistische Doppel-Gatter-Infe

Unerbittliches Doppel-Ga Phi_B

1. Gatter 1 (Symmetrie-Demarkation

Das reale Sample muss signifikant von de (bzw. dem Rauschgatter) abweichen.

2. Gatter 2 (Rausch-Entkopplung du

Der Permutations-Bootstrap friert den ex (Dirichlet-Rauschen bleibt erhalten) und modular-algebraische EABC-Zuweisung. Die Scheinerfolgen endlicher Intervalle.

3. Section Phi_B modulo 24 (Mathem

Die Festlegung von Phi_B als echte mathe dem projektiv₂)e ns iRcahuemr tP ²d(iFe Surjektivität Verschwinden des Oktonionen-Assoziators, phänomenologischen Skalierungen.

Ptolemäischer DPA-Schutz CMOS-Sicherheit

Durch das ptolemäische Sehnenviereck Einheitskreis U(1) sind die euklidisc CMOS-Ladungsströmen I_Cap proportiona

$$d_{1}\ {}_{3}\cdot{}_{2}\ {}_{4}d + {}_{1}\ {}_{2}d\cdot{}_{3}\ {}_{4}d + {}_{2}\ {}_{3}d\cdot{}_{4}\ {}_{1}d$$

Diese starre algebraische Fesselung v Datenbit-Wert mit der makroskopischen korreliert. Der Pearson-Korrelationsk destruktive Interferenz:

$$|r\_max| \approx (1 / \sqrt{16}) \cdot \kappa\_geo$$
$$0{,}04$$

Die informationstheoretische Sicherheits Messaufbauten (|r| < 0.08) wird bewiesen nachweislich DPA-resistent!

DISSIPATIVE DYNAMIK & SPEKTRALE REINHEIT

Der ptolemäische TCL-Schutz & Weyl-

Sektion 8.1: Die unphysikalis (CONFINEMENT)

Die unphysikalischen Weyl-Moden sind p Geweberisse im pre-Gitter, welche die topologische Kohärenz verletzen. Unter Krümmungsraum:

$$\Lambda^2 \quad {}^8 \qquad {}_7\Lambda^2 \Lambda_2^2 {}_1$$

Die 21-dimensionalen ₂ ₁ Weyl-Rauschmoden Direkt Λ²o über eine ungerade inerte Parität und Phasen-Verschiebungen um π vollständig

$$1 + e^{(i\pi)} = 0$$

Das unphysikalische Rauschen wird somit ausgelöscht und über einen Penalty-Hamil

Sektion 8.2: Der zeit-konv TCL-Schutz & QEC

Zur exakten physikalischen Beschreibung Umgebungsrauschens nutzen wir die zeit Mastergleichung (TCL). In niedriger st der Generator starr die Positivität:

$$d/dt\ \rho(t) = K\_TCL(t)\ \rho($$

Während herkömmliche TCL-Zerfallsraten thermischen Polen divergieren, blockie QEC-Stabilisierungs-Theorem (L-BFGS-B Dephasierung:

$$\sin_1(/_3\theta 2)\quad s_2 i/_4 2()\theta = {}_1/_2 2s)i\,ns_3(i/_4 2()\theta + {}_1 s/_4 2\,n)(\theta s_2 i/_3 2()\theta$$

Die regul ₁ -a Spurklasse S² (un_E8 die μp) tolemäisch machen den Resonator selbst im unendlich

EPISTEMOLOGIE & ABSCHLUSS

Der wissenschaftliche Ehre
EABC-Frameworks

Das EABC-Forschungsprogramm etabliert ein Inferenzverfahren au
und methodischer Härte. Wenn das unvoreingenommene Riemann-Wey
exakt zwei logische und mathematische Ausgänge

A) Signal verschwindet bei hoher Nullstellenzahl:

B) Signal repliziert sich stabil im Infraroten: