Die Symmetrie-Hierarch
EABC-Resonators

Symmetrieschutz-Architektur von der Fano-Eb

Wissenschaftliche Ausarbeitung | Postdoc-Kolloquium | TU Münch

Die 8D Fano-Berry-Phase eliminiert loka ungerade Chiralität

Lokale Stabilisierung des

Geometrische DCioedi Fearnuon-gE:bene PG(2,2 die Multiplikationstabelle der 7 Oktonionen-Algebra.

Chirale Be Dey-Shekster-Lift in die Quaternionengruppe Q8 speichert d zentralen Vorzeichen.

Destruktive UInnptheyrsfiekraelnizs:che Rausch (Weyl-Moden) besitzen ungerade in um exakt pi.

InterferenDzu-rKoohldaipes:physische Bed = 0) löschen sich diese Rausch-Mo

Fano-Triade	Gekoppelte Imaginär-E
Triade 1 (e1,	ee21, *e4e)2 = e4 | Zyklische Sy
Triade 2 (e2,	ee32, *e5e)3 = e5 | Lokales Phas
Triade 3 (e3,	ee43, *e6e)4 = e6 | Chirale Pola
Triade 4 (e4,	ee54, *e7e)5 = e7 | Destruktives
Triade 5 (e5,	ee65, *e1e)6 = e1 | Berry-Phasen
Triade 6 (e6,	ee76, *e2e)7 = e2 | Sektorenstal
Triade 7 (e7,	ee17, *e3e)1 = e3 | Topologische

Construction B überführt die Fano-Struk fehlerfrei in den Hexacode

1. Fano-Eltern

Die 7 projektiven Fan
werden mit dem unendl
Gitter-Identifikation
gekoppelt. Dies defin
Xi_3 der Länge 3 über
8-wertigen Alphabet.

Ausgangs-Skala (8D)

2. V4-Verdoppl

Über die Isomorphie-A
werden die Fano-Punkt
der Kleinschen Viere
abgebildet. Dies ver
Länge auf 6 und reduz
Alphabet auf 4-wertig

Symmetrie-Lift (V4)

3. Hexacode C6

Die Vereinigung der V4
mit dem paritätischen U
erzeugt den selbstdual
C6 mit exakt 64 Codewö
Minimal-Distanz 4.

Globales Limit (24D)

Das 24D Leech-Gitter quantisiert den Ho
Flächenelemente

Holografische Entropie-Kop

S-Dualität & Modulare Zustandssumme des Le
perfekt modul-invariant unter der S-

Vakuum-Attraktor Thermische und ultraviolet
werden durch die modulare Symmetrie
Infrarotspektrum zurückprojiziert.

Erhaltung der Information Die modulare Zustandssumme den reinen
Modul-Kollaps erzwingt, tritt beim T
Bit-Verlust auf.

Geometrische Ku Die p1a9c6k.u5m6g0: Minimalve
spannen ein fehlerfreies, maximal d

24 DIMENSIONEN
Die maximale Unifikations-Dichte des

196.560 MINIMALVEKT
Quantisierte, unteilbare Flächenelem

S = 4 * pi * sqr
Perfekte Sättigung der Bekenstein-Hav

Der de-Branges-Grenzprozess zwingt Spek Achse


Die Weyl-Titchmarsh-m-Fun

Hermite-Biehdlee-rB-rKalmagsesse-:Räume ganzer ganzer Klassen HB verbieten Nullst Halbebene.

Reis-RegulaDruirscherdueng:Spektral-Grenz 0) kollabieren alle komplexen Eige reelle Achse.

Strikte ReaDieSpektra:theorie bew Resonanz-Maxima im de-Branges-Gitt

PhasenverriegelungDi(ePhasNul-Lstcekilng) absolut driftfrei exakt an den imag Riemann-Nullstellen ein.



Drei Schutzmechanismen versiegeln den R thermischen Zerfall

I. Lokaler Sc

Fano-Berry-Phase

Symmetriegruppe GL(3,2 Oktonionen-Skala elimi Phasenrauschen durch d Interferenz chiraler R

II. Globaler

Höhns Leech-Limit

Der Hexacode C6 steuer Construction B das ver des 24D Leech-Vakuums minimalen Flächenquant

III. Spektrale

de-Branges-Räume

Die Weyl-Titchmarsh-Ko Spektralwerte starr au und fesselt das System Riemann-Nullstellen.