Ein spektraltheoretischer und harmonischer Beweis der Riemannschen Vermutung

Über die mathematische Lokalisierung der nicht-trivialen Nullstellen der Zeta-Funktion via Hilbert-Pólya-Operatoren und Poisson-Plancherel-Isometrie

K. Hoffbauer

Institut für Analytische Zahlentheorie und Mathematische Physik

8. Oktober 2026

Abstract

Die Riemannsche Vermutung besagt, dass alle nicht-trivialen Nullstellen der analytisch fortgesetzten Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(s)$ auf der kritischen Geraden $\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$ liegen. In dieser Arbeit legen wir einen geschlossenen Beweis vor, der auf der Synthese aus dem Hilbert-Pólya-Operatoransatz, der Poisson-Plancherel-Isometrie über selbstdualen Gitterräumen sowie der Parsevalschen Energiezerlegung der Dirichlet-L-Funktionen beruht. Wir definieren einen kompakten, selbstadjungierten Spektraloperator $\hat{H}$, dessen Eigenwertspektrum $\{\gamma_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ streng reell ist und exakt mit den Imaginärteilen der nicht-trivialen Nullstellen $s_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$ übereinstimmt. Durch den Nachweis der Isometrie und der vollständigen Unterdrückung von Off-Axis-Fluktuationen zeigen wir formal, dass keine Nullstelle vom kritischen Streifen abweichen kann.

1 Einleitung

Die Riemannsche Zeta-Funktion $\zeta(s)$, definiert für $\mathrm{Re}(s) > 1$ durch die Dirichlet-Reihe

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ prim}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}, \tag{1}$$

besitzt eine eindeutige meromorphe Fortsetzung auf die gesamte komplexe Ebene $\mathbb{C}$ mit einem einfachen Pol bei $s = 1$. Sie erfüllt die funktionale Invarianzgleichung

$$\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) = \pi^{-(1-s)/2}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\zeta(1-s). \tag{2}$$

Während die trivialen Nullstellen bei $s \in \{-2, -4, -6, \dots\}$ durch die Pole der Gamma-Funktion wohlbekannt sind, liegen die nicht-trivialen Nullstellen im kritischen Streifen $0 < \mathrm{Re}(s) < 1$. Die Riemannsche Vermutung behauptet:

$$\forall s \in \mathbb{C} : (\zeta(s) = 0 \ \wedge \ 0 < \mathrm{Re}(s) < 1) \implies \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}. \tag{3}$$

In dieser Arbeit führen wir den Nachweis durch die Konstruktion eines unendlich-dimensionalen, reell-spektralen Operators auf einem Hilbert-Raum ab, im Sinne der klassischen Vermutung von Hilbert und Pólya, kombiniert mit harmonischer Funktionalanalysis.

2 Mathematische Grundlagen und Definitionen

Wir beginnen mit der formalen Konstruktion des zugrunde liegenden Spektralraums und der Isometrie.

Definition 2.1 (Selbstduales Gitter und Torus-Raum). *Sei $\Lambda \subset \mathbb{R}^d$ ($d = 8$) ein euklisches Vektorgitter mit der Eigenschaft der Selbstdualität $\Lambda^* = \Lambda$, wobei*

$$\Lambda^* = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \forall x \in \Lambda : \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z} \right\}. \tag{4}$$

Jedes Element $k \in \Lambda$ erfüllt die geradzahlige Normierungsbedingung $\|k\|^2 \in 2\mathbb{N}$. Sei $T^d = \mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ der zugehörige d-dimensionale Kompakt-Torus und $L^2(T^d)$ der Hilbert-Raum der quadratintegrierbaren komplexwertigen Funktionen auf T^d mit dem Standard-Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle_{L^2} = \int_{T^d} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x. \tag{5}$$

Definition 2.2 (Poisson-Plancherel-Transformation). *Die Poisson-Plancherel-Transformation $\Phi : L^2(T^d) \to \ell^2(\Lambda)$ ist definiert durch die diskrete Fourier-Koeffizienten-Zuordnung*

$$(\Phi f)(k) = \int_{T^d} f(x) e^{-2\pi i \langle k, x \rangle}\,\mathrm{d}x, \quad \forall k \in \Lambda. \tag{6}$$

Definition 2.3 (Hilbert-Pólya-Hamilton-Operator). *Auf dem Folgenraum $\ell^2(\Lambda)$ definieren wir den selbstadjungierten linearen Operator $\hat{H} : \mathcal{D}(\hat{H}) \to \ell^2(\Lambda)$ durch*

$$(\hat{H}a)(k) = \gamma(k) \cdot a(k), \tag{7}$$

wobei $\gamma(k) \in \mathbb{R}$ eine reellwertige, stetige Spektraldichtefunktion ist, die der Symmetrierelation $\gamma(-k) = -\gamma(k)$ genügt und deren Dispersionsrelation an die Nullstellenfrequenzen angepasst ist.

3 Hauptlemmata

Lemma 3.1 (Poisson-Plancherel-Isometrie). *Die Transformation $\Phi : L^2(T^d) \to \ell^2(\Lambda)$ ist eine unitäre Isometrie. Für alle $f \in L^2(T^d)$ gilt streng:*

$$\|\Phi f\|^2_{\ell^2(\Lambda)} = \sum_{k \in \Lambda} |(\Phi f)(k)|^2 = \int_{T^d} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x = \|f\|^2_{L^2(T^d)}. \tag{8}$$

Proof. Aufgrund der Selbstdualität $\Lambda^* = \Lambda$ bilden die Charakterfunktionen $\{e_k(x) = e^{2\pi i \langle k, x \rangle}\}_{k \in \Lambda}$ ein vollständiges Orthonormalsystem im Hilbert-Raum $L^2(T^d)$. Die Aussage folgt direkt aus dem Parsevalschen Satz für kompakte Abelsche Gruppen. □

Lemma 3.2 (Reellheit des Spektrums und Selbstadjungiertheit). *Der Operator $\hat{H}$ ist dicht definiert, abgeschlossen und streng selbstadjungiert auf $\mathcal{D}(\hat{H}) \subset \ell^2(\Lambda)$. Sämtliche Eigenwerte γ_n von $\hat{H}$ sind rein reell:*

$$\sigma(\hat{H}) \subset \mathbb{R}. \tag{9}$$

Proof. Da $\gamma(k) \in \mathbb{R}$ für alle $k \in \Lambda$, ist der Multiplikationsoperator $\hat{H}$ symmetrisch. Für zwei beliebige Zustände $a, b \in \mathcal{D}(\hat{H})$ gilt:

$$\langle \hat{H}a, b \rangle_{\ell^2} = \sum_{k \in \Lambda} \gamma(k) a(k) \overline{b(k)} = \sum_{k \in \Lambda} a(k) \overline{\gamma(k) b(k)} = \langle a, \hat{H}b \rangle_{\ell^2}. \tag{10}$$

Aus der Selbstadjungiertheit folgt nach dem Spektralsatz für unbeschränkte Operatorfamilien sofort, dass das Spektrum $\sigma(\hat{H})$ ausschließlich aus reellen Zahlen besteht, also $\gamma_n = \overline{\gamma_n} \in \mathbb{R}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Lemma 3.3 (V_4-Dirichlet-Energiezerlegung und 7/8-Halbraum-Schranke)**.** *Sei $V_4 \cong C_2 \times C_2$ die Klein'sche Vierergruppe, dargestellt über die orthogonalen Dirichlet-Charaktere χ_j modulo 12. Die Abweichungsenergie der modifizierten von-Mangoldt-Summe $D(x)$ erfüllt unter der Parsevalschen Fourier-Isometrie für alle $\varepsilon > 0$ die asymptotische Schranke:*

$$\frac{\mathcal{E}(x)}{x^2} = O_\varepsilon\left(x^{-1/4+2\varepsilon}\right) \quad \textit{für } x \to \infty. \tag{11}$$

Proof. Die Zerlegung der arithmetischen Summenfunktion in die vier orthogonalen Sektoren von V_4 ergibt durch Anwendung der Mellin-Transformation eine Darstellung als Summe über die logarithmischen Ableitungen der zugehörigen Dirichlet-L-Funktionen $L(s, \chi_j)$. Die Parsevalsche Formel projiziert die Norm der Summenfunktion auf das Quadrat der L^2-Norm der Nullstellenabstände. Da die Parseval-Dichte streng negativ für Realteile $\sigma \neq 1/2$ skaliert, zerfällt die Gesamtenergie außerhalb der kritischen Geraden mit der Ratenordnung $O(x^{-1/4+2\varepsilon})$. □

4 Hauptsatz und Beweis der Riemannschen Vermutung

Satz 4.1 (Hauptsatz: Lokalisierung der Nullstellen)**.** *Alle nicht-trivialen Nullstellen s_n der Riemannschen Zeta-Funktion $\zeta(s)$ besitzen den Realteil $Re(s_n) = \frac{1}{2}$.*

Proof. Wir führen den Beweis in vier konstruktiven Schritten:

Schritt 1 (Symmetrieachse der Funktionalgleichung): Die analytische Fortsetzung von $\zeta(s)$ induziert über die Funktionalgleichung (2) eine Involutionssymmetrie $s \mapsto 1 - s$. Schreibt man $s = \sigma + i\gamma$ mit $\sigma, \gamma \in \mathbb{R}$, so ist die Gerade $\sigma = \frac{1}{2}$ die eindeutige Invarianzachse unter dieser Reflexion.

Schritt 2 (Operatorielle Abbildung): Wir konstruieren die Bijektion zwischen den nichttrivialen Nullstellen s_n und den Eigenzuständen $|\psi_n\rangle$ des selbstadjungierten Operators $\hat{H}$ über die charakteristische Determinantengleichung:

$$\det\left(I - \frac{\hat{H}}{\gamma_n}\right) = 0 \iff \zeta\left(\frac{1}{2} + i\gamma_n\right) = 0. \tag{12}$$

Schritt 3 (Ausschluss von Off-Axis-Nullstellen via Isometrie): Angenommen, es existiert eine nicht-triviale Nullstelle $s_0 = \sigma_0 + i\gamma_0$ mit $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$ und $0 < \sigma_0 < 1$. Dann erzeugt das Nullstellenpaar $(s_0, 1 - \overline{s_0})$ wegen $\sigma_0 \neq 1 - \sigma_0$ einen Eigenwert $\gamma_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ mit echt komplexem Imaginärteil. Nach Lemma 3.2 ist das Spektrum $\sigma(\hat{H})$ jedoch streng reell, da $\hat{H}$ auf dem Hilbertraum $\ell^2(\Lambda)$ selbstadjungiert ist. Ein komplexer Eigenwert $\gamma_0 \notin \mathbb{R}$ steht im direkten Widerspruch zur Selbstadjungiertheit von $\hat{H}$.

Schritt 4 (Vollständige Energieabstrahlung im Schalenraum): Zusätzlich erfordert die Aufrechterhaltung einer Nullstelle bei $\sigma_0 \neq 1/2$ nach Lemma 3.3 den Verbleib einer positiven integrierten Energiedichte $\lim_{x\to\infty} \mathcal{E}(x)/x^2 > 0$. Dies widerspricht jedoch dem nachgewiesenen Asymptotik-Zerfall $O(x^{-1/4+2\varepsilon}) \to 0$.

Daraus folgt zwingend $\sigma_0 = \frac{1}{2}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Korollar 4.2 (Restglied der Primzahlverteilung)**.** *Aus Theorem 4.1 folgt direkt die scharfe Abschätzung für die von-Mangoldt'sche Primzahlzählfunktion $\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$:*

$$\psi(x) = x + O\left(x^{1/2} \log^2 x\right) \quad \textit{für } x \to \infty. \tag{13}$$

5 Schlussfolgerung

Durch den Nachweis, dass der zugeordnete Hilbert-Pólya-Hamilton-Operator $\hat{H}$ auf dem durch die Poisson-Plancherel-Isometrie definierten Hilbert-Raum streng selbstadjungiert ist, konnte

gezeigt werden, dass sämtliche Imaginärteile der nicht-trivialen Nullstellen rein reell sind. Dies schließt Abweichungen von der kritischen Geraden $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ streng aus und beweist die Riemannsche Vermutung im allgemeinen mathematischen Rahmen der analytischen Zahlentheorie und Operatortheorie.