Vom arithmetischen Vakuum zur chiralen Dynamik

Profinite Quaternionen, V_4/C_4-Strukturen, spektrale Arithmetik und oktonionische Nichtassoziativität als mathematisches Programm emergenter Physik

Das #Energiedoku-Forschungskonsortium

Korrespondenz: `research@energiedoku.org`

15. August 2026

Zusammenfassung

Die moderne fundamentale Physik beschreibt Raumzeit, Quantenfelder und thermodynamische Dynamik mit außerordentlicher empirischer Präzision, lässt jedoch offen, ob Raum, Zeit und die algebraische Struktur physikalischer Observablen fundamental oder emergent sind[cite: 1].

Der vorliegende Grundsatzartikel formuliert ein alternatives Forschungsprogramm, das von streng mathematischen Strukturen ausgeht und physikalische Deutungen erst in einer nachgeordneten Schicht zulässt[cite: 1]. Ausgangspunkt ist ein arithmetisches Vakuum aus ganzzahligen Quaternionen, ihrer profiniten Vervollständigung und der kanonischen Reduktion der Quaternionennorm modulo 12[cite: 1]. Daraus entsteht der Quotient

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong V_4,$$

dessen Charaktertheorie die Hadamard-Basis als natürliche Fourierbasis liefert[cite: 1]. Die uniforme Haar-Verteilung der vier Einheitenklassen wird als mathematisch exakter Pushforward eines konditionierten profiniten Maßes beschrieben[cite: 1].

Die dynamische Struktur wird davon getrennt als zusätzliche zyklische C_4-Organisation eines Vierzustandsraums eingeführt[cite: 1]. Ein Rotationsoperator

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J^2 = -I,$$

liefert die Eigenwerte $\pm i$ und damit eine orientierte Phasenstruktur[cite: 1]. Die Identifikation eines solchen Phasenparameters mit physikalischer Zeit bleibt eine Hypothese, nicht Teil des mathematischen Kerns[cite: 1].

Als zweite algebraische Ebene werden die Oktonionen eingeführt[cite: 1]. Während Nichtkommutativität durch den Kommutator gemessen wird, quantifiziert der Assoziator

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$$

den Verlust der Assoziativität[cite: 1]. Artins Satz garantiert die Assoziativität jeder von zwei Elementen erzeugten Unteralgebra; genuine Nichtassoziativität ist deshalb erstmals durch eine dreistellige Observable detektierbar[cite: 1]. Die Assoziator-Norm ist unter $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ invariant und liefert eine natürliche mathematische Kandidatin für eine „Unschärfe zweiter Ordnung"[cite: 1]. Eine Verbindung zu fundamentalen Eichwechselwirkungen, insbesondere zur starken Wechselwirkung, wird ausdrücklich nicht behauptet, sondern als offene physikalische Hypothese formuliert[cite: 1].

Der Artikel verbindet diese Konstruktion historisch mit Euler, Hamilton, Graves/Cayley, Hurwitz und der nichtkommutativen Operatoralgebra der Quantenmechanik und schließt mit einer dreistufigen Claim-Wall[cite: 1]:

`PROVED` $\longrightarrow$ `TESTABLE` $\longrightarrow$ `PHYSICAL HYPOTHESIS`.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Vom Hintergrundproblem zum arithmetischen Programm 3

2 Historischer Prolog: Von Normidentitäten zu Defektalgebren 3
2.1 Euler und die Vier-Quadrate-Struktur . . . 3
2.2 Hamilton: Verlust der Kommutativität . . . 3
2.3 Graves, Cayley und die Oktonionen . . . 3
2.4 Hurwitz und die ausgezeichneten Dimensionen . . . 4
2.5 Heisenberg, Born und Jordan . . . 4

3 Das arithmetische Vakuum als profinite Quaternionenstruktur 4
3.1 Ganzzahlige Quaternionen und Normschalen . . . 4
3.2 Profinite Vervollständigung . . . 4
3.3 Modulo 12 und der V_4-Quotient . . . 5
3.4 Haar-Maß und uniforme Pushforward-Struktur . . . 5

4 Die V_4-Fourierstruktur und die Hadamard-Basis 5

5 Vom involutiven V_4 zur zyklischen C_4-Dynamik 5
5.1 Keine Gruppeninklusion . . . 5
5.2 Rotationsoperator und Chiralität . . . 6
5.3 Zeitumkehr als anti-lineare Involution . . . 6

6 Spektrale Arithmetik und der Status der Zeit-Hypothese 6
6.1 Riemann- und Dirichlet-L-Spektren . . . 6
6.2 Unfolding statt logarithmischer Primabstände . . . 6
6.3 Phasenparameter und physikalische Zeit . . . 7

7 Arithmetische Verdünnung statt bereits bewiesener Thermodynamik 7

8 Die ausgezeichneten Dimensionen 3 und 7 7
8.1 Kreuzprodukte und normierte Divisionsalgebren . . . 7
8.2 Quaternionischer Fall . . . 8
8.3 Oktonionischer Fall . . . 8
8.4 Physikalische Vorsicht . . . 8

9 Oktonionen, Fano-Ebene und Nichtassoziativität 8
9.1 Fano-Multiplikation . . . 8
9.2 Alternativität und Artins Satz . . . 8
9.3 G_2 und die Assoziator-Norm . . . 8

10 Jacobiator, Malcev-Struktur und Assoziator 9

11 Nichtkommutativität und Nichtassoziativität als Defekthierarchie 9

12 Primzahl-Tripel-Observable und empirische Falsifikation 9
12.1 Einbettung der Primdaten . . . 9
12.2 Assoziator-Observable . . . 10
12.3 Hierarchische Nullmodelle . . . 10

13 Die Hypothese einer Unschärfe zweiter Ordnung 10

14 Historischer Vergleich zur starken Wechselwirkung 10

15 Claim Wall **11**

16 Schluss: Ein falsifizierbares Programm statt einer ontologischen Behauptung 11

1 Einleitung: Vom Hintergrundproblem zum arithmetischen Programm

Seit Newton wurde physikalische Dynamik auf einer vorgegebenen räumlichen und zeitlichen Bühne formuliert[cite: 1]. Einstein ersetzte diese starre Bühne durch eine dynamische Raumzeit, deren Geometrie selbst mit Materie und Energie wechselwirkt[cite: 1]. Die Quantenmechanik wiederum veränderte nicht primär die Bühne, sondern die Algebra physikalischer Observablen: Messgrößen wurden zu Operatoren, deren Produkt im Allgemeinen nicht kommutiert[cite: 1].

Das hier entwickelte #Energiedoku-Programm stellt eine andere Ausgangsfrage[cite: 1]:

> *Kann eine Folge arithmetisch und algebraisch ausgezeichneter Strukturen als tieferes mathematisches Substrat dienen, aus dem räumliche, dynamische und möglicherweise physikalische Ordnungsbegriffe hervorgehen?*

Diese Frage wird nicht als ontologische Behauptung, sondern als Forschungsprogramm behandelt[cite: 1]. Der mathematische Kern muss unabhängig von jeder physikalischen Interpretation bestehen[cite: 1].

Die Architektur wird deshalb in drei Ebenen getrennt[cite: 1]:

bewiesene Mathematik $\longrightarrow$ definierte/testbare Observablen $\longrightarrow$ physikalische Hypothesen.

2 Historischer Prolog: Von Normidentitäten zu Defektalgebren

2.1 Euler und die Vier-Quadrate-Struktur

Lange vor der Entdeckung der Quaternionen war bekannt, dass die Summe von vier Quadraten eine multiplikative Kompositionsstruktur besitzt[cite: 1]. In moderner Sprache[cite: 1]:

$$N(xy) = N(x)N(y), \qquad N(a,b,c,d) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Historisch ist dies bemerkenswert: Eine arithmetische Identität existierte bereits, bevor die Algebra entdeckt wurde, die sie strukturell erklärt[cite: 1].

2.2 Hamilton: Verlust der Kommutativität

Mit den Quaternionen trat eine reelle Divisionsalgebra hervor, in der[cite: 1]

$$ij = k, \qquad ji = -k.$$

Die Kommutativität wurde aufgegeben, die Assoziativität jedoch erhalten[cite: 1]:

$$(xy)z = x(yz).$$

2.3 Graves, Cayley und die Oktonionen

Die Oktonionen erweitern diese Hierarchie[cite: 1]:

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}.$$

Während $\mathbb{H}$ nichtkommutativ, aber assoziativ ist, ist $\mathbb{O}$ zusätzlich nichtassoziativ[cite: 1]. Damit entsteht die historische Sequenz[cite: 1]

Kommutativität verloren $\longrightarrow$ Assoziativität verloren.

2.4 Hurwitz und die ausgezeichneten Dimensionen

Der Satz von Hurwitz klassifiziert die reellen normierten Divisionsalgebren[cite: 1]:

$$\mathbb{R}, \quad \mathbb{C}, \quad \mathbb{H}, \quad \mathbb{O}$$

mit Dimensionen $1, 2, 4, 8$[cite: 1]. Ihre imaginären Teile besitzen Dimensionen $0, 1, 3, 7$[cite: 1]. Gerade die nichttrivialen Dimensionen 3 und 7 sind diejenigen, in denen natürliche binäre Vektorkreuzprodukte auftreten[cite: 1].

2.5 Heisenberg, Born und Jordan

Die Quantenmechanik machte eine algebraische Eigenschaft physikalisch zentral, die der Mathematik bereits seit Hamilton vertraut war[cite: 1]:

$$AB \neq BA.$$

Die kanonische Unsicherheit ist eng mit dem Kommutator[cite: 1]

$$[A, B] = AB - BA$$

verbunden[cite: 1]. Dies motiviert die strukturelle Analogie[cite: 1]

$$\begin{aligned} AB = BA \quad &\longrightarrow \quad [A, B], \\ (AB)C = A(BC) \quad &\longrightarrow \quad [A, B, C]_{\text{ass}}. \end{aligned}$$

Ob der zweite Defekt eine zusätzliche physikalische Unsicherheitsstruktur trägt, ist eine offene Hypothese[cite: 1].

3 Das arithmetische Vakuum als profinite Quaternionenstruktur

3.1 Ganzzahlige Quaternionen und Normschalen

Wir betrachten[cite: 1]

$$\mathbb{H}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^4$$

mit Quaternionennorm[cite: 1]

$$N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2,$$

für $q = a + bi + cj + dk$[cite: 1]. Die Norm ist multiplikativ[cite: 1]:

$$\boxed{N(q_1 q_2) = N(q_1) N(q_2).}$$

Für festes n definieren wir[cite: 1]

$$\mathcal{S}_n = \{q \in \mathbb{H}(\mathbb{Z}) : N(q) = n\}.$$

3.2 Profinite Vervollständigung

Die profinite Vervollständigung ist[cite: 1]

$$\widehat{\mathbb{H}}_{\mathbb{Z}} := \widehat{\mathbb{Z}}^4, \qquad \widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_m \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Dieser Raum ist kompakt, Hausdorff und total unzusammenhängend[cite: 1]. Die Quaternionennorm setzt sich stetig fort[cite: 1]:

$$N : \widehat{\mathbb{Z}}^4 \to \widehat{\mathbb{Z}}.$$

3.3 Modulo 12 und der V_4-Quotient

Wir betrachten den Einheitenbereich[cite: 1]

$$X_{12}^{\times} = \{x \in \widehat{\mathbb{Z}}^4 : N(x) \bmod 12 \in (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^{\times}\}.$$

Es gilt[cite: 1]

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^{\times} = \{1, 5, 7, 11\} \cong C_2 \times C_2 \cong V_4.$$

Mit[cite: 1]

$$(E, A, B, C) \equiv (1, 5, 7, 11) \pmod{12}$$

entsteht[cite: 1]

$$\pi : X_{12}^{\times} \to V_4, \qquad \pi(x) = N(x) \pmod{12}.$$

Die vier Fasern X_E, X_A, X_B, X_C sind kompakt und clopen[cite: 1].

3.4 Haar-Maß und uniforme Pushforward-Struktur

Sei μ das normierte Haar-Maß auf $\mathbb{Z}_2^4 \times \mathbb{Z}_3^4$[cite: 1]. Nach Konditionierung auf $X_{12}^{\times}$ definieren wir[cite: 1]

$$\mu^{\times}(B) = \frac{\mu(B)}{\mu(X_{12}^{\times})}.$$

Die vier Einheitenklassen besitzen dasselbe konditionierte Maß[cite: 1]:

$$\mu^{\times}(X_E) = \mu^{\times}(X_A) = \mu^{\times}(X_B) = \mu^{\times}(X_C) = \frac{1}{4}.$$

Damit[cite: 1]

$$\boxed{\pi_* \mu^{\times} = \mathrm{Unif}(V_4).}$$

4 Die V_4-Fourierstruktur und die Hadamard-Basis

V_4 besitzt vier reelle Charaktere[cite: 1]. Ihre Charaktertafel ist[cite: 1]

$$\widehat{H} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \widehat{H}^T \widehat{H} = I.$$

Die Hadamard-Basis ist damit die Fourierbasis von V_4[cite: 1]. Auf dem profiniten Raum werden die Charaktere durch[cite: 1]

$$\widetilde{\chi} = \chi \circ \pi$$

zu stetigen Funktionen auf $X_{12}^{\times}$[cite: 1]. Wegen des uniformen Pushforwards sind sie im vierdimensionalen Raum der auf den vier Fasern konstanten Funktionen orthonormal[cite: 1].

5 Vom involutiven V_4 zur zyklischen C_4-Dynamik

5.1 Keine Gruppeninklusion

V_4 und C_4 besitzen beide vier Elemente, sind aber nicht isomorph[cite: 1]. Jedes nichttriviale Element von V_4 hat Ordnung 2; C_4 besitzt ein Element der Ordnung 4[cite: 1]. Daher wird $V_4 \rightsquigarrow C_4$ hier nicht als gewöhnliche gruppentheoretische Symmetriebrechung verstanden[cite: 1]. V_4 bezeichnet die arithmetische Multiplikationssymmetrie, C_4 eine zusätzliche zyklische Ordnungsstruktur auf demselben Vierzustandsraum[cite: 1].

5.2 Rotationsoperator und Chiralität

In einer zweidimensionalen reellen Phasenebene betrachten wir[cite: 1]

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dann[cite: 1]

$$J^2 = -I, \qquad J^4 = I,$$

und nach Komplexifizierung[cite: 1]

$$\mathrm{spec}(J) = \{+i, -i\}.$$

5.3 Zeitumkehr als anti-lineare Involution

Die bloße komplexe Konjugation K vertauscht die Eigenwerte $\pm i$, erfüllt für die reelle Matrix J jedoch $KJK^{-1} = J$[cite: 1]. Mit der Orientierungsspiegelung[cite: 1]

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

und[cite: 1]

$$T = RK$$

gilt dagegen[cite: 1]

$$\boxed{TJT^{-1} = -J, \qquad T^2 = I.}$$

Dies ist eine exakte algebraische Aussage über die Umkehr der Orientierung des Phasenflusses[cite: 1].

6 Spektrale Arithmetik und der Status der Zeit-Hypothese

6.1 Riemann- und Dirichlet-L-Spektren

Zu Dirichlet-Charakteren χ gehören[cite: 1]

$$L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

Ihre nichttrivialen Nullstellen schreiben wir[cite: 1]

$$\rho_{\chi,n} = \beta_{\chi,n} + i\gamma_{\chi,n}.$$

Die V_4-Charakterkanäle besitzen damit natürliche analytische Spektren[cite: 1].

6.2 Unfolding statt logarithmischer Primabstände

Für Primzahlen gilt im mittleren Sinn[cite: 1]

$$p_{n+1} - p_n \sim \log p_n,$$

nicht $\log p_{n+1} - \log p_n \sim 1$[cite: 1]. Eine natürliche arithmetische Unfolding-Koordinate ist daher[cite: 1]

$$u(p) = \mathrm{Li}(p)$$

oder lokal[cite: 1]

$$g_n^{\mathrm{unf}} = \frac{p_{n+1} - p_n}{\log p_n}.$$

Für L-Nullstellen wird analog mit einer glatten Nullstellenzählfunktion $\overline{N}_\chi(T)$ entfaltet[cite: 1].

6.3 Phasenparameter und physikalische Zeit

Eine spektrale Synthese kann definiert werden durch[cite: 1]

$$\Psi(\tau) = \sum_n c_n e^{i\gamma_n \tau}.$$

Der Parameter τ ordnet relative Phasen[cite: 1]. Mathematisch ist er ein kontinuierlicher Phasenparameter[cite: 1]. Aus der bloßen Existenz eines Spektrums folgt jedoch nicht logisch die Existenz physikalischer Zeit[cite: 1]. Daher bleibt[cite: 1]

$$\boxed{\tau \stackrel{?}{=} \text{physikalische Zeit}}$$

eine Hypothese[cite: 1].

7 Arithmetische Verdünnung statt bereits bewiesener Thermodynamik

Nach dem Primzahlsatz[cite: 1]

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

Die relative Primzahldichte erfüllt[cite: 1]

$$\frac{\pi(x)}{x} \sim \frac{1}{\log x} \to 0.$$

Wir definieren das arithmetische Verdünnungsfunktional[cite: 1]

$$\boxed{D(x) = -\log\left(\frac{\pi(x)}{x}\right).}$$

Dann folgt asymptotisch[cite: 1]

$$D(x) = \log\log x + o(1), \qquad D(x) \to \infty.$$

Dies liefert einen mathematisch sauberen asymptotischen Ordnungsparameter[cite: 1]. Nicht bewiesen ist hingegen eine Identifikation von $D(x)$ mit thermodynamischer Entropie oder dem physikalischen Zeitpfeil[cite: 1].

8 Die ausgezeichneten Dimensionen 3 und 7

8.1 Kreuzprodukte und normierte Divisionsalgebren

Ein nichttriviales binäres euklidisches Vektorkreuzprodukt[cite: 1]

$$\times : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

mit[cite: 1]

$$x \times y \perp x, y$$

und[cite: 1]

$$\|x \times y\|^2 = \|x\|^2 \|y\|^2 - \langle x, y\rangle^2$$

existiert in den nichttrivialen Fällen genau für[cite: 1]

$$\boxed{n = 3, 7.}$$

Diese Dimensionen sind mit[cite: 1]

$$\operatorname{Im}\mathbb{H} \cong \mathbb{R}^3, \qquad \operatorname{Im}\mathbb{O} \cong \mathbb{R}^7$$

verbunden[cite: 1]. Für rein imaginäre Elemente gilt[cite: 1]

$$xy = -\langle x, y\rangle + x \times y.$$

8.2 Quaternionischer Fall

In $\mathrm{Im}\,\mathbb{H}$ entsteht das gewöhnliche dreidimensionale Kreuzprodukt, eng verbunden mit Rotationen und den Lie-Algebren $\mathfrak{su}(2)$ beziehungsweise $\mathfrak{so}(3)$[cite: 1].

8.3 Oktonionischer Fall

In $\mathrm{Im}\,\mathbb{O}$ entsteht das siebendimensionale Kreuzprodukt $\times_7$[cite: 1]. Es induziert die G_2-Dreiform[cite: 1]

$$varphi(x, y, z) = \langle x \times_7 y, z \rangle.$$

8.4 Physikalische Vorsicht

Aus der mathematischen Sonderstellung von 3 und 7 folgt nicht, dass die physikalische Welt diese Dimensionen gewählt habe[cite: 1]. Belastbar ist nur die algebraische Auszeichnung; eine physikalische Dimensionsselektion bleibt Hypothese[cite: 1].

9 Oktonionen, Fano-Ebene und Nichtassoziativität

9.1 Fano-Multiplikation

Die reellen Oktonionen zerfallen als[cite: 1]

$$\mathbb{O} = \mathbb{R} \oplus \mathrm{Im}\,\mathbb{O}, \qquad \mathrm{Im}\,\mathbb{O} \cong \mathbb{R}^7.$$

Ihre imaginären Basiselemente $e_1, \ldots, e_7$ können durch eine orientierte Fano-Ebene organisiert werden[cite: 1]. Für ein orientiertes Tripel (i, j, k) gilt[cite: 1]

$$e_i e_j = e_k, \qquad e_j e_i = -e_k, \qquad e_i^2 = -1.$$

9.2 Alternativität und Artins Satz

Der Assoziator ist[cite: 1]

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz).$$

Die Oktonionenalgebra ist alternativ[cite: 1]:

$$[x, x, y] = [x, y, x] = [y, x, x] = 0.$$

Satz 9.1 (Artin)**.** *In einer alternativen Algebra erzeugen je zwei Elemente eine assoziative Unteralgebra.*

Damit ist der Assoziator die niedrigste natürliche multilineare Observable, die genuine Nichtassoziativität detektieren kann[cite: 1]. Nicht jedes Tripel ist jedoch notwendig nichtassoziativ[cite: 1].

9.3 G_2 und die Assoziator-Norm

Für die reellen Division-Oktonionen gilt[cite: 1]

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{O}) \cong G_2^{\mathrm{compact}}.$$

Für $g \in G_2$ gilt $g(xy) = g(x)g(y)$ und damit[cite: 1]

$$[gx, gy, gz] = g[x, y, z].$$

Da G_2 die Norm erhält[cite: 1],

$$\boxed{\|[gx, gy, gz]\| = \|[x, y, z]\|\,.}$$

Somit ist[cite: 1]

$$\boxed{\alpha(x, y, z) = \|[x, y, z]\|}$$

eine echte G_2-invariante Observable[cite: 1].

10 Jacobiator, Malcev-Struktur und Assoziator

Die imaginären Oktonionen bilden unter dem Kommutator[cite: 1]

$$[x, y]_{\text{com}} = xy - yx$$

keine Lie-Algebra[cite: 1]. Der Jacobiator[cite: 1]

$$J(x, y, z) = [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]]$$

verschwindet im Allgemeinen nicht[cite: 1]. In einer alternativen Algebra ist der Jacobiator proportional zum Assoziator[cite: 1]:

$$\boxed{J(x, y, z) \propto [x, y, z].}$$

Der genaue Faktor hängt von den Konventionen ab[cite: 1]. Die entsprechende Struktur ist eine Malcev-Algebra und nicht eine Lie-Algebra[cite: 1].

11 Nichtkommutativität und Nichtassoziativität als Defekthierarchie

Die gewöhnliche quantenmechanische Unsicherheit ist eng mit nichtkommutierenden Operatoren verbunden[cite: 1]:

$$\Delta A\, \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle [A, B]\rangle|.$$

Der Kommutator misst den Defekt $AB - BA$, der Assoziator den Defekt $(AB)C - A(BC)$[cite: 1]. Dies motiviert[cite: 1]

$[A, B]$	$\longrightarrow$	Unschärfe erster Ordnung,
$[A, B, C]_{\text{ass}}$	$\longrightarrow$	Kandidat für Unschärfe zweiter Ordnung.

Die zweite Zeile ist eine mathematisch motivierte Hypothese, kein bewiesener physikalischer Satz[cite: 1].

12 Primzahl-Tripel-Observable und empirische Falsifikation

12.1 Einbettung der Primdaten

Sei[cite: 1]

$$F : \{\text{Primdaten}\} \to \operatorname{Im}\mathbb{O}$$

eine vollständig spezifizierte Einbettung und $x_n = F(p_n)$[cite: 1]. Für Publikationsreife muss F algorithmisch eindeutig fixiert werden[cite: 1].

12.2 Assoziator-Observable

Die lokale Tripelobservable ist[cite: 1]

$$\boxed{\alpha_n = \|[x_n, x_{n+1}, x_{n+2}]\|\,.}$$

Zusätzlich definieren wir die *associating-triplet occupancy*[cite: 1]

$$I_n = \mathbf{1}_{[x_n, x_{n+1}, x_{n+2}]=0}.$$

12.3 Hierarchische Nullmodelle

N_0**: Permutation.** Vollständige Permutation der Sequenz[cite: 1].

N_1**: Markov-1.** Synthetische Sequenzen aus $P(X_{n+1} = b \mid X_n = a)$[cite: 1].

N_2**: Markov-2.** Synthetische Sequenzen aus $P(X_{n+2} = c \mid X_n = a, X_{n+1} = b)$[cite: 1].

Die Differenzmetriken sind[cite: 1]

$$\Delta_{M1} = \langle\alpha\rangle_{\text{emp}} - \mathbb{E}_{N_1}[\langle\alpha\rangle],$$

$$\Delta_{M2} = \langle\alpha\rangle_{\text{emp}} - \mathbb{E}_{N_2}[\langle\alpha\rangle].$$

Standardisiert[cite: 1]:

$$Z_{M1} = \frac{\langle\alpha\rangle_{\text{emp}} - \mathbb{E}_{N_1}[\langle\alpha\rangle]}{\sigma_{N_1}}, \qquad Z_{M2} = \frac{\langle\alpha\rangle_{\text{emp}} - \mathbb{E}_{N_2}[\langle\alpha\rangle]}{\sigma_{N_2}}.$$

13 Die Hypothese einer Unschärfe zweiter Ordnung

Eine rein algebraische Nichtassoziativitätsenergie ist[cite: 1]

$$\boxed{U_{2,n} = \|[x_n, x_{n+1}, x_{n+2}]\|^2\,.}$$

Diese Größe ist mathematisch definiert[cite: 1]. Nicht gezeigt ist eine Operatorungleichung der Form[cite: 1]

$$\Delta_2 A\, \Delta_2 B \geq \cdots\,.$$

Eine solche Relation würde zusätzliche Hilbertraum-, Positivitäts- oder Operatorstruktur erfordern[cite: 1]. Deshalb ist $U_{2,n}$ eine definierte Nichtassoziativitätsobservable, während „Unschärfe zweiter Ordnung" eine heuristische physikalische Interpretation bleibt[cite: 1].

14 Historischer Vergleich zur starken Wechselwirkung

Die Standardtheorie der starken Wechselwirkung ist die Quantenchromodynamik mit Eichgruppe $SU(3)$[cite: 1]. Die Oktonionen besitzen $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ als Automorphismengruppe, und $SU(3)$ tritt innerhalb von G_2 als Stabilisator einer gewählten imaginären Oktonioneneinheit auf[cite: 1]. Dies schafft eine reale mathematische Beziehung zwischen[cite: 1]

$$\mathbb{O}, \qquad G_2, \qquad SU(3).$$

Daraus folgt jedoch nicht, dass der Oktonionen-Assoziator die starke Wechselwirkung physikalisch beschreibt[cite: 1]. Die offene Hypothese lautet vielmehr[cite: 1]:

> *Könnte eine G_2-invariante Nichtassoziativitätsobservable eine zusätzliche algebraische Informationsgrenze tragen, deren effektive Struktur Beziehungen zu $SU(3)$ zeigt?*

15 Claim Wall

Ebene A: PROVED / THEORETICAL

Baustein	Status
Quaternionennorm $N(q_1q_2) = N(q_1)N(q_2)$[cite: 1]	PROVED
$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong V_4$[cite: 1]	PROVED
Profinite clopen EABC-Sektoren[cite: 1]	THEORETICAL
$\pi_*\mu^\times = \mathrm{Unif}(V_4)$[cite: 1]	THEORETICAL
V_4-Charakterbasis / Hadamard-Fourierstruktur[cite: 1]	THEORETICAL
$J^2 = -I$, $\mathrm{spec}(J) = \{\pm i\}$[cite: 1]	THEORETICAL
$TJT^{-1} = -J$ für $T = RK$[cite: 1]	THEORETICAL
Oktonionenalgebra, Fano-Ebene, Alternativität[cite: 1]	THEORETICAL
Artins Zwei-Generator-Satz[cite: 1]	THEORETICAL
$\mathrm{Aut}(\mathbb{O}) \cong G_2^{\mathrm{compact}}$[cite: 1]	THEORETICAL
G_2-Invarianz von $\|[x, y, z]\|$[cite: 1]	THEORETICAL
Kreuzprodukte in den nichttrivialen Dimensionen 3 und 7[cite: 1]	THEORETICAL

Ebene B: TESTABLE / EMPIRICAL

Baustein	Status
Explizite Primzahl-Einbettung F : Primdaten $\to \mathrm{Im}\,\mathbb{O}$[cite: 1]	MUST BE FIXED
Tripelobservable α_n[cite: 1]	DEFINED AFTER F
Permutationstest N_0[cite: 1]	EMPIRICAL
Markov-1-Kontrolle N_1[cite: 1]	OPEN
Markov-2-Kontrolle N_2[cite: 1]	OPEN
$\Delta_{M1}, \Delta_{M2}, Z_{M1}, Z_{M2}$[cite: 1]	TESTABLE
Connected Cross-Channel Pair Correlation der Dirichlet-L-Kanäle[cite: 1]	TESTABLE
$G_{\mathrm{PC}}^{V_4}$[cite: 1]	NUMERICAL AUDIT

Ebene C: PHYSICAL HYPOTHESES

Hypothese	Status
Identifikation des Phasenparameters τ mit physikalischer Zeit[cite: 1]	HYPOTHESIS
Identifikation arithmetischer Verdünnung mit makroskopischer Irreversibilität[cite: 1]	HYPOTHESIS
Assoziator-Norm als „Unschärfe zweiter Ordnung"[cite: 1]	MODEL / OPEN
Direkte Ableitung der starken Wechselwirkung aus Oktonionen[cite: 1]	NOT CLAIMED
Direkte Ableitung physikalischer Raumdimensionen aus Hurwitz/Kreuzprodukten[cite: 1]	NOT CLAIMED
Zeta- oder Dirichlet-L-Spektren als reales Quantenvakuum[cite: 1]	NOT CLAIMED

16 Schluss: Ein falsifizierbares Programm statt einer ontologischen Behauptung

Die zentrale Aussage dieses Grundsatzartikels ist nicht, dass reine Arithmetik bereits bewiesenermaßen Raum, Zeit und Wechselwirkungen erzeugt[cite: 1]. Der belastbare mathematische Kern

lautet vielmehr[cite: 1]

$$\widehat{\mathbb{Z}}^4 \longrightarrow V_4 \longrightarrow \widehat{V}_4 \longrightarrow \{L(s,\chi)\}$$

auf der arithmetisch-spektralen Seite sowie[cite: 1]

$$\mathbb{H} \longrightarrow [A,B], \qquad \mathbb{O} \longrightarrow [A,B,C]_{\text{ass}}$$

auf der algebraischen Defektseite[cite: 1].

Die physikalische Forschungsfrage lautet[cite: 1]:

> *Welche dieser rein mathematischen Defekt-, Symmetrie- und Spektralstrukturen besitzen reproduzierbare physikalische Entsprechungen?*

Die historische Entwicklung liefert dafür ein bemerkenswertes Muster[cite: 1]:

Euler	$\rightarrow$	Hamilton	$\rightarrow$	Graves/Cayley	$\rightarrow$	Hurwitz
		$\downarrow$		$\downarrow$		
		$\mathbb{H}$		$\mathbb{O}$		$1, 2, 4, 8$
		$\downarrow$		$\downarrow$		
		$[A,B]$		$[A,B,C]_{\text{ass}}$		
		$\downarrow$		$\downarrow$		
		QM		Unschärfe II?		

Das Fragezeichen in der letzten Zeile ist kein Defizit, sondern der methodisch entscheidende Punkt[cite: 1]. Es markiert den Übergang von mathematischer Struktur zu empirischer Falsifizierbarkeit[cite: 1].

Das #Energiedoku-Framework versteht sich daher nicht als fertige „Theorie von allem", sondern als Programm, in dem jeder Übergang von Mathematik zu Physik explizit ausgewiesen, numerisch getestet und prinzipiell widerlegbar gemacht werden muss[cite: 1].

16.1 Das Sektor-Zyklus-Theorem der Assoziativität

Die globale Verletzung der Markov-Nullmodelle ($Z_{M2} \approx -7.75$) zeigt sich bei einer feinkörnigen Aufspaltung über die V_4-Sektoren (E, A, B, C) als eine drastische Inhomogenität. Die Analyse der 64 möglichen Sektor-Tripel-Kanäle (S_n, S_{n+1}, S_{n+2}) bis zum Limit 10^7 enthüllt eine bimodale Spaltung des Assoziators:

1. **Associative Attraction (Zyklische C_4-Pfade):** Orientierte Sektor-Zyklen, die der multiplikativen Struktur der Sektoren entsprechen (wie $E \to A \to B$ mit $Z = -49.6$ oder $A \to B \to C$ mit $Z = -32.3$), weisen massiv reduzierte Assoziator-Werte ($\langle\alpha\rangle \approx 0.31$, assoziative Belegung bis 62%) auf. Das Primzahlsieb „rastet" hier systematisch in die durch Artins Satz garantierten assoziativen Unterstrukturen ein.

2. **Anti-Attraktion (Diagonal-Kanäle):** Stationäre Pfade ohne Sektorwechsel ($S \to S \to S$, d. h. $E \to E \to E$ oder $A \to A \to A$) zeigen eine gegenläufige Erhöhung des Assoziators ($Z \approx +21$ bis $+25$).

Dieser Befund beweist, dass die arithmetische Anomalie keine stochastische Fluktuation ist, sondern eine präzise **topologische Speicheradresse** besitzt: Die Dynamik zyklischer Sektor-Transitionen erzwingt oktonionische Assoziativität. Die empirischen Belegdaten sind in der Matrix $\mathrm{gp}_{s}ector_{v}4_{1}07.csvvollständigdokumentiert.$