

# Théorie des Graphes

Jean-Charles Régin, Arnaud Malapert

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Remerciements

- Didier MAQUIN (voir son site web)
- Didier MULLER

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Livres

- Claude Berge : « Graphes »
- Michel Gondran et Michel Minoux : « Graphes et Algorithmes »
- Christian Prins : « Algorithmes de Graphes »
- Eugene Lawler : « Combinatorial Optimization »
- Ahuja, Magnanti et Orlin « Network Flows »
- R. Tarjan : « Data Structures and Network Algorithms »

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Introduction

Théorie des Graphes - 2015/2016


## Graphes : 3 aspects

- Communiquer / Visualiser
- Définir des problèmes
- Raisonner
- Pas que des algos : aussi des problèmes

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Histoire

Naissance en 1736, communication d'Euler où il propose une solution au problème des ponts de Königsberg




Dessin comportant des **sommets** (points) et des **arêtes** reliant ces sommets

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Histoire

- 1847 Kirchhoff  
théorie des arbres (analyse de circuits électriques)
- 1860 Cayley  
énumération des isomères saturés des hydrocarbures  $C_nH_{2n+2}$
- A la même époque, énoncé de problèmes importants
  - Conjecture des quatre couleurs (1879)  
(Möbius, De Morgan, Cayley, solution trouvée en 1976)
  - Existence de chemins Hamiltoniens (1859)
- 1936 König  
premier ouvrage sur les graphes
- 1946 → Kuhn, Ford, Fulkerson, Roy, Berge



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Définitions


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe : définitions

- Un Graphe Orienté (ou Digraph (directed graph))  $G=(X,U)$  est déterminé par la donnée :
  - d'un ensemble de **sommets** ou **nœuds**  $X$
  - d'un ensemble ordonné  $U$  de couples de sommets appelés **arcs**.
- Le nombre de sommets d'un arc est l'ordre du graphe
- Si  $u=(a,b)$  est un arc de  $G$  alors
  - $a$  est l'extrémité initiale de  $u$
  - $b$  l'extrémité terminale de  $u$ .
  - $b$  est le successeur de  $a$
  - $a$  et  $b$  sont adjacents
- Les arcs **ont un sens**. L'arc  $u=(a,b)$  va de  $a$  vers  $b$ .
- Ils peuvent être munit d'un coût, d'une capacité etc...

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe

- On note par  $\omega(i)$  : l'ensemble des arcs ayant  $i$  comme extrémité
- On note par  $\omega^+(i)$  : l'ensemble des arcs ayant  $i$  comme extrémité initiale = ensemble des arcs sortant de  $i$
- On note par  $\omega^-(i)$  : l'ensemble des arcs ayant  $i$  comme extrémité terminale = ensemble des arcs entrant dans  $i$
- $\Gamma(i)$  : ensemble des successeurs de  $i$
- $d^+(i)$  : degré sortant de  $i$  (nombre de successeurs)
- $d^-(i)$  : degré entrant de  $i$  (nombre de sommets pour lesquels  $i$  est un successeur)


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe non orienté

- Un Graphe non orienté  $G=(X,E)$  est déterminé par la donnée :
  - d'un ensemble de sommets ou nœuds  $X$
  - D'un ensemble  $E$  de paires de sommets appelées **arêtes**
- Les arêtes ne sont pas orientées

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe non orienté



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe : définitions

- Deux sommets sont voisins s'ils sont reliés par un arc ou une arête
- $N(i)$  : ensemble des voisins de  $i$  : ensemble des sommets  $j$  tels qu'il existe un arête contenant  $i$  et  $j$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe complet

- Un graphe  $G=(X,A)$  est dit **complet** si, pour toute paire de sommets  $(x,y)$ , il existe au moins un arc de la forme  $(x,y)$  ou  $(y,x)$ .
- Un graphe simple complet d'ordre  $n$  est noté  $K_n$ . Un sous-ensemble de sommets  $C \subset X$  tel que deux sommets quelconques de  $C$  sont reliés par une arête est appelé une **clique**.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercices

- Reliez le nombre d'arêtes et les degrés
- Montrez qu'un graphe simple a un nombre pair de sommets de degré impair
- Montrez que dans une assemblée de  $n$  personnes, il y en a toujours au moins 2 qui ont le même nombre d'amis présents
- Est-il possible de relier 15 ordinateurs de sorte que chaque appareil soit relié exactement à 3 autres ?

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercices (suite)

Essayez d'exprimer (et non nécessairement de résoudre...) en termes de graphes les problèmes suivants :

- Peut-on placer quatre dames sur un échiquier 4x4 sans qu'aucune d'elles ne puisse en prendre une autre ?
- Un cavalier peut-il se déplacer sur un échiquier en passant sur chacune des cases une fois et une seule ?
- Combien doit-on placer de dames sur un échiquier 5x5 afin de contrôler toutes les cases ?

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Représentation des graphes en machine

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Représentation des graphes

- 3 types de représentation qui ont chacune leur avantage et inconvénient

- Liste de successions
- Matrice d'adjacence
- Matrice d'incidence

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Liste de succession


### Listes de succession

1	2, 3, 4, 5
2	3
3	4
4	-
5	1, 4


Successeurs

1	5
2	1
3	1, 2
4	1, 3, 5
5	1

Prédécesseurs



Représentation machine



Théorie des Graphes - 2015/2016


## Matrice d'adjacence

Considérons un graphe  $G=(X, A)$  comportant  $n$  sommets. La **matrice d'adjacence** de  $G$  est égale à la matrice  $U=(u_{ij})$  de dimension  $n \times n$  telle que :

$$u_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j) \in A \text{ (c'est-à-dire } (i, j) \text{ est une arête)} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$


Une telle matrice, ne contenant que des « 0 » et des « 1 » est appelée **matrice booléenne**.

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Matrice d'adjacence




$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow 2$$

### Propriétés

➤ la somme des éléments de la  $i^{\text{ème}}$  ligne de  $U$  est égale au degré sortant  $d_s(x_i)$  du sommet  $x_i$  de  $G$ .

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Matrice d'adjacence



$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

### Propriétés

- la somme des éléments de la  $i^{\text{ème}}$  ligne de  $U$  est égale au degré sortant  $d_s(x_i)$  du sommet  $x_i$  de  $G$ .
- la somme des éléments de la  $j^{\text{ème}}$  colonne de  $U$  est égale au degré entrant  $d_e(x_j)$  du sommet  $x_j$  de  $G$ .
- $U$  est symétrique si, et seulement si, le graphe  $G$  est symétrique.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Matrice d'incidence

Considérons un graphe orienté sans boucle  $G=(X, A)$  comportant  $n$  sommets  $x_1, \dots, x_n$  et  $m$  arêtes  $a_1, \dots, a_m$ . On appelle **matrice d'incidence (aux arcs)** de  $G$  la matrice  $M=(m_{ij})$  de dimension  $n \times m$  telle que :

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \text{ est l'extrémité initiale de } a_j \\ -1 & \text{si } x_i \text{ est l'extrémité terminale de } a_j \\ 0 & \text{si } x_i \text{ n'est pas une extrémité de } a_j \end{cases}$$


INVERSE

Pour un graphe non orienté sans boucle, la matrice d'incidence (aux arêtes) est définie par :

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \text{ est une extrémité de } a_j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Matrice d'incidence



Arc 1 2 3 4 5 6 7 8

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix}$$

Sommet

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercices

- Pour chacune des représentations, calculer le coût des opérations suivantes
  - ▣ Est-ce que i et j sont reliés ?
  - ▣ Combien i a-t-il de voisins ?
  - ▣ Quels sont les voisins de i ?
  - ▣ Supprimer l'arc (a,b)
  - ▣ Supprimer le premier voisin de i

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercices

- Tracer la matrice d'adjacence du graphe
- 
- On a calculé ci-dessous les matrices  $M^2$  et  $M^3$  ( $M$  est la matrice ci-dessus). Pour chacune de ces matrices, à quoi correspondent les nombres obtenus ?

$$M^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad M^3 = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 8 & 7 & 7 \\ 2 & 0 & 4 & 2 & 2 \\ 8 & 4 & 6 & 8 & 8 \\ 7 & 2 & 8 & 6 & 7 \\ 7 & 2 & 8 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemins, chaînes, cycles et circuit

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chaîne

- Une **chaîne** est une séquence finie et alternée de sommets et d'arêtes, débutant et finissant par des sommets, telle que chaque arête est incidente avec les sommets qui l'encadrent dans la séquence.
- Le premier et le dernier sommet sont appelés (**sommets**) **extrémités** de la chaîne.
- La **longueur** de la chaîne est égale au nombre d'arêtes qui la composent.
- Si aucun des sommets composant la séquence n'apparaît plus d'une fois, la chaîne est dite **chaîne élémentaire**.
- Si aucune des arêtes composant la séquence n'apparaît plus d'une fois, la chaîne est dite **chaîne simple**.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Cycle

- Un **cycle** est une chaîne dont les extrémités coïncident.
- Un **cycle élémentaire** (tel que l'on ne rencontre pas deux fois le même sommet en le parcourant) est un cycle minimal pour l'inclusion, c'est-à-dire ne contenant strictement aucun autre cycle.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin

- Un **chemin** est une séquence finie et alternée de sommets et d'arcs, débutant et finissant par des sommets, telle que chaque arc est sortant d'un sommet et incident au sommet suivant dans la la séquence (cela correspond à la notion de chaîne « orientée »).
- Si aucun des sommets composant la séquence n'apparaît plus d'une fois, le chemin est dit **chemin élémentaire**.
- Si aucune des arêtes composant la séquence n'apparaît plus d'une fois, le chemin est dit **chemin simple**.
- Un **circuit** est un chemin dont les extrémités coïncident.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice : matrice d'adjacence

On considère un graphe  $G = (E, U)$  avec  $E = \{A, B, C, D, E\}$  et  $M$  sa matrice associée.

- Tracer le graphe représentatif de cette matrice.
- Déterminer la matrice d'incidence de ce graphe.
- Calculer  $M^i$ ,  $i \in \{1, 2, 3\}$ . Rappeler la signification des coefficients non nuls de ces matrices.
- Calculer  $A = I + M + M^2 + M^3 + M^4$ . Donner une interprétation de  $A$ .


$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice : matrice d'adjacence

33

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M^4 = 0$$

$$I + M + M^2 + M^3 + M^4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice: jeu des allumettes

34

Deux joueurs disposent de deux tas de trois allumettes, à tour de rôle chaque joueur peut enlever une ou deux allumettes dans un des tas. Le joueur qui retire la dernière allumette perd la partie.


- Modéliser le jeu à l'aide d'un graphe.
- Que doit jouer le premier joueur pour gagner à coup sûr ?

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe d'état

35


- Chaque état est représenté par un sommet  $(x,y)$  indiquant le nombre d'allumettes de chaque tas.
- On élimine les symétries entre les états ( $x \geq y$ ).
- Il existe un arc entre deux sommets A et B s'il est possible de passer de l'état A à l'état B par une transition valide (enlever une ou deux allumettes dans un des tas).
- Notez que la transition entre  $(2,0)$  est  $(0,0)$  correspond à un suicide, alors qu'on peut jouer un coup gagnant.



## Stratégie gagnante

36

- Il faut retirer deux allumettes d'un tas.
- Quel que soit le coup joué par l'adversaire, on peut jouer un coup gagnant.



## Exercice : Die Hard !

37

- On souhaite prélever 4 litres de liquide dans un tonneau. Pour cela, nous avons à notre disposition deux récipients (non gradués !), l'un de 5 litres, l'autre de 3 litres...
- Comment doit-on faire ?

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice : Die Hard !

38


- Chaque état est représenté par un sommet  $(x,y)$  indiquant le nombre de litres dans la grande et la petite bouteille.
- Il existe un arc entre deux sommets A et B s'il est possible de passer de l'état A à l'état B par une transition valide :
  - vider une bouteille (V);
  - remplir une bouteille (R);
  - transvaser le contenu de la bouteille A dans la bouteille B jusqu'à ce que la bouteille A soit vide ou la bouteille B soit pleine (T).
- Solution :  $(0,0) \rightarrow R \rightarrow (5,0) \rightarrow T \rightarrow (2,3) \rightarrow V \rightarrow (2,0) \rightarrow T \rightarrow (0,2) \rightarrow R \rightarrow (5,2) \rightarrow T \rightarrow (4,3)$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice : dénombrement de chemins

39


- Supposons une grille de dimensions  $n \times m$  (par ex.  $4 \times 4$ ).
- Quelle est la longueur d'un plus court chemin entre A et B ?
- Comment pouvez-vous représenter un tel chemin ?
- Combien y a-t-il de plus courts chemins entre A et B ?



## Exercice : dénombrement de chemins


40

- Supposons une grille de dimensions  $n \times m$  (par ex.  $4 \times 4$ ).
- Combien y a-t-il de plus courts chemins entre A et B ?



## Exercice 2 : dénombrement de chemins

- 41
- #AB est le nombre de plus courts chemins entre A et B.
  - #AB =  $2 * (\#AC * \#CB + \#ADB)$
  - #AB =  $2 * (C(1, 3+1)^2 + 1)$
  - #AB =  $2 * (16+1) = 34$



Théorie des Graphes - 2015/2016


## Graphes eulériens

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chaîne et cycle eulérien

43 Soit un graphe orienté  $G=(X, A)$ .

- Une **chaîne eulérienne** est une chaîne empruntant une fois et une fois seulement chaque arête de  $G$ .
- Un **cycle eulérien** est une chaîne eulérienne dont les extrémités coïncident.
- Un graphe possédant un cycle eulérien est appelé **graphe eulérien**.



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Existence chaîne eulérienne

### Théorème 1

- Un graphe non orienté connexe possède une chaîne eulérienne si et seulement si le nombre de sommets de degré impair est égal à 0 ou 2.
- Il admet un cycle eulérien si et seulement si tous ses sommets ont un degré pair.

### Condition nécessaire

En chaque sommet, le nombre d'arcs incidents doit être égal au nombre d'arcs sortants, les sommets doivent donc être de degré pair.

Dans le cas d'une chaîne, les deux extrémités font exception ; on part ou on arrive une fois de plus, d'où un degré impair pour ces deux sommets extrémités.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Trouver une chaîne eulérienne


### Condition nécessaire

Soit  $a$  et  $b$  deux sommets de degré impair (s'il n'y en a pas  $a$  et  $b$  sont confondus).

Soit  $L$  la chaîne parcourue en partant de  $a$  (avec l'interdiction d'emprunter deux fois la même arête).

Si l'on arrive à un sommet  $x \neq b$ , on a utilisé un nombre impair d'arêtes incidentes à  $x$ . On peut donc « repartir » par une arête non déjà utilisée.


Quand on ne peut plus bouger, c'est qu'on est en  $b$ . Si toutes les arêtes ont été utilisées, on a parcouru une chaîne eulérienne.



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Trouver une chaîne eulérienne


Si toutes les arêtes n'ont pas été utilisées, on greffe, dans la chaîne, des cycles eulériens




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercices

- 47
- Les graphes suivants sont-ils eulériens ?



- Est-il possible de tracer une courbe, sans lever le crayon, qui coupe chacun des 16 segments de la figure suivante exactement une fois ?




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercices

- 48
- Le degré de A,B et D est 5
  - Le degré de E et C est 4
  - Le degré de A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, E1 et E2 est 9.

Il est impossible de tracer une courbe, sans lever le crayon, qui coupe les 16 segments car il y a plus de deux sommets de degré impair.



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercices

49

- Soit  $G$  un graphe non eulérien. Est-il toujours possible de rendre  $G$  eulérien en lui rajoutant un sommet et quelques arêtes ?
- On considère des dominos dont les faces sont numérotées 1, 2, 3, 4 ou 5.
  - En excluant les dominos doubles, de combien de dominos dispose-t-on ?
  - Montrez que l'on peut arranger ces dominos de façon à former une boucle fermée (en utilisant la règle habituelle de contact entre les dominos).
  - Pourquoi n'est-il pas nécessaire de considérer les dominos doubles ?
  - Si l'on prend maintenant des dominos dont les faces sont numérotées de 1 à  $n$ , est-il possible de les arranger de façon à former une boucle fermée ?

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Correction : rendre un graphe eulérien

50

- Soit  $G$  un graphe non eulérien. Est-il toujours possible de rendre  $G$  eulérien en lui rajoutant un sommet et quelques arêtes ?
  - On ajoute un nouveau sommet que l'on relie à tous les sommets de degré impair. Ces sommets ont maintenant un degré pair dans le graphe modifié.
  - Dans le graphe original, il y avait un nombre pair de sommets de degré impair, le nouveau sommet a donc un degré pair.
  - Ainsi, tous les sommets ont maintenant un degré pair et le graphe est eulérien.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Correction : dominos

51

- Si l'on prend maintenant des dominos dont les faces sont numérotées de 1 à  $n$ , est-il possible de les arranger de façon à former une boucle fermée ?
  - Les sommets du graphes sont les nombres de 1 à  $n$ .
  - Chaque sommet est relié à tous les autres sommets. Chaque arc  $(i, j)$  représente un domino.
  - En fait, le graphe est complet. Le degré d'un sommet est  $n-1$ .
  - Si  $n$  est paire, tous les sommets ont un degré impair et le graphe n'est pas eulérien.
  - Si  $n$  est impaire, tous les sommets ont un degré pair et le graphe est eulérien.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin et circuit eulérien

52

- Soit un graphe orienté  $G=(X, A)$ .
- Un chemin dans un graphe orienté est dit **eulérien** s'il passe exactement une fois par chaque arc.
- Un graphe orienté est dit **eulérien** s'il admet un **circuit eulérien**.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin et circuit eulérien

53

- Un graphe orienté connexe admet un **chemin eulérien** (mais pas de circuit eulérien) si, et seulement si, pour tout sommet sauf deux ( $a$  et  $b$ ), le degré entrant est égal au degré sortant et
$$d_e(a)=d_s(a)-1 \quad \text{et} \quad d_e(b)=d_s(b)+1$$
- Un graphe orienté connexe admet un **circuit eulérien** si, et seulement si, pour tout sommet, le degré entrant est égal au degré sortant.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin hamiltonien

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin hamiltonien

55

Soit  $G=(X, A)$  un graphe connexe d'ordre  $n$ .

- On appelle **chemin hamiltonien** (**chaîne hamiltonienne**) un chemin (une chaîne) passant une fois, et une fois seulement, par chacun des sommets de  $G$ .
- Un chemin hamiltonien (une chaîne hamiltonienne) est donc un chemin (une chaîne) élémentaire de longueur  $n-1$ .
- Un **circuit hamiltonien** (un **cycle hamiltonien**) est un circuit (un cycle) qui passe une fois, et une seule fois, par chacun des sommets de  $G$ .
- On dit qu'un graphe  $G$  est hamiltonien s'il contient un cycle hamiltonien (cas non orienté) ou un circuit hamiltonien (cas orienté).

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Traveling Salesman Problem (TSP)

56

- **Données** : une liste de villes et leurs distances deux à deux.
- **Question** : trouver le plus petit tour qui visite chaque ville exactement une fois.
- Reformulation plus mathématique :
  - Etant donné un graphe complet pondéré, trouver un cycle hamiltonien de poids minimum

Théorie des Graphes - 2015/2016



## TSP

57



Chaque ville est visitée une et une seule fois  
Un seul tour (pas de sous-tour)

Théorie des Graphes - 2015/2016

## TSP

58



Chaque ville est visitée une et une seule fois  
Un seul tour (pas de sous-tour)

Théorie des Graphes - 2015/2016

## TSP

59

- Certains problèmes sont équivalents au problème du TSP.  
Exemple : problème d'ordonnancement : trouver l'ordre dans lequel on doit construire des objets avec des presses hydrauliques
- La version « pure » du TSP n'est pas fréquente en pratique.  
On a souvent des problèmes qui sont
  - Non euclidiens
  - Asymétriques
  - Recouvrement de sous-ensembles de nœuds et non pas de tous les nœuds
- Ces variations ne rendent pas le problème plus facile.
- Problème assez commun
  - Vehicle routing (time windows, pickup and delivery...)

Théorie des Graphes - 2015/2016

60



Procter and Gamble Contest 1962

61



USA 13,509 cities. Solved in 1998

Théorie des Graphes - 2015/2016

## German Tour

62

- Le 20 Avril 2001, David Applegate, Robert Bixby, Vašek Chvátal, et William Cook ont annoncé la résolution du TSP pour les 15 112 villes d'Allemagne.
- Réseau de 110 processeurs (550 Mhz) à l'université de Rice et de Princeton.
- Le temps total d'utilisation des ordinateurs a été de **22.6 années.**

Théorie des Graphes - 2015/2016

63



Germany 15,112 cities. Solved in 2001

Théorie des Graphes - 2015/2016

64



Sweden 24,978 cities. Solved in 2004

Théorie des Graphes - 2015/2016





VLSI 85,900, Solved in 2006  
Théorie des Graphes - 2015/2016

## TSP

- Il existe plusieurs solveurs
- Le plus connu est Concorde de William Cook (gratuit)


## Chemin hamiltonien

### Ordonnancement de tâches

- On cherche un ordre dans lequel on peut effectuer  $n$  tâches données (deux tâches quelconques ne pouvant être effectuées simultanément) tout en respectant un certain nombre de contraintes d'antériorité.
- Si l'on construit le graphe  $G$  dont l'ensemble des sommets correspond à l'ensemble des tâches, et où il existe un arc  $(i, j)$  si la tâche  $i$  peut être effectuée avant la tâche  $j$ , le problème revient à déterminer un chemin hamiltonien de  $G$ .

## Exercice


- Huit personnes se retrouvent pour un repas de mariage. Le graphe ci-dessous précise les incompatibilités d'humeur entre ces personnes (une arête reliant deux personnes indique qu'elles ne se supportent pas).



- Proposez un plan de table (la table est ronde) en évitant de placer côte à côte deux personnes incompatibles.

## Exercice

On cherche un cycle hamiltonien dans le graphe de compatibilité.



## Connexité

## Connexité

Un graphe  $G$  est **connexe** s'il existe au moins une chaîne entre une paire quelconque de sommets de  $G$ .

La relation :

$$x_i \text{ R } x_j \Leftrightarrow \begin{cases} \text{soit } x_i = x_j \\ \text{soit il existe une chaîne joignant } x_i \text{ à } x_j \end{cases}$$

est une relation d'équivalence (réflexivité, symétrie, transitivité). Les classes d'équivalence induites sur  $X$  par cette relation forment une partition de  $X$  en  $X_1, X_2, \dots, X_p$ .


Le nombre  $p$  de classes d'équivalence distinctes est appelé **nombre de connexité** du graphe.

Un graphe est dit connexe si et seulement si son nombre de connexité est égal à 1.

Les sous-graphes  $G_i$  engendrés par les sous-ensembles  $X_i$  sont appelés les **composantes connexes** du graphe. Chaque composante connexe est un graphe connexe.

## Connexité

- Un **point d'articulation** d'un graphe est un sommet dont la suppression augmente le nombre de composantes connexes.
- Un **isthme** est une arête dont la suppression a le même effet.
- Un **ensemble d'articulation** d'un graphe connexe  $G$  est un ensemble de sommets tel que le sous-graphe  $G'$  déduit de  $G$  par suppression des sommets de  $E$ , ne soit plus connexe.



## Forte connexité

73

Un graphe orienté est **fortement connexe** s'il existe un chemin joignant deux sommets quelconque.

La relation :

$$x_i \sim x_j \Leftrightarrow \begin{cases} \text{soit } x_i = x_j \\ \text{soit il existe à la fois un chemin joignant } x_i \text{ à } x_j \text{ et un chemin joignant } x_j \text{ à } x_i \end{cases}$$

est une relation d'équivalence et les classes d'équivalence induites sur  $X$  par cette relation forment une partition de  $X$  en  $X_1, X_2, \dots, X_q$ .

Les sous-graphes engendrés par les sous-ensembles  $G_1, G_2, \dots, G_q$  sont appelés les **composantes fortement connexes** du graphe.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe Réduit

74

On appelle **graphe réduit** le quotient du graphe  $G$  par la relation de forte connexité  $G_r = G/R$


Les sommets de  $G_r$  sont donc les composantes fortement connexes et il existe un arc entre deux composantes fortement connexes si et seulement s'il existe au moins un arc entre un sommet de la première composante et un sommet de la seconde.

On vérifie que le graphe  $G_r$  est sans circuit.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Réduction

75




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercices

76

- Donner l'ensemble des successeurs et de prédécesseurs de chaque sommet.
- Calculer les demi-degrés intérieurs et extérieurs de chaque sommet.
- Donner un exemple de chemin simple mais non élémentaire.
- Existe-t-il un circuit hamiltonien dans  $G$ ?
- Tracer le graphe non orienté déduit de  $G$ .
- $G$  est-il connexe ? Fortement connexe?



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre et arborescence

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Cycle et nombre cyclomatique

78

- On dit que  $p$  cycles  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p$  sont **dépendants** s'il existe, entre leurs vecteurs associés, une relation vectorielle de la forme :
 
$$\lambda_1 \mu_1 + \lambda_2 \mu_2 + \dots + \lambda_p \mu_p = 0$$
 avec les  $\lambda_i$  non tous nuls.
- Si la satisfaction de la relation précédente implique  $\lambda_i = 0, i=1, \dots, p$ , les  $p$  cycles sont dits **indépendants**.
- Une **base de cycles** est un ensemble minimal de cycles indépendants tel que tout vecteur représentatif d'un cycle puisse s'exprimer comme combinaison linéaire des cycles de la base.
- On appelle **nombre cyclomatique** d'un graphe  $G$ , la dimension de la base de cycles.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Nombre cyclomatique

79

- Soit  $G$  un graphe avec  $n$  sommets,  $m$  arêtes (ou arcs) et  $p$  composantes connexes
- La dimension de la base de cycle est  $v(G) = m - n + p$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre

80

- Un **arbre** est un graphe connexe sans cycles.
- Une **forêt** est un graphe dont chaque composante est un arbre
- **Théorème.**  $G=(X,A)$  est un arbre si et seulement si il existe une unique chaîne reliant toute paire de sommet.
- Preuve:
  - Si 2 chaînes alors on aurait un cycle
  - connexe équivaut à il existe toujours une chaîne entre toute paire de sommet

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre

- **Théorème** : Soit  $H=(X,U)$  un graphe d'ordre  $\geq 2$ ; les propriétés suivantes sont équivalentes pour caractériser un arbre
  - $H$  est connexe et sans cycle
  - $H$  est sans cycle et admet  $n-1$  arcs
  - $H$  est connexe et admet  $n-1$  arcs
  - $H$  est connexe et en ajoutant un arc on crée un cycle (et un seul)
  - $H$  est sans cycle et si on supprime un arc quelconque, il n'est plus connexe
  - Tout couple de sommets est relié par une chaîne et une seule
- Preuve : voir Berge

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe fortement connexe

- **Théorème** : Pour un graphe  $G$  avec au moins un arc, les conditions suivantes sont équivalentes :
  - $G$  est fortement connexe
  - Par tout arc passe un circuit
- Preuve : voir Berge

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arborescence


- Dans un graphe  $G=(X,U)$ , on appelle racine, un point  $a$  tel que tout autre sommet du graphe puisse être atteint par un chemin issu de  $a$ . Une racine n'existe pas toujours.
- Une **arborescence** est un arbre muni d'une racine
- Un graphe  $G$  est dit **quasi-fortement connexe** si pour tout couple de sommet  $x$  et  $y$ , il existe un sommet  $z$  d'où partent à la fois un chemin allant en  $x$  et un chemin allant en  $y$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Cheminement

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre

- La **racine**  $r$  de l'arbre est l'unique nœud ne possédant pas de parent
- Tout sommet  $x$  qui n'est pas la racine a
  - un unique parent, noté  $\text{parent}(x)$  (appelé père parfois)
  - 0 ou plusieurs fils.  $\text{fils}(x)$  désigne l'ensemble des fils de  $x$
- Si  $x$  et  $y$  sont des sommets tels que  $x$  soit sur le chemin de  $r$  à  $y$  alors
  - $x$  est un ancêtre de  $y$
  - $y$  est un descendant de  $x$
- Un sommet qui n'a pas de fils est une feuille

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre



1 est la racine  
 9,10,6,3,11,12,8 sont les feuilles  
 11 est un descendant de 4, mais pas de 2  
 2 est un ancêtre de 10


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre

- Quand il n'y a pas d'ambiguïté, on regarde les arêtes d'un arbre comme étant orienté de la racine vers les feuilles
- La **profondeur** d'un sommet (depth) est définie récursivement par
  - $\text{prof}(v) = 0$  si  $v$  est la racine
  - $\text{prof}(v) = \text{prof}(\text{parent}(v)) + 1$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre




1 est la racine  
2,3,4 sont à la profondeur 1  
5,6,7,8 à la profondeur 2  
La hauteur de 2 est 2, celle de 9 est 4, celle de 3 est 2, celle de 1 est 1.

## Exemple d'arbre : dictionnaire

L'arbre ci-contre représente un dictionnaire contenant les 5 mots suivants: arbre, arc, arete, graphe, graphie.

- Ajouter le mot « arborer » au dictionnaire. Proposez un algorithme pour l'insertion d'un mot.
- Ajouter le mot « are » dans le dictionnaire. Que constatez-vous ? Proposez une solution ?
- Proposez un algorithme déterminant si un mot appartient au dictionnaire.
- Quel est le nombre de sommets maximum d'un dictionnaire de profondeur  $p$  ?



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre : parcours

- Parcours (tree traversal) : on traverse l'ensemble des sommets de l'arbre
- Parcours en largeur d'abord
- Parcours en profondeur d'abord
  - Préfixe
  - Infixe (arbre binaire seulement)
  - Postfixe


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre : parcours en largeur d'abord

- Largeur d'abord (bfs = breadth-first search)
- On visite la racine, puis on répète le processus suivant jusqu'à avoir visité tous les sommets :  
visiter un fils non visité du sommet le moins récemment visité qui a au moins un fils non visité
- On visite tous les sommets à la profondeur 1, puis tous ceux à la profondeur 2, puis tous ceux à la profondeur 3 etc...

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre



Largeur d'abord: ordre de visite  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre : parcours en largeur d'abord

- Bfs(T) : array  
 $r \leftarrow \text{racine}(T)$   
 créer un file F et ajouter r dans F  
 $i \leftarrow 0$   
 tant que (F n'est pas vide)  
 $x \leftarrow \text{premier}(F)$ ; supprimer x de F  
 $\text{array}[i] \leftarrow x$   
 $i++$   
 pour chaque fils y de x  
     ajouter y dans F  
 fin pour  
 fin tant que

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre : largeur d'abord avec passes


- Bfs(T) : array  
 $r \leftarrow \text{racine}(T)$   
 créer deux files F1 et F2 et ajouter r dans F1  
 $i \leftarrow 0$   
 faire  
     tant que (F1 n'est pas vide)  
          $x \leftarrow \text{premier}(F1)$ ; supprimer x de F1  
          $\text{array}[i] \leftarrow x$   
          $i++$   
         pour chaque fils y de x  
             ajouter y dans F2  
         fin pour  
     fin tant que  
      $F1 \leftarrow F2$  // fin d'une passe début de la nouvelle : la  
     F2 devient vide // profondeur change  
 tant que F1 n'est pas vide

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre : parcours en largeur d'abord

Largeur d'abord: ordre de visite

- Passe 1 : 1
- Passe 2 : 2,3,4
- Passe 3 : 5,6,7,8
- passe 4 : 9,10,11,12



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre : parcours en profondeur d'abord

- Profondeur d'abord (dfs = depth-first search)
- Défini de façon récursive
  - visit(sommet x)
  - previsit(x)
  - pour chaque fils y de x
  - visit(y)
  - postvisit(x)
- Premier appel : visit(racine(T))

Théorie des Graphes - 2015/2016


## Arbre : parcours en profondeur d'abord

- Ordre préfixé ou postfixé dépend des fonction previsit et postvisit
- Si previsit(x) : met x dans le array et incremente i alors array contient l'ordre préfixé
- Si c'est postvisit qui le fait alors array contiendra l'ordre postfixé

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre: parcours en profondeur d'abord

- ordre de visite préfixé
  - On marque quand on atteint le nœud.
  - 1, 2, 5, 9, 10, 6, 3, 4, 7, 11, 12, 8
- ordre de visite postfixé
  - On marque quand on quitte le nœud.
  - 9, 10, 5, 6, 2, 3, 11, 12, 7, 8, 4, 1



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre : parcours en profondeur d'abord

- Dfs(T) : array
  - r ← racine(T)
  - créer une pile P et ajouter r dans P
  - i ← 0
  - tant que (P n'est pas vide)
  - x ← premier(P); supprimer x de P
  - array[i] ← x
  - i++
  - pour chaque fils y de x
  - ajouter y dans P
  - fin pour
  - fin tant que


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre : implémentation

- Représentation des fils
  - Par une liste :
    - Le parent possède un premier fils
    - Chaque sommet possède un pointeur vers son frère suivant (liste chaînée des fils)
  - Par un tableau si le nombre de fils est connu à l'avance (arbre k-aire)
  - Dans le cas binaire, le parent possède le fils gauche et le fils droit

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice : parcours d'arbre



- Effectuez un parcours en largeur/profondeur d'abord en partant de 1.
- Vous devez visiter les successeurs d'un nœud dans leur ordre naturel.


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Cheminement dans un graphe

- Les algorithmes que l'on a vu pour les arbres (DFS et BFS) peuvent s'appliquer aux graphes
- Il faut faire un peu attention
  - On ne doit pas visiter deux fois le même sommet

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe: largeur d'abord



Théorie des Graphes - 2015/2016



## Composantes fortement connexes

- On calcule  $G'$  le graphe inverse (transpose graph)
- On marque « non marqué » tous les sommets
- Début: On prend un sommet  $s$  non marqué
- On calcule tous les sommets que l'on peut atteindre dans  $G$  et dans  $G'$  à partir de  $s$
- On marque « marqué » tous les sommets atteints deux fois ainsi que  $s$
- On retourne en Début tant qu'il reste des sommets « non marqués »

- Complexité ? En théorie ? En pratique ?

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Composantes fortement connexes

### Algorithme de R.E Tarjan

- Premier algorithme linéaire : complexité en  $O(n+m)$
- [ICS 161: Design and Analysis of Algorithms](#), D. Eppstein.

### Algorithme de Kosaraju

- [Kosaraju's algorithm](#), Wikipedia.

### Algorithme de Gabow (Path-based strong component algorithm)

Théorie des Graphes - 2015/2016

## DFS types d'arcs

- On visite  $v$ , on atteint  $w$ 
  - $w$  n'a jamais été atteint
  - $w$  est un ancêtre de  $v$  dans la DFS
  - $w$  est déjà été totalement visité
- Idée : on marque les nœuds avec un indice que l'on augmente. On regarde quel est l'indice minimal que l'on peut atteindre à partir d'un nœud.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Algorithme de Tarjan

- $\text{num} := 0; P := \text{pile vide}; \text{partition} := \text{ensemble vide}$
- pour chaque sommet  $v$  de  $G$ 
  - si  $v.\text{num}$  n'est pas défini
  - parcours( $G, v$ )
  - renvoyer partition
- fin de fonction

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Function parcours(sommet $v$ )


```

□ v.num := num
  v.numAccessible := num
  num := num + 1
  P.push(v), v.dans_P := oui
  // Parcours récursif
  pour chaque w successeur de v
    si w.num n'est pas défini
      parcours(w)
      v.numAccessible := min(v.numAccessible, w.numAccessible)
    sinon si w.dans_P = oui
      v.numAccessible := min(v.numAccessible, w.num)
  si v.numAccessible = v.num
    // C'est une racine, calcule la composante fortement connexe associée
    C := ensemble vide
    répéter
      w := P.pop(), w.dans_P := non
      ajouter w à C
    tant que w différent de v
    ajouter C à partition

```



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Composantes fortement connexes





Théorie des Graphes - 2015/2016

## CFC : algorithme de Tarjan



Théorie des Graphes - 2015/2016

## CFC : algorithme de Tarjan




Théorie des Graphes - 2015/2016



## Exercice : composantes fortement connexes.

121

- Trouvez les CFC avec l'algorithme de Tarjan.
- Dessinez l'arbre DFS.
- Dessinez le graphe réduit.




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice : encore des CFC.

122

- Trouvez les CFC avec l'algorithme de Tarjan.
- Dessinez l'arbre DFS.
- Dessinez le graphe réduit.



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Algorithme de Kosaraju


123

- $S$  : pile vide
- Tant que  $S$  ne contient pas tous les sommets
  - Choisir un sommet arbitraire  $v$  qui n'est pas dans  $S$
  - Lancer une DFS depuis  $v$ . Mettre tous les sommets visités (à la fin de leur visite)  $u$  dans  $S$
- Inverser la direction de tous les arcs pour obtenir le graphe transposé.
- Tant que  $S$  est non vide:
  - Affecter  $v$  avec le sommet de  $S$ . Dépiler  $S$
  - Lancer une DFS depuis  $v$ . (On peut aussi utiliser une BFS)
  - L'ensemble des sommets visités depuis  $v$  appartiennent à la cfc contenant  $v$ ; supprimer ces sommets de  $G$  et de  $S$ .

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Algorithme de Kosaraju

124



On commence à a  
a,b,c,d,h,g,f  
On ferme f :  $S=\{f\}$   
On ferme g,h,d,c  
 $S=\{f,g,h,d,c\}$   
On ouvre e  
On ferme e,b,a  
 $S=\{f,g,h,d,c,e,b,a\}$


On prend le transposé.  
On dépile  $S$ : a. On atteint b et e  
 $CFC=\{a,b,e\}$ ;  $S=\{f,g,h,d,c\}$   
On dépile  $S$ : c. On atteint d,h  
 $CFC=\{c,d,h\}$ ;  $S=\{f,g\}$   
On dépile  $S$ : g. On atteint f  
 $CFC=\{f,g\}$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Path-based strong component algorithm

125

- Idée



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Path-based strong component algorithm

126

```

procedure STRONG( $G$ )
1. empty stacks  $S$  and  $B$ ;
2. for  $v \in V$  do  $I[v] = 0$ ;
3.  $c = n$ ;
4. for  $v \in V$  do if  $I[v] = 0$  then DFS( $v$ );

procedure DFS( $v$ )
1. PUSH( $v, S$ );  $I[v] = \text{TOP}(S)$ ; PUSH( $I[v], B$ ); /* add  $v$  to the end of  $P$  */
2. for edges  $(v, w) \in E$  do
3.   if  $I[w] = 0$  then DFS( $w$ )
4.   else /* contract if necessary */ while  $I[w] < B[\text{TOP}(B)]$  do POP( $B$ );
5. if  $I[v] = B[\text{TOP}(B)]$  then { /* number vertices of the next strong component */
6.   POP( $B$ ); increase  $c$  by 1;
7.   while  $I[v] \leq \text{TOP}(S)$  do  $I[\text{POP}(S)] = c$  };
    
```

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Path-based strong component algorithm

127

- L'algorithme applique une DFS et maintient 2 piles  $S$  et  $P$ .
- La pile  $S$  contient tous les sommets qui n'ont pas encore été affectés à une CFC dans l'ordre dans lequel ils ont été atteints par la DFS.
- La pile  $P$  contient tous les sommets dont on ne sait pas s'ils appartiennent à une CFC différentes de celles trouvées
- On met  $\text{num}(x)=0$  pour tous les sommets et  $C=1$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Visit( $v$ )

128

- $\text{num}(v) \leftarrow C$ ; incrémenter  $C$
- Empiler  $v$  sur  $S$ ; Empiler  $v$  sur  $P$ .
- Pour chaque voisin de  $w$  de  $v$ 
  - si  $\text{num}(w)=0$  alors visit( $w$ )
  - sinon si  $w$  n'a pas été placé dans une CFC alors
    - Tant que  $\text{num}(\text{sommet}(P)) > \text{num}(w)$
    - dépiler  $P$
- Si  $v$  est le sommet de  $P$ :
  - Dépiler  $S$  jusqu'à dépiler  $v$ . Mettre tous les sommets dépilés dans une CFC
  - Dépiler  $v$  de  $P$


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Path-based strong component algorithm

- On fait une boucle sur les sommets non encore ouverts par la DFS

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Path-based strong component algorithm



On commence à a  
 $S=\{a\}$ ;  $P=\{a\}$ ;  $\text{num}(a)=1$   
 $S=\{a,b\}$ ;  $P=\{a,b\}$ ;  $\text{num}(b)=2$   
 $S=\{a,b,c\}$ ;  $P=\{a,b,c\}$ ;  $\text{num}(c)=3$   
 $S=\{a,b,c,d\}$ ;  $P=\{a,b,c,d\}$ ;  $\text{num}(d)=4$   
 On touche c. d est défilé de P  
 $S=\{a,b,c,d,h\}$ ;  $P=\{a,b,c,h\}$ ;  $\text{num}(h)=5$   
 On touche d. h est défilé de P  
 $S=\{a,b,c,d,h,g\}$ ;  $P=\{a,b,c,g\}$ ;  $\text{num}(g)=6$   
 $S=\{a,b,c,d,h,g,f\}$ ;  $P=\{a,b,c,g,f\}$ ;  $\text{num}(f)=7$   
 On touche g. f est défilé

$S=\{a,b,c,d,h,g,f\}$ ;  $P=\{a,b,c,g\}$ ; On quitte g  
 g est le sommet de P. On dépile S jusqu'à g  $\text{CFC}=\{f,g\}$ .  $P=\{a,b,c\}$   
 On quitte h,d,c. c est le sommet de P. On dépile S jusqu'à c  
 $\text{CFC}=\{c,d,h\}$ ;  $P=\{a,b\}$ ;  $S=\{a,b\}$   
 on ajoute e.  $S=\{a,b,e\}$ ;  $P=\{a,b,e\}$ . On touche a. e et b sont défilés de P  
 $P=\{a\}$ . On quitte e,b,a. a est le sommet de P  
 $\text{CFC}=\{a,b,c\}$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## K-connexité

- La k-connexité revient à se demander combien il faut éliminer de sommet au minimum pour casser la connexité du graphe
  - 2 : alors graphe 2-connexe
- On peut aussi se poser la question pour les arêtes
  - K-arête connexes : il faut éliminer k arêtes
- Il existe des algorithmes dédiés souvent semblables aux algorithmes présentés avant (2 connexes et algo de Tarjan pour les composantes fortement connexes)

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problème 2-SAT

Un graphe pour résoudre 2-SAT, Philippe Gambette.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercices : problème 2-SAT

Trouvez les valuations des formules 2-SAT suivantes.

- $(x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_3)$
- $(x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3)$
- $12 + 1-3 + -14 + 23 + 27 + 2-6 + 34 + 45 + 46 + 4-7 + 6-7$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problèmes de cheminement

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problèmes

- Connexité et sommets atteignables
- Plus court chemin entre deux sommets
  - Algorithme de Dijkstra
  - Algorithme de Bellman-Ford
  - Combinaison des deux
- Détection de cycles négatifs
- Plus courts chemins entre tous les sommets
- Cas des graphes sans circuit

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Sommets atteignables

- Pour savoir quels sont les sommets atteignables à partir d'un sommet, il suffit d'utiliser une procédure de parcours du graphe (DFS ou BFS)
- Trouver le chemin le plus court est un peu plus complexe
- On cherche le plus court chemin entre deux sommets s et t (source=source; t=sink)

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Plus court chemin entre deux points

- On introduit maintenant une longueur sur les arcs
- Le coût sur les arcs peut être appelé différemment
  - ▣ Distance
  - ▣ Poids
  - ▣ Coût
  - ▣ ...
- important : **la longueur d'un chemin est égal à la somme des longueurs des arcs qui le compose**


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Plus court chemin entre deux points

- Pour commencer, on supposera que tous les coûts sont positifs. Ensuite on relâchera cette condition.
- Ce n'est pas une obligation : on peut très bien calculer le plus court chemin avec des coûts négatifs.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin de A vers J



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Plus court chemin

- On ne peut pas énumérer tous les chemins
- On se place dans le cas où toutes les longueurs sont positives
- Un algorithme glouton existe !

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problèmes

- Connexité et sommets atteignables
- Plus court chemin entre deux sommets
  - ▣ Algorithme de Dijkstra
  - ▣ Algorithme de Bellman-Ford
  - ▣ Combinaison des deux
- Détection de cycles négatifs
- Plus courts chemins entre tous les sommets
- Cas des graphes sans circuit


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Algorithme de Dijkstra

- On maintient en permanence la distance des sommets avec l'origine
- On a trois ensembles de sommets
  - ▣ Les **ouverts** (ce sont les candidats pour la prochaine étape)
    - On peut les atteindre en passant par des sommets précédemment choisis
  - ▣ Les **fermés** : ce sont des sommets qui ont été choisis
  - ▣ Les **indéfinis** : pour l'instant on ne peut pas les atteindre
- A chaque étape on choisit le sommet ouvert situé à la plus petite distance
- On regarde les sommets qui sont reliés à ce sommet
  - ▣ Ceux qui sont indéfinis deviennent ouvert et on calcule leur distance
  - ▣ Ceux qui sont ouverts ont leur distance modifiée
- On ferme le sommet

Théorie des Graphes - 2015/2016


## Chemin de A vers J



Théorie des Graphes - 2015/2016

A est ouvert  
Sommets reliés à A : B, C et E  
Ils sont ouverts avec  
 $D(A, B) \leq 85$   
 $D(A, C) \leq 217$   
 $D(A, E) \leq 173$   
Ouvert = {B, E, C}

## Chemin de A vers J




Théorie des Graphes - 2015/2016

On ajoute le sommet ouvert à la plus petite distance  
Ici c'est B. On ferme B  
On s'intéresse aux voisins de B  
Il y a F : on ouvre F  
 $D(A, F) \leq d(A, B) + d(B, F) \leq 165$   
Ouvert = {F, E, C}

## Chemin de A vers J

145




On choisit F. On le ferme  
On ouvre I  
 $D(A,I) \leq d(A,F) + d(F,I) \leq 415$   
Ouverts = {E,C,I}

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin de A vers J

146




On choisit E. On le ferme  
On ouvre J  
 $D(A,J) \leq d(A,E) + d(E,J) \leq 675$   
Ouverts = {C,I,J}

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin de A vers J

147




On prend C  
On ouvre G et H  
Ouverts = {H,G,I,J}

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin de A vers J

148




On prend H  
On met à jour J

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin de A vers J

149




On prend G

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin de A vers J

150




On prend I

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin de A vers J

151



On prend J  
Fin de l'algorithme

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Dijkstra


152

- $\text{maj\_distances}(s1, s2)$   
 si  $d[s2] > d[s1] + \text{longueur}(s1, s2)$   
 alors  $d[s2] \leftarrow d[s1] + \text{longueur}(s1, s2)$
- $\text{Dijkstra}(G, \text{Poids}, \text{sdeb})$   
 Ouvert  $\leftarrow \{s\}$   
 tant que Ouvert  $\neq \emptyset$  et t n'est pas fermé  
 faire i  $\leftarrow \text{Trouve\_min}(\text{Ouvert})$   
 supprimer i de Ouvert  
 fermer(i)  
 pour chaque nœud k voisin de i  
 faire si k n'est pas fermé  
 alors ajouter k dans Ouvert s'il n'y était pas déjà  
 maj\\_distances(i, k)  
 fait  
 fait
- Pour trouver le chemin il faut garder le predecesseur (celui qui a mis à jour la distance min)

Théorie des Graphes - 2015/2016


## Exercice 1 : plus court chemin

153



## Exercice 2 : plus court chemin

154



## Algorithme de Dijkstra

155

- La difficulté vient de la détermination du sommet situé à la plus petite distance
  - ▣ Queue de Priorité

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Queues de priorité : rappels

156

- 3 opérations
  - ▣ insert(elt,val)
  - ▣ decreaseKey(elt,val)
  - ▣ extractMin()
- Monotone ou pas (l'élément extrait augmente ou pas)
- Implémentations (complexité ?)
  - ▣ Liste
  - ▣ Liste ordonnée
  - ▣ Tas
  - ▣ Buckets

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Queues de priorité : rappels

157

- Bucket : on crée un tableau de C valeurs possible (c'est le max du coût d'une arête de s à t)
- On traverse le tableau pour trouver le plus petit élément
- On utilise le tableau de façon circulaire
- Pourquoi est-ce que cela marche ?
- Complexité  $O(m+nC)$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Queues de priorité

158

- Il existe de nombreuses structures de données
  - ▣ K-ary heap
  - ▣ Fibonacci heap
  - ▣ K-level buckets
  - ▣ Hot queue

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Propriétés

159

- Tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin
- L'ensemble des arcs des plus courts chemins forment un arbre
- La valeur des nœuds extraits par Dijkstra est croissante
- Ce dernier point n'est plus vrai si on a des coûts négatifs

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problèmes

160

- Connexité et sommets atteignables
- Plus court chemin entre deux sommets
  - ▣ Algorithme de Dijkstra
  - ▣ Algorithme de Bellman-Ford
  - ▣ Combinaison des deux
- Détection de cycles négatifs
- Plus courts chemins entre tous les sommets
- Cas des graphes sans circuit

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Algorithme de Bellman-Ford

- Propriété des chemins.  $d$  : distance depuis  $s$   
**condition d'optimalité**
  - $\forall (u,v) \in A, d(v) \leq d(u) + c(u,v)$
- Signification intuitive
  - Soit le plus court chemin de  $s$  à  $v$  peut passer par l'arc  $(u,v)$  et dans ce cas on a :  $d(v) = d(u) + c(u,v)$
  - Soit le plus court chemin de  $s$  à  $v$  ne peut pas passer par l'arc  $(u,v)$  et dans ce cas on a :  $d(v) < d(u) + c(u,v)$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Algorithme de Bellman-Ford

- Principe :
  - On met à jour les distances jusqu'à vérifier la propriété précédente pour chaque arc
  - Quand on trouve un arc  $(u,v)$  avec  $d(v) > d(u) + c(u,v)$ , cela signifie qu'on peut réduire la distance de  $s$  à  $v$  en passant par  $u$ .
  - On met donc  $d(v)$  à jour en passant par  $u$ 
    - $d(v) \leftarrow d(u) + c(u,v)$ ,
- On commence avec  $d(s)=0$  et  $\infty$  pour tous les autres sommets

Théorie des Graphes - 2015/2016

## LabelCorrecting

```

LABELCORRECTING
  d(s) ← 0
  support(s) ← nil
  ∀i ∈ N - {s} : d(i) ← ∞
  while ∃(i,j) s.t. d(j) > d(i) + cij do
    d(j) ← d(i) + cij
    support(j) ← i
  
```

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Bellman-Ford

- Preuve
  - Pour tout sommet  $u$ ,  $d(u)$  décroît tout au long de l'algorithme
  - En l'absence de cycle négatif, à la fin de l'algorithme on a
    - $\forall i \in X: -nC \leq d(i) \leq nC$
    - Preuve: comme il n'y a pas de cycle négatif un chemin emprunte au plus  $n-1$  arcs
  - LabelCorrecting est en  $O(n^2C)$ 
    - Preuve :  $d(i)$  peut être modifié au plus  $2nC$  fois car il est décroissant de 1 à chaque fois. Il y a  $n$  sommets dont au plus  $O(n^2C)$  décréments

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Bellman-Ford

- Modified LabelCorrecting
- Le problème central est la détection et l'ordre de traitement des arcs  $(u,v)$  tels que
  - $d(v) > d(u) + c(u,v)$
  - Cela signifie qu'on peut réduire la distance en passant par  $u$
- Plusieurs idées possibles
  - On met l'ensemble des arcs dans une liste et on les traite les uns après les autres.  
On gère l'introduction de nouveaux arcs : ce sont les arcs voisins d'un sommet dont la distance vient d'être modifiée.
  - On utilise une liste de sommets. Un sommet  $u$  appartient à la liste s'il existe un arc  $(u,v)$  qui viole la condition d'optimalité

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Modified LabelCorrecting

```

MODIFIEDLABELCORRECTING
  d(s) ← 0
  support(s) ← nil
  ∀i ∈ N - {s} : d(i) ← ∞
  i ← s
  do
    for chaque (i,j) ∈ A(i) do
      if d(j) > d(i) + cij then
        d(j) ← d(i) + cij
        support(j) ← i
        ADDNODE(j, Stream)
    i ← SELECTNODE(Stream)
  while i ≠ nil
  
```

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Modified LabelCorrecting

- Stream a une structure de FIFO
- On la décompose en 2 ensemble  $S_1$  et  $S_2$ 
  - addNode ajoute toujours en fin de  $S_2$
  - selectNode choisie le premier élément de  $S_1$  si  $S_1$  n'est pas vide; sinon  $S_2$  est copiée dans  $S_1$  et puis vidée. Dans ce cas on parle de **changement de passe**.
- La passe  $i$  traite les nœuds qui ont été introduit en  $i-1$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Modified LabelCorrecting

BELLMAN-FORD-MOORE  
 Stream est décomposé en 2 ensembles  $S_1$  et  $S_2$

```

ADDNODE(node, Stream)
  if node ∉ S2 then ADDLAST(node, S2)
  
```

```

SELECTNODE(node, Stream)
  if S1 = ∅ then
    if S2 = ∅ then nil
    S1 ← S2
    S2 ← ∅
  node ← FIRSTNODE(S1)
  REMOVE NODE(node, S1)
  node
  
```

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Bellman-Ford

### Théorème

- L'algorithme de Bellman-Ford est tel que
  - Chaque passe est en  $O(m)$
  - Le nombre de passes est borné par la hauteur de l'arbre des plus courts chemins
  - L'algorithme est en  $O(nm)$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Modified LabelCorrecting

### Autre possibilité pour Stream:

- LIFO : l'algorithme n'est plus polynomial ! Mais il fonctionne parfois très bien pratique

### Remarque :

- **Aucune supposition n'a été faite sur les coûts !**

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problèmes

- Connexité et sommets atteignables
- Plus court chemin entre deux sommets
  - Algorithme de Dijkstra
  - Algorithme de Bellman-Ford
  - **Combinaison des deux**
- Détection de cycles négatifs
- Plus courts chemins entre tous les sommets
- Cas des graphes sans circuit

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Bellman-Ford + Dijkstra ?

- Si on a uniquement des coûts non négatifs et si on prends l'algorithme Modified LabelCorrecting et que Stream est implémenté comme une queue de priorité avec la distance à  $s$  comme valeur, alors
  - On implémente l'algorithme de Dijkstra !
  - Un nœud ne peut-être introduit dans Stream qu'une seule fois

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Bellman-Ford + Dijkstra ?

- Que se passe t'il si Stream est une queue de priorité et si les coûts ne sont pas tous négatifs ?
  - Bellman-Ford fonctionne toujours (pas de supposition ni sur Stream, ni sur le coût des arcs)
  - Algorithme de Dinitz et Itzhak (2010).
  - Complexité en  $O(nm)$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Plus court chemin de $s$ à $t$

- Si on cherche le plus court chemin de  $s$  à  $t$ , les algorithmes précédents recherchent un plus court chemin de  $s$  à tous les autres nœuds jusqu'à rencontré  $t$
- Est-ce que l'on peut accélérer cela et éviter, dans le cas euclidien, de faire des cercles qui s'agrandissent ?
  - Si on cherche un plus court chemin entre Lille et Nice, les algos considèrent Amsterdam !

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Plus court chemin de $s$ à $t$

- Pour éviter cela, on peut utiliser un **minorant** de la distance minimum entre un nœud  $i$  et  $t$
- Dès que l'on aura trouver un majorant de la distance de  $s$  à  $t$  alors on pourra utiliser ces minorants
  - $d(s,t) \leq M$
  - Si  $d(s,i) + md(i,t) > M$  alors on arrête d'explorer depuis  $i$
- Par exemple:
  - on sait que Amsterdam est au moins à 1000km de Nice.
  - on sait que Lille est au plus à 1200 km de Nice
  - on trouve que  $d(\text{Lille}, \text{Amsterdam}) = 280$  km
  - on en déduit que  $d(\text{Lille}, \text{Amsterdam}) + d(\text{Amsterdam}, \text{Nice}) > d(\text{Lille}, \text{Nice})$ . On arrête l'exploration depuis amsterdam

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problèmes

- Connexité et sommets atteignables
- Plus court chemin entre deux sommets
  - Algorithme de Dijkstra
  - Algorithme de Bellman-Ford
  - Combinaison des deux
- **Détection de cycles négatifs**
- Plus courts chemins entre tous les sommets
- Cas des graphes sans circuit

Théorie des Graphes - 2015/2016



## Détection de cycles négatifs

- C = plus grand cout d'un arc.
- Méthode 1 : Si une distance atteint une valeur  $\leq -nC$  alors un cycle négatif est présent
- Méthode 2 :
  - ▣ On utilise le Modified LabelCorrecting algorithm avec une FIFO et la décomposition par passe.
  - ▣ On compte pour chaque nœud le nombre de fois où il est introduit dans la queue.
  - ▣ Si un nœud est introduit plus de  $(n-1)$  fois alors il y a un circuit négatif


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Détection de cycles négatifs

- Méthode 3 :
  - ▣ Quand on modifie la distance d'un nœud  $v$  :  $d(v) \leftarrow d(u) + c(u,v)$ . On dit que  $u$  est le prédécesseur de  $v$ , on le note  $p(v)$
  - ▣ Le graphe des prédécesseurs est le sous graphe engendré par les arcs  $(p(v),v)$
  - ▣ Si le graphe des prédécesseurs a un cycle alors  $G$  contient un cycle négatif.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Détection de cycles négatifs



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Détection de cycles négatifs

- Méthode 4 : on applique la méthode 3 de temps en temps

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Détection de cycles négatifs

- Méthode 5 : on applique la méthode 3 mais au lieu de considérer la graphe des prédécesseurs, on considère le graphe des arcs admissibles :
  - ▣ Arc admissible : arc  $(u,v)$  tel que  $d(v) \geq d(u) + c(u,v)$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Détection de cycles négatifs

- Méthode 6 : Subtree traversal
  - ▣ Quand on applique l'opération de mise à jour de la distance à un arc  $(u,v)$  on crée un cycle dans le graphe des parents ssi  $u$  est un ancêtre de  $v$
  - ▣ On vérifie cela lors de la mise à jour de la distance
- Méthode 7 : Tarjan subtree disassembly (dépasse le cadre de ce cours)

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problèmes

- Connexité et sommets atteignables
- Plus court chemin entre deux sommets
  - ▣ Algorithme de Dijkstra
  - ▣ Algorithme de Bellman-Ford
  - ▣ Combinaison des deux
- Détection de cycles négatifs
- **Plus courts chemins entre tous les sommets**
- Cas des graphes sans circuit

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Plus courts chemins entre tous les sommets

- $\forall i,j$ : on veut connaître la distance du plus court chemin entre  $i$  et  $j$
- 2 méthodes principales
  - ▣ Repeated shortest path problem
  - ▣ Algorithme de Floyd Warshall

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Repeated shortest path

- Idée simple : on répète l'algo de plus court chemin n fois
- A partir d'un nœud i : on calcule tous les plus courts chemins de i vers t à l'aide d'un algorithme (Dijkstra ou Belmann Ford)
- Si on répète n fois on a répondu au problème

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Elimination des coûts négatifs

- Introduction d'une technique importante
  - Les coûts réduits**
- Attention : beaucoup de livres introduisent cette notion sans donner son intérêt et en faisant comme si elle était obligatoire. Ce n'est pas vrai. Elle est utile mais c'est tout.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Coûts réduits

- Supposons que l'on ait calculé les distances d entre s et tous les sommets.
- Pour chaque arc (u,v) on peut calculer la valeur
  - $c^d(u,v) = c(u,v) + d(u) - d(v)$
  - C'est le coût réduit de l'arc (u,v)
  - Cela représente le surcoût local à passer par cet arc
- On a toujours  $c^d(u,v) \geq 0$ 
  - La condition d'optimalité  $d(v) \leq d(u) + c(u,v)$  implique  $0 \leq c(u,v) + d(u) - d(v)$ , d'où  $c^d(u,v) \geq 0$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Coûts réduits

- On peut remplacer les coûts initiaux par les coûts réduits
- En procédant ainsi il ne reste que des coûts positifs
- On peut ainsi appliquer n fois l'algorithme de Dijkstra
- On obtient les valeurs d'origine des distance en appliquant la transformation suivante pour chaque paire de nœud u et v : on ajoute  $d(v) - d(u)$  à la distance calculée dans le graphe contenant les coûts réduits

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Algorithme de Floyd Warshall

- Algorithme de programmation dynamique en  $O(n^3)$ .
- Basé sur le théorème suivant :  
Les distances sont optimales ssi  
 $\forall u,v,w \ d[u,v] \leq d[u,w] + d[w,v]$
- Appelons  $d^k[u,v]$  la longueur du plus court chemin utilisant au maximum les nœuds 1 à k-1. On a
  - $d^{k+1}[u,v] = \min \{d^k[u,v], d^k[u,k] + d^k[k,v]\}$

Théorie des Graphes - 2015/2016


## Algorithme de Floyd Warshall

```

    ∀u,v d[u,v] ← ∞; pred[u,v] ← null
    ∀u d[u,u] ← 0
    ∀(u,v) ∈ A d[u,v] ← c(u,v); pred[u,v] ← v
    Pour k de 1 à n
        Pour u de 1 à n
            Pour v de 1 à n
                Si d[u,v] > d[u,k] + d[k,v]
                    Alors d[u,v] ← d[u,k] + d[k,v]
                        pred[u,v] ← k
                Fin si
            Fin pour
        Fin pour
    Fin pour
    
```

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice : Floyd Warshall



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problèmes

- Connexité et sommets atteignables
- Plus court chemin entre deux sommets
  - Algorithme de Dijkstra
  - Algorithme de Bellman-Ford
  - Combinaison des deux
- Détection de cycles négatifs
- Plus courts chemins entre tous les sommets
- Cas des graphes sans circuit**

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphes sans circuits

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphes sans circuits

194

- Attention ce ne sont pas nécessairement des arbres.
- On parle ici de circuit et non pas de cycle.
- On est donc dans le cas ORIENTE
- Les problèmes du plus court chemin et de plus long chemin deviennent facile
- On calcule d'abord l'ordre topologique du graphe

Théorie des Graphes - 2015/2016


## Fonction rang d'un graphe

- Ordre topologique (un sommet est toujours visité avant ses successeurs)
- Associe à chaque nœud  $i$  un nombre positif  $\text{rang}(i)$  tel que
  - $r(1)=0$
  - $R(i)$  = nombre d'arcs dans un chemin de cardinalité maximum entre 1 et  $i$  (taille (nombre de sommets) du plus grand chemin de prédécesseurs depuis 1)
- Se calcule facilement : on élimine les sommets sans prédécesseur à chaque étape (on épluche le graphe)

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Rang d'un graphe

196



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Rang d'un graphe

- **TraitementNiveau(Niveau  $k$ ,  $R$ ) :**  
Pour chaque élément  $i$  de  $R$  faire
  - $S \leftarrow$  vide
  - $\text{Rang}(i) \leftarrow k$
  - Pour chaque voisin  $j$  de  $i$  faire
    - Décrémenter  $\text{degré}(j)$
    - Si  $\text{degré}(j) = 0$  alors ajouter  $j$  dans  $S$

$R \leftarrow S$

- **Algorithme :**
  - On détermine les racines. On les place dans  $R$
  - Niveau  $\leftarrow 0$
  - Répéter tant que  $R$  n'est pas vide
    - TraitementNiveau(Niveau,  $R$ )
    - Incrémenter Niveau

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemins et graphes sans circuit

198

- On prend les sommets selon l'ordre topologique
- Plus court chemin jusqu'au nœud  $v$ 
  - Minimum des plus courts chemins à partir de ses arcs entrants
- Plus long chemin jusqu'au nœud  $v$ 
  - Maximum des plus longs chemins à partir de ses arcs entrants

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problème d'ordonnancement

- Un **problème d'ordonnancement** est composé de façon générale d'un ensemble de tâches soumises à certaines contraintes, et dont l'exécution nécessite des ressources.
- **Résoudre un problème d'ordonnancement** consiste à **organiser ces tâches**, c'est-à-dire à déterminer leurs dates de démarrage et d'achèvement, et à leur **attribuer des ressources**, de telle sorte que les contraintes soient respectées.
- Les problèmes d'ordonnancement sont très variés.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Paramètres en ordonnancement

200

- **tâches**
  - morcelables ou non
  - indépendantes ou non
  - durées fixes ou non
- **ressources**
  - renouvelables ou consommables
- **contraintes portant sur les tâches**
  - contraintes temporelles
  - fenêtres de temps
- **aux critères d'optimalité**
  - liés au temps (délai total, délai moyen, retards)
  - aux ressources (quantité utilisée, taux d'occupation)
  - ou à d'autres coûts (production, lancement, stockage)

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Méthode PERT/CPM

- **PERT (Programme Evaluation Review Technique)** introduit par l'armée américaine (navy) en 1958 pour contrôler les coûts et l'ordonnancement de la construction des sous-marins Polaris.
- **CPM (Critical Path Method)** introduit par l'industrie américaine en 1958 (DuPont Corporation and Remington-Rand) pour contrôler les coûts et l'ordonnancement de production.
- **PERT/CPM ignore la plupart des dépendances.**

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Intérêts de PERT/CPM

- Quel sera la durée totale du projet ?
- Quelles sont les risques ?
- Quelles sont les **activités critiques** qui perturberont l'ensemble du projet si elles ne sont pas achevées dans les délais ?
- Quel est le statut du projet ? En avance ? Dans les temps ? En retard ?
- Anticiper les conséquences des retards et dépassements.
- Si la fin du projet doit être avancée, quelle est la meilleure manière de procéder ?

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Principe de PERT/CPM

- On suppose que le projet se décompose en tâches
- Chaque tâche  $i$  est caractérisée par
  - Sa durée  $d(i)$
  - Ses contraintes d'antériorité avec les autres tâches.
- **PERT/CPM ignore la plupart des dépendances :**
  - partage de ressources pour la réalisation des tâches.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe potentiels-tâches

- A chaque tâche  $i$  on associe un sommet du graphe
- Si la tâche  $i$  doit précéder la tâche  $j$  alors on définit un arc  $(i,j)$  de longueur  $d(i)$  (durée de  $i$ )
- On ajoute deux sommets fictifs
  - $\alpha$  qui correspond à la tâche de début des travaux (durée 0) qui est antérieure à toutes les autres tâches
  - $\omega$  qui correspond à la tâche de fin des travaux (durée 0) qui est postérieure à toutes les autres tâches
- Pas de circuit dans le graphe : sinon problème  $i$  doit suivre  $j$ ,  $k$  doit suivre  $i$  et  $j$  doit suivre  $k$  : blocage


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe potentiels-tâches

Code de la tâche		Durée (semaine)	Tâches antérieures
A	Maçonnerie	7	-
B	Charpente	3	A
C	Toiture	1	B
D	Installations sanitaires et élec.	8	A
E	Façades	2	D,C
F	Fenêtres	1	D,C
G	Jardin	1	D,C
H	Plafonnage	2	F
J	Peinture	2	H
K	Emménagement	1	E,G,J

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Graphe potentiels-tâches



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Ordonnancement

- **But :** trouver un ordonnancement qui minimise le délai total du travail, donc la date de fin des travaux
- Pour qu'une tâche puisse commencer, il est nécessaire que toutes les tâches qui la précède (relie à la tâche début) soient réalisées

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Ordonnancement

- **Date de début au plus tôt** de la tâche  $i$ 
  - $t(i) = \max(t(k) + d(k))$ , avec  $k$  prédécesseur de  $i$
  - Plus long chemin de  $\alpha$  à  $i$
- **Durée minimale** du projet ( $t(\omega)$ ) = plus long chemin de  $\alpha$  à  $\omega$

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Ordonnancement

- On fixe à  $t(\omega)$  la durée du projet
- **Date de début au plus tard** de la tâche  $i$ 
  - $T(i) = \min (T(k) - d(i))$ , avec  $k$  successeur de  $i$
  - $T(i) = t(\omega)$  - plus long chemin de  $i$  à  $\omega$
- **Marge** de la tâche  $i$ 
  - Différence entre début au plus tard et début au plus tôt
  - $T(i) - t(i)$
- **Tâche critique** : tâche dont la marge est nulle

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Chemin critique

- **Tâche critique** :
  - tâche dont la marge est nulle
  - tâche sur un plus long chemin de  $\alpha$  à  $\omega$
- **Il existe au moins un chemin critique.**
- **Attention, il peut exister plusieurs chemins critiques !**
- Les activités de ce chemin déterminent à elles seules la date de fin du projet.
- Il est nécessaire de réduire la longueur de tous les chemins critiques pour avancer la fin du projet.
- Les activités non critiques n'influencent pas la date de fin.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Tâche fondamentale

- une **étape clé** durant l'accomplissement du projet.
- On doit y porter :
  - une attention approfondie et
  - et contrôler rigoureusement sa réalisation.
- Par exemple, une tâche appartenant à tous les chemins critiques.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Intérêt pratique de PERT/CPM


- Ensuite, l'affectation des personnes et ressources peut être améliorée en se concentrant sur ces activités critiques.
- Réciproquement, on peut alors réordonnancer les activités non-critiques et libérer les ressources qui leurs sont allouées sans perturber le reste du projet.
- Gestion basique des incertitudes.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Arbre couvrant de poids minimum

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Spanning Tree



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Minimum Spanning Tree

- Given a graph  $G$ , find a spanning tree where total cost is minimum.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Algorithme de Prim

- On utilise un ensemble  $S$  de nœuds. On place un seul nœud dedans (celui que l'on veut)
- On ajoute petit à petit dans  $S$  tous les nœuds du graphe
- A chaque étape on ajoute dans  $S$  un nœud du graphe qui n'est pas dans  $S$  et qui est relié à un nœud de  $S$  et tel que le coût minimum du lien qui le relie à  $S$  est le plus petit possible. On place ce lien minimum dans l'arbre

Théorie des Graphes - 2015/2016

## 217



## 218



## 219



## 220



## 221



## 222



## 223




## 224




## Prim's Algorithm

225




## Prim's Algorithm

226




## Prim's Algorithm

227



## Prim's Algorithm

228



## Prim's Greedy Algorithm

229

color all vertices yellow

color the root red

**while** there are yellow vertices

pick an edge  $(u,v)$  such that

$u$  is red,  $v$  is yellow &  $\text{cost}(u,v)$  is min

color  $v$  red

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Preuve


230

- Considérons
  - SG : la solution calculée par l'algorithme glouton
  - Sopt : la solution optimale
- Si  $\text{val}(\text{SG}) = \text{val}(\text{Sopt})$  alors pas de problèmes
- Si  $\text{val}(\text{SG}) \neq \text{val}(\text{Sopt})$  alors les deux arbres diffèrent. Prenons le premier arc dans l'ordre du Greedy qui diffère entre SG et Sopt. Appelons le  $e$ . Quand cet arc a été choisi, c'était le plus petit de la coupe  $(V, V')$ . Cet arc relie deux sommets  $x$  et  $y$ . Dans Sopt  $x$  et  $y$  sont reliés par un chemin. Sur ce chemin il y a un arc  $f$  qui relie un sommet de  $V$  à un sommet de  $V'$ . Comme l'algo Greedy a préféré  $e$  à  $f$  : on a  $\text{poids}(e) \leq \text{poids}(f)$ .
- Prenons la solution Sopt et remplaçons  $f$  par  $e$ , on obtient Spot'. Si Sopt est optimal alors cela ne peut pas améliorer  $\text{val}(\text{Sopt})$ . Donc on a  $\text{val}(\text{Spot}') = \text{val}(\text{Sopt})$  et donc  $\text{poids}(e) = \text{poids}(f)$ . On peut reprendre le point précédant avec Spot' au lieu de Sopt.
- A la fin on va donc montrer qu'on ne peut jamais améliorer Spot' et que l'arbre construit par le Greedy a la même valeur

Théorie des Graphes - 2015/2016


## Why Greedy Works?

231



## Why Greedy Works?


232





## Why Greedy Works?

233



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Prim's Algorithm

234

```


foreach vertex v
    v.key = ∞
root.key = 0
pq = new PriorityQueue(V) // add each vertex in the priority queue
while pq is not empty
    v = pq.deleteMin()
    foreach u in adj(v)
        if u is in pq and cost(v,u) < u.key
            pq.decreaseKey(u, cost(v,u))
    
```

**Complexity:  $O((V+E)\log V)$**

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice : Algorithme de Prim

235



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Algorithme de Kruskal


236

- On raisonne avec les arêtes.
- On place chaque nœud dans un ensemble qui lui est propre
- On parcourt les arêtes dans l'ordre croissant des coûts.
  - ▢ Si une arête relie deux ensembles disjoints alors on l'ajoute à l'arbre recouvrant et on fusionne les deux ensembles (ils ne sont donc plus disjoints)
  - ▢ Si ce n'est pas le cas, on passe à l'arête suivante

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Kruskal's Algorithm


237



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Kruskal's Algorithm


238



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Kruskal's Algorithm


239



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Kruskal's Algorithm


240



Théorie des Graphes - 2015/2016


## Kruskal's Algorithm

241




## Kruskal's Algorithm

242




## Kruskal's Algorithm

243




## Kruskal's Algorithm

244



## Kruskal's Algorithm

245



## Kruskal's Algorithm

246

**while** there are unprocessed edges left  
 pick an edge  $e$  with minimum cost  
**if** adding  $e$  to MST does not form a cycle  
     add  $e$  to MST  
**else**  
     throw  $e$  away

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Preuve


247

- On construit bien un arbre : clairement il ne peut pas y avoir de cycle et s'il y avait deux composantes connexes alors on aurait pris une arête pour les relier
- Minimalité : par induction. Montrons qu'à tout étape il existe un arbre recouvrant minimum qui contient les arêtes choisies.  $F$  est des arêtes choisies;  $T$  arbre recouvrant min contenant  $F$ ;  $e$  prochaine arête choisie. Si  $e$  est dans  $T$  alors c'est ok. Sinon  $T+e$  a un cycle. Soit  $f$  l'arête de ce cycle qui est dans  $T$  et pas dans  $F$ .  $T - f + e$  est un arbre recouvrant, son poids est  $\geq T$  donc poids  $f \leq$  poids de  $e$ : poids( $f$ ) ne peut pas être  $<$  poids( $e$ ) sinon on l'aurait choisit. Donc égalité entre les poids et donc  $F+e$  appartient à un arbre recouvrant de poids min.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Exercice : Algorithme de Kruskal

248



## Data Structures

- How to pick edge with minimum cost?
  - ▣ Sort the array once for all
- How to check if adding an edge can form a cycle?
  - ▣ Use a Disjoint Set

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Union find data structure

- Union find = disjoint set data structure
- Problème à résoudre : on va partitionner des éléments en les regroupant petit à petit. On voudrait savoir
  - ▣ A quel partie un élément appartient ?
  - ▣ Est-ce que deux éléments appartiennent à la même partie ?
- La structure de données Union-Find maintient une partition d'un ensemble et dispose de deux fonctions
  - ▣ Find : trouver (retourne la partie d'un élément)
  - ▣ Union : regroupe deux parties en une

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Union find

- On dispose en outre d'une fonction makeSet qui crée une partie singleton
- Chaque partie (ou ensemble) est identifiée par un élément particulier : son représentant
- **Find(x)** : retourne le représentant de la partie auquel x appartient
- **Union(x,y)** : réunit les deux parties (celle de x et de y) en une seule. Une des deux variables devient le représentant
- **MakeSet(x)** : crée une partie dont x est le représentant

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Union find : implémentation

- Listes chaînées : l'élément en tête est le représentant
  - ▣ MakeSet crée une liste (en  $O(1)$ )
  - ▣ Union concatène les deux listes (en  $O(1)$ )
  - ▣ Find : il faut accéder au premier : requiert  $O(n)$
- On améliore le Find : chaque élément pointe vers la tête de liste
  - ▣ Cela dégrade l'Union qui devient en  $O(n)$  ...

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Union find : implémentation

- Une bonne solution consiste à utiliser des arbres, représentés à l'aide de la primitive parent
- Le représentant de chaque partie (ensemble) est la racine de l'arbre

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Union find : implémentation

- MakeSet(x)  
parent[x] ← null
- Find(x)  
si parent[x] = null return x  
sinon return Find(parent[x])
- Union(x, y)  
xRoot ← Find(x)  
yRoot ← Find(y)  
parent[xRoot] ← yRoot

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Union find : implémentation

- Dans cette première version, la complexité n'est pas meilleure qu'avec des listes chaînées
- On peut faire deux améliorations importantes
  - ▣ **Union par rang** : On attache l'arbre le plus petit à la racine de l'arbre le plus grand (taille = niveau)
  - ▣ **Compression de chemins** : on met à jour Find quand on l'utilise  
Find(x)  
si parent[x] ≠ x alors parent[x] ← Find(parent[x])  
return parent[x]

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Union find

- Union(x,y)  
Lier(Find(x),Find(y))
- Lie(x,y)  
si rang[x] > rang[y] alors parent[y] ← x  
sinon parent[x] ← y  
si rang[x]=rang[y]  
rang[y] ← rang[y] + 1

Théorie des Graphes - 2015/2016




## Chaîne augmentante

- Le terme vient du fait que si on trouve une chaîne augmentante on peut augmenter la cardinalité du couplage en inversant les arêtes de la chaîne : les libres deviennent matchées et les matchées deviennent libres.


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Couplage




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Couplage




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Couplage



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Couplage



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Couplage : théorème de Berge

- Théorème : un couplage est maximum si et seulement si il n'admet pas de chaîne augmentante

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Couplage : algorithmes

- Le théorème nous fournit le principe d'un algorithme.
- On part d'un couplage vide
- On cherche une chaîne augmentante
  - ▢ Simple avec un graphe biparti
  - ▢ Complexe avec un graphe non biparti

Théorie des Graphes - 2015/2016


## Couplage : graphe biparti

- Chercher une chaîne alternée dans un graphe biparti est simple, car l'alternance des arêtes correspond à l'alternance des ensembles.
  - ▢ Soit  $G=(X \cup Y, E)$
  - ▢ On oriente les arêtes matchées de Y vers X, les autres de X vers Y.
  - ▢ Une chaîne augmentante devient un chemin d'un sommet libre de X vers un sommet libre de Y

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Couplage

273



## Couplage : graphe biparti


274

- Une DFS ou une BFS permet de trouver les chaînes augmentante
- La complexité est en  $O(nm)$
- Si on travaille par niveau :
  - ▣ On sature tous les sommets atteignable au niveau  $i$ , avant de passer au niveau  $i+1$
  - ▣ On peut montrer que la complexité est en  $O(\sqrt{n} \cdot m)$

Théorie des Graphes - 2015/2016


## Couplage : graphe non biparti

275




## Couplage : graphe non biparti

276



## Couplage : graphe non biparti

277



## Couplage : graphe non biparti

278

- Idée: Edmond's algorithm
  - ▣ Shrinking-blossom algorithm
- Amélioration par Tarjan et d'autres
- Complexité  $O(nm\alpha(n,m))$  difficile à implémenter  
 $O(nm)$  très difficile  
 $O(n^{1/2}m)$  : 42 pages de démonstration non intuitive


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Flots


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Flot : affectation

280




## Affectation



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Flot compatible




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Augmentation successive


- Successive augmentation are computed in a particular graph:  
The **residual graph**
- The residual graph has **no lower bounds**
- In our case this algorithm is equivalent to the best ones.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Residual Graph




## Residual Graph




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Residual Graph



## Une Solution



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Properties

- The flow value  $x_{ij}$  of  $(i,j)$  can be increased iff there is a path from  $j$  to  $i$  in  $R - \{(i,j)\}$



- The flow value  $x_{ij}$  of  $(i,j)$  can be decreased iff there is a path from  $i$  to  $j$  in  $R - \{(i,j)\}$



Théorie des Graphes - 2015/2016




## Minimum cost Flows

- Let  $G$  be a graph in which every arc  $(i,j)$  is associated with 3 integers:
  - $l(i,j)$  the lower bound capacity of the arc
  - $u(i,j)$  the upper bound capacity of the arc
  - $c(i,j)$  the cost of carrying one unit of flow
- The cost of a flow  $f$  is  $\text{cost}(f) = \sum f(i,j) c(i,j)$
- The minimum cost flow problem:
  - If there exists a feasible flow, find a feasible flow  $f$  such that  $\text{cost}(f)$  is minimum.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Affectation avec coûts




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Minimum Cost flow

- Similar to feasible flow except that:
  - shortest** paths are considered.
- length of an arc = **reduced cost** of the arc
- Reduced costs are used to work with nonnegative value (useful for shortest paths algorithms), but the principles remains the same with **residual costs**.
- We will consider here only the residual costs


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Minimum Cost Flow




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Une Solution




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Residual Graph




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Residual Costs



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Residual Costs




Théorie des Graphes - 2015/2016

## Shortest path

- $d(i,j)$  = length of the shortest path which does not use  $(i,j)$  in the residual graph. The length is the sum of the residual costs of the arc contained in the path.

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Residual Costs



## Minimum cost flow

- If the feasible flow is computed by augmenting the flow along shortest paths then the solution is optimal.
- Complexity  $O(n S(n,m,\chi))$  where  $\chi$  is the maximum cost value.


Théorie des Graphes - 2015/2016

## Properties

- The flow value  $x_{ij}$  of  $(i,j)$  can be increased iff there is a path from  $j$  to  $i$  in  $R - \{(i,j)\}$



- The flow value  $x_{ij}$  of  $(i,j)$  can be decreased iff there is a path from  $i$  to  $j$  in  $R - \{(i,j)\}$



Théorie des Graphes - 2015/2016

## Terminaison de l'algorithme

- On peut éviter la dernière augmentation, en faisant attention à ce que le puits soit toujours atteignable dans le graphe résiduel.
- On utilise un compteur (num) qui compte le nb de nœuds que l'on peut atteindre à une distance  $k$  donnée depuis  $s$ . Si on change la distance d'un nœud de  $k_1$  à  $k_2$  alors on décrémente  $\text{num}(k_1)$  et on incrémente  $\text{num}(k_2)$ . Si  $\text{num}(k_1)$  devient vide alors on peut arrêter l'algorithme.
- Voir Ahuja/Magnanti et Orlin p 219

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Flots : push-relabel algorithm

302

Théorie des Graphes - 2015/2016

## Problèmes

- Trier les sommets d'un graphe en fonction de leur degré
  - Algorithme ?
  - Coût ?

Théorie des Graphes - 2015/2016

Théorie des Graphes - 2015/2016

- Graphes planaires
- Plus courts chemins (Dijkstra, Bellman-Ford, les deux).  
Recherche de distances entre deux points
- Cycles négatifs
- Couplage
- Flots
- Arbres recouvrants
- Ordonnancement, rang et tri topologique
- Graphes triangulés
- Graphes parfaits