

# Estimation de densité paramétrique par maximum de vraisemblance (ML) ou maximum a posteriori (MAP)

September 29, 2016

## 1 Cadre

Soit un ensemble de données  $D_n = \{x^{(1)}, \dots, x^{(n)}\}$ . Typiquement avec  $x^{(i)} \in \mathbb{R}^d$ , qu'on suppose tirée i.i.d d'une distribution inconnue  $p^*(x)$ .

Soit une famille de lois de probabilité (fonction de densité ou fonction de masse de probabilité) paramétrée par  $\theta$ .

On notera  $p_\theta(x)$  ou  $p(x; \theta)$  ou  $p(x|\theta)$  la (densité de) probabilité associée à un point  $x \in \mathbb{R}^d$  par cette loi pour la valeur de paramètre  $\theta$ .

Par exemple, si on choisit comme famille les Gaussiennes isotropique, paramétrée par leur centre  $\mu$  et leur variance  $\sigma^2$ , on aura:

$$p(x|\theta = \{\mu, \sigma^2\}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sigma^d} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{\|x - \mu\|^2}{\sigma^2}\right)$$

On va **chercher** parmi cette famille, la **loi/fonction de densité de probabilité** qui **“explique le mieux les données”** de notre ensemble de données  $D_n$ . Chercher une loi/fonction de probabilité dans cette famille paramétrée, revient à trouver une bonne valeur des paramètres  $\theta$ .

## 2 Maximum de vraisemblance

### Vraisemblance (*likelihood*)

“probabilité que les données aient été générées par la loi de paramètre  $\theta$ ”.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\theta) &= p(D_n|\theta) \\ &= p(x^{(1)}|\theta)p(x^{(2)}|\theta) \dots p(x^{(n)}|\theta) \\ &= \prod_{i=1}^n p(x^{(i)}|\theta) \end{aligned}$$

## Log-vraisemblance (*log-likelihood*)

$$\begin{aligned}\ell(\theta) &= \log \mathcal{L}(\theta) \\ &= \log \left( \prod_{i=1}^n p(x^{(i)}|\theta) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \log(p(x^{(i)}|\theta))\end{aligned}$$

## Principe de maximisation de la (log) vraisemblance (*maximum likelihood*)

$$\begin{aligned}\theta^* &= \arg \max_{\theta} \mathcal{L}(\theta) \\ &= \arg \max_{\theta} \ell(\theta)\end{aligned}$$

## Lien avec le principe de minimisation du risque empirique

$$\begin{aligned}\theta^* &= \arg \max_{\theta} \ell(\theta) \\ &= \arg \max_{\theta} \sum_{i=1}^n \log(p(x^{(i)}|\theta)) \\ &= \arg \min_{\theta} - \sum_{i=1}^n \log(p(x^{(i)}|\theta)) \\ &= \arg \min_{\theta} \sum_{i=1}^n \left( -\log(p(x^{(i)}|\theta)) \right) \\ &= \arg \min_{\theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( -\log(p(x^{(i)}|\theta)) \right) \\ &= \arg \min_{\theta} \hat{R}(p_{\theta}, D_n)\end{aligned}$$

avec

$$\hat{R}(p_{\theta}, D_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L(p_{\theta}(x^{(i)}))$$

si on pose

$$L(p_{\theta}(x^{(i)})) = -\log p_{\theta}(x^{(i)})$$

Le principe de maximisation de la (log) vraisemblance est un cas particulier de minimisation de risque empirique.

## Comment résoudre le problème d'optimisation. Ex: trouver les paramètres de la densité Gaussienne

Il s'agit de résoudre un problème d'optimisation: trouver la valeur des paramètres qui maximisent la log-vraisemblance ou (ce qui est équivalent) qui minimisent le risque empirique défini précédemment:

$$\begin{aligned}
 \theta^* &= \arg \max_{\theta} \ell(\theta) \\
 &= \arg \max_{\theta} \sum_{i=1}^n \log(p(x^{(i)}|\theta)) \\
 &= \arg \max_{\theta=\{\mu, \sigma^2\}} \sum_{i=1}^n \left( \log \left( \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sigma^d} \exp \left( -\frac{1}{2} \frac{\|x^{(i)} - \mu\|^2}{\sigma^2} \right) \right) \right)
 \end{aligned}$$

Dans les cas les plus simples seulement (tel que la simple d'une Gaussienne ici) le problème d'optimisation peut se résoudre analytiquement en trouvant analytiquement la valeur des paramètres qui annule la dérivée:

On essaye de résoudre l'équation

$$\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = 0$$

ex: cherchons pour commencer uniquement  $\mu$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \ell}{\partial \mu} &= \frac{\partial \ell}{\partial (\mu_1, \dots, \mu_d)} = 0 \\
 \frac{\partial}{\partial \mu} \sum_{i=1}^n \left( \log \left( \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sigma^d} \exp \left( -\frac{1}{2} \frac{\|x^{(i)} - \mu\|^2}{\sigma^2} \right) \right) \right) &= 0 \\
 \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \mu} \left( \log \left( \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sigma^d} \right) + \log \left( \exp \left( -\frac{1}{2} \frac{\|x^{(i)} - \mu\|^2}{\sigma^2} \right) \right) \right) &= 0 \\
 \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial}{\partial \mu} \left( \log \left( \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sigma^d} \right) \right) + \frac{\partial}{\partial \mu} \log \left( \exp \left( -\frac{1}{2} \frac{\|x^{(i)} - \mu\|^2}{\sigma^2} \right) \right) \right) &= 0 \\
 \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial}{\partial \mu} \left( -\frac{1}{2} \frac{\|x^{(i)} - \mu\|^2}{\sigma^2} \right) \right) &= 0 \\
 -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \mu} \|x^{(i)} - \mu\|^2 &= 0 \\
 \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \mu} \|x^{(i)} - \mu\|^2 &= 0 \\
 \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \mu} \sum_{j=1}^d (x_j^{(i)} - \mu_j)^2 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial(\mu_1, \dots, \mu_d)} \sum_{j=1}^d (x_j^{(i)} - \mu_j)^2 = 0$$

Donc, concentrant la dérivée par rapport à la  $k^{ième}$  composante  $\mu_k$  du vecteur  $\mu$ :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \mu_k} \sum_{j=1}^d (x_j^{(i)} - \mu_j)^2 &= 0 \\ \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \mu_k} (x_k^{(i)} - \mu_k)^2 &= 0 \\ \sum_{i=1}^n -2(x_k^{(i)} - \mu_k) &= 0 \\ \sum_{i=1}^n (x_k^{(i)} - \mu_k) &= 0 \\ \left( \sum_{i=1}^n x_k^{(i)} \right) - \left( \sum_{i=1}^n \mu_k \right) &= 0 \\ \left( \sum_{i=1}^n x_k^{(i)} \right) - n\mu_k &= 0 \\ \sum_{i=1}^n x_k^{(i)} &= n\mu_k \\ \mu_k &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_k^{(i)} \end{aligned}$$

ce qui, pour toutes les composantes,  $\mu_1, \dots, \mu_d = \mu$  se résume, sous forme vectorielle:  $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x^{(i)}$ .

En **conclusion**, la valeur de  $\mu$ , paramètre d'une densité Gaussienne isotropique, qui permet de maximiser la vraisemblance  $p(D_n|\mu, \sigma^2)$  est la moyenne empirique des données  $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x^{(i)}$ .

## Évaluation hors-échantillon

On a ainsi *entraîné* les paramètres  $\theta$  de notre distribution paramétrée  $p_\theta$  sur un *ensemble de données d'entraînement*.  $D_{train} = D_n$ .

Il nous intéresse de savoir si la distribution ainsi apprise modélise bien la distribution inconnue  $p^*$  c.a.d. "généralise bien" sur d'autres données provenant de cette distribution inconnue  $p^*$ .

Pour cela on se sera au préalable réservé un ensemble de validation  $D_{valid}$  (et/ou de test  $D_{test}$ ) séparé des données d'entraînement  $D_{train} = D_n$ .

On a trouvé, par maximum de vraisemblance, la valeur des paramètres  $\theta^*$  qui maximisent la (log) vraisemblance sur  $D_{train}$ .

On peut évaluer/estimer la performance de généralisation sur  $D_{valid}$  c.a.d. qu'on peut calculer la log-vraisemblance ou log-vraisemblance moyenne sur  $D_{valid}$  qui indiquera **“à quel point les données de  $D_{valid}$  sont “probables” selon notre modèle de distribution  $p_\theta$  appris sur  $D_{train}$ ”**).

Log-vraisemblance moyenne sur l'ensemble de validation est:

$$\frac{1}{|D_{valid}|} \sum_{x \in D_{valid}} \log(p(x|\theta^*))$$

**Régularisation: maximisation de log-vraisemblance régularisée**

### 3 Alternative: l'approche Bayésienne

**Cadre Bayésien: ce qui le différencie de l'approche de maximum de vraisemblance**

**Probabilité a priori et a posteriori Bayésien sur les paramètres**

**Pure approche Bayésienne pour la prédiction**

**Un compromis: le maximum a posteriori (MAP)**

### 4 Maximum de vraisemblance conditionnelle (ou MAP conditionnel)