Математическая логика

▶ Аристотелева логика (Аристотель: 384-322 гг. до н.э.) — больше философская дисциплина.

- ▶ Аристотелева логика (Аристотель: 384-322 гг. до н.э.) больше философская дисциплина.
- Математический анализ при появлении был противоречив, и это проблема (Джордж Беркли. Аналитик, или Рассуждение, адресованное неверующему математику. Опыт новой теории зрения)

- ▶ Аристотелева логика (Аристотель: 384-322 гг. до н.э.) больше философская дисциплина.
- Математический анализ при появлении был противоречив, и это проблема (Джордж Беркли. Аналитик, или Рассуждение, адресованное неверующему математику. Опыт новой теории зрения)
- Формализация матанализа бесконечно-малые, последовательности, вещественные числа...

- ▶ Аристотелева логика (Аристотель: 384-322 гг. до н.э.) больше философская дисциплина.
- Математический анализ при появлении был противоречив, и это проблема (Джордж Беркли. Аналитик, или Рассуждение, адресованное неверующему математику. Опыт новой теории зрения)
- ▶ Формализация матанализа бесконечно-малые, последовательности, вещественные числа...
- Теория множеств:

$$0 := \emptyset$$
;  $1 := \{\emptyset\}$ ;  $n + 1 := n \cup \{n\}$ 

▶ На некотором острове живёт брадобрей, который бреет всех, кто не бреется сам. Бреется ли сам брадобрей?

- ▶ На некотором острове живёт брадобрей, который бреет всех, кто не бреется сам. Бреется ли сам брадобрей?
- Если

$$X = \{x \mid x \notin x\}$$

- ► На некотором острове живёт брадобрей, который бреет всех, кто не бреется сам. Бреется ли сам брадобрей?
- Если

$$X = \{x \mid x \notin x\}$$

$$X \in X$$

- ► На некотором острове живёт брадобрей, который бреет всех, кто не бреется сам. Бреется ли сам брадобрей?
- Если

$$X = \{x \mid x \notin x\}$$

то что можно сказать про

$$X \in X$$

▶ Пусть  $X \in X$ . Тогда  $X : X \notin X$ 

- ▶ На некотором острове живёт брадобрей, который бреет всех, кто не бреется сам. Бреется ли сам брадобрей?
- Если

$$X = \{x \mid x \notin x\}$$

$$X \in X$$

- ▶ Пусть  $X \in X$ . Тогда  $X : X \notin X$ 
  - lacktriangle Пусть X 
    otin X. Тогда X должен принадлежать X

- ▶ На некотором острове живёт брадобрей, который бреет всех, кто не бреется сам. Бреется ли сам брадобрей?
- Если

$$X = \{x \mid x \notin x\}$$

$$X \in X$$

- ▶ Пусть  $X \in X$ . Тогда  $X : X \notin X$ 
  - ightharpoonup Пусть X 
    otin X. Тогда X должен принадлежать X
- ightharpoonup Не совсем парадокс: откуда мы знаем, что X существует?

- ▶ На некотором острове живёт брадобрей, который бреет всех, кто не бреется сам. Бреется ли сам брадобрей?
- Если

$$X = \{x \mid x \notin x\}$$

$$X \in X$$

- ▶ Пусть  $X \in X$ . Тогда  $X : X \notin X$ 
  - ightharpoonup Пусть X 
    otin X. Тогда X должен принадлежать X
- ightharpoonup Не совсем парадокс: откуда мы знаем, что X существует? А откуда мы знаем, что вещественные числа существуют?

### Программа Гильберта

- ▶ Программа Гильберта: полностью формализовать математику, доказать непротиворечивость.
- ▶ Теоремы Гёделя о неполноте формальной арифметики (1930).

Высказывание — это строка, сформированная по следующим правилам.

ightharpoonup Атомарное высказывание — пропозициональная переменная:  $A, B', C_{1234}$ 

- ightharpoonup Атомарное высказывание пропозициональная переменная:  $A, B', C_{1234}$
- $\blacktriangleright$  Составное высказывание: если  $\alpha$  и  $\beta$  высказывания, то высказываниями являются:
  - **▶** Отрицание: (¬α)

- ightharpoonup Атомарное высказывание пропозициональная переменная:  $A, B', C_{1234}$
- $\blacktriangleright$  Составное высказывание: если  $\alpha$  и  $\beta$  высказывания, то высказываниями являются:
  - **▶** Отрицание:  $(\neg \alpha)$
  - ► Конъюнкция:  $(\alpha \& \beta)$  или  $(\alpha \land \beta)$

- ightharpoonup Атомарное высказывание пропозициональная переменная:  $A, B', C_{1234}$
- $\blacktriangleright$  Составное высказывание: если  $\alpha$  и  $\beta$  высказывания, то высказываниями являются:
  - **▶** Отрицание: (¬α)
  - **У** Конъюнкция:  $(\alpha \& \beta)$  или  $(\alpha \land \beta)$
  - ightharpoonup Дизъюнкция:  $(\alpha \lor \beta)$

- ▶ Атомарное высказывание пропозициональная переменная: A, B', C<sub>1234</sub>
- $\blacktriangleright$  Составное высказывание: если  $\alpha$  и  $\beta$  высказывания, то высказываниями являются:
  - **▶** Отрицание: (¬α)
  - **>** Конъюнкция:  $(\alpha \& \beta)$  или  $(\alpha \land \beta)$
  - ightharpoonup Дизъюнкция:  $(\alpha \lor \beta)$
  - ightharpoonup Импликация: (lpha 
    ightharpoonup eta) или  $(lpha \supset eta)$

Высказывание — это строка, сформированная по следующим правилам.

- ightharpoonup Атомарное высказывание пропозициональная переменная:  $A, B', C_{1234}$
- $\blacktriangleright$  Составное высказывание: если  $\alpha$  и  $\beta$  высказывания, то высказываниями являются:
  - **▶** Отрицание: (¬α)
  - **У** Конъюнкция:  $(\alpha \& \beta)$  или  $(\alpha \land \beta)$
  - ightharpoonup Дизъюнкция:  $(\alpha \lor \beta)$
  - ▶ Импликация:  $(\alpha \to \beta)$  или  $(\alpha \supset \beta)$

#### Пример:

$$(((A \rightarrow B) \lor (B \rightarrow C)) \lor (C \rightarrow A))$$

Метапеременные:

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots$$

Метапеременные:

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots$$

Если  $\alpha$  — высказывание, то  $(\neg \alpha)$  — высказывание

Метапеременные:

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots$$

Если 
$$\alpha$$
 — высказывание, то  $(\neg \alpha)$  — высказывание

Метапеременные для пропозициональных переменных:

$$X, Y_n, Z'$$

Метапеременные:

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots$$

Если  $\alpha$  — высказывание, то  $(\neg \alpha)$  — высказывание

Метапеременные для пропозициональных переменных:

$$X, Y_n, Z'$$

Пусть дана пропозициональная переменная X, тогда  $(X \& (\neg X))$  — высказывание

### Способы упростить запись

▶ Приоритет связок: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация

### Способы упростить запись

- ▶ Приоритет связок: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация
- Ассоциативность: левая для конъюнкции и дизъюнкции, правая для импликации

### Способы упростить запись

- Приоритет связок: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация
- Ассоциативность: левая для конъюнкции и дизъюнкции, правая для импликации

Пример:

$$((((A \rightarrow B) \& Q) \lor (((\neg B) \rightarrow B) \rightarrow C)) \lor (C \rightarrow (C \rightarrow A)))$$

можем записать так:

$$(A \rightarrow B) \& Q \lor ((\neg B \rightarrow B) \rightarrow C) \lor (C \rightarrow C \rightarrow A)$$

### Теория моделей

Оценка высказываний: как их понимать?

## Неформальный пример: $(A \to B) \to (B \to A)$

Давайте попробуем оценить высказывание (A o B) o (B o A).

Давайте попробуем оценить высказывание (A o B) o (B o A).

Если из A следует B, то из B следует A.

Давайте попробуем оценить высказывание (A o B) o (B o A).

Если из A следует B, то из B следует A.

Наверное, в общем случае это неверно. Например, пусть:

 $1. \ A$  означает «у меня есть кот»;

Давайте попробуем оценить высказывание (A o B) o (B o A).

Если из A следует B, то из B следует A.

Наверное, в общем случае это неверно. Например, пусть:

- 1. A означает «у меня есть кот»;
- 2. B означает «у меня есть животное».

Давайте попробуем оценить высказывание (A o B) o (B o A).

Если из A следует B, то из B следует A.

Наверное, в общем случае это неверно. Например, пусть:

- $1. \ A$  означает «у меня есть кот»;
- 2. В означает «у меня есть животное».

#### Тогда:

 $1. \ A o B$  выполнена всегда;

Давайте попробуем оценить высказывание (A o B) o (B o A).

Если из A следует B, то из B следует A.

Наверное, в общем случае это неверно. Например, пусть:

- $1. \ A$  означает «у меня есть кот»;
- 2. B означает «у меня есть животное».

#### Тогда:

- 1.  $A \rightarrow B$  выполнена всегда;
- 2. B o A может не выполняться: скажем, у меня есть собака, но нет кота.

#### Оценка высказываний

Высказывание  $(A \to B) \to (B \to A)$  ложно, если, например:

- ▶ A «у меня есть кот»;
- ▶ B «у меня есть животное»;
- у меня есть собака, но нет кота.

#### Оценка высказываний

Высказывание (A o B) o (B o A) ложно, если, например:

- ▶ A «у меня есть кот»;
- ▶ В «у меня есть животное»;
- у меня есть собака, но нет кота.

Иначе: А ложно, В истинно, тогда высказывание ложно.

### Оценка высказываний

Высказывание (A o B) o (B o A) ложно, если, например:

- ▶ A «у меня есть кот»;
- ▶ В «у меня есть животное»;
- у меня есть собака, но нет кота.

Иначе: A ложно, B истинно, тогда высказывание ложно.

Чтобы задать оценку высказываний:

lacktriangle Зафиксируем множество истинностных значений  $V=\{\mathcal{U},\mathcal{J}\}$ 

### Оценка высказываний

Высказывание (A o B) o (B o A) ложно, если, например:

- ▶ A «у меня есть кот»;
- ▶ В «у меня есть животное»;
- у меня есть собака, но нет кота.

Иначе: A ложно, B истинно, тогда высказывание ложно.

Чтобы задать оценку высказываний:

- lacktriangle Зафиксируем множество истинностных значений  $V=\{\mathcal{U},\mathcal{J}\}$
- Определим функцию оценки переменных (интерпретацию) f : P 
   — V 
   (P множество пропозициональных переменных).

### Оценка высказываний

Высказывание (A o B) o (B o A) ложно, если, например:

- ▶ A «у меня есть кот»;
- ▶ B «у меня есть животное»;
- у меня есть собака, но нет кота.

Иначе: А ложно, В истинно, тогда высказывание ложно.

Чтобы задать оценку высказываний:

- lacktriangle Зафиксируем множество истинностных значений  $V=\{\mathcal{U},\mathcal{J}\}$
- ▶ Определим функцию оценки переменных (интерпретацию)  $f: P \to V$  (P множество пропозициональных переменных).

Если 
$$[\![A]\!]=\mathcal{J}$$
 и  $[\![B]\!]=\mathcal{U}$ , то  $[\![(A o B) o (B o A)]\!]=\mathcal{J}$ 

# Указание функции оценки (метаязык)

▶ Синтаксис для указания функции оценки переменных

$$\llbracket \alpha \rrbracket^{X_1:=v_1, \dots, X_n:=v_n}$$

▶ Это всё метаязык — потому полагаемся на здравый смысл

$$[A \& B \& (C \to C)]^{A:=\mathcal{U}, B:=[\neg A]}$$

Переменные

$$[\![X]\!] = f(X) \qquad [\![X]\!]^{X:=a} = a$$

$$||X||^{A:=a}=a$$

Переменные

$$[\![X]\!] = f(X)$$
  $[\![X]\!]^{X:=a} = a$ 

Отрицание

$$\llbracket \neg \alpha \rrbracket = \left\{ egin{array}{ll} \mathcal{I}, & \textit{если } \llbracket \alpha \rrbracket = \mathcal{U} \\ \mathcal{U}, & \textit{иначе} \end{array} \right.$$

Переменные

$$[X] = f(X)$$
  $[X]^{X:=a} = a$ 

Отрицание

$$\llbracket 
eg lpha 
rbracket = \left\{ egin{array}{ll} \mathcal{N}, & \textit{если } \llbracket lpha 
rbracket = \mathcal{N} \\ \mathcal{N}, & \textit{иначе} \end{array} 
ight.$$

Конъюнкция

$$\llbracket \alpha \& \beta \rrbracket = \left\{ egin{array}{ll} \mathcal{U}, & \textit{если } \llbracket \alpha \rrbracket = \llbracket \beta \rrbracket = \mathcal{U} \\ \mathcal{J}, & \textit{иначе} \end{array} \right.$$

Переменные

$$[X] = f(X)$$
  $[X]^{X:=a} = a$ 

Отрицание

$$\llbracket \neg \alpha \rrbracket = \left\{ egin{array}{ll} \mathcal{I}, & \mathit{если} \ \llbracket \alpha \rrbracket = \mathcal{U} \\ \mathcal{U}, & \mathit{иначe} \end{array} \right.$$

Конъюнкция

$$\llbracket \alpha \& \beta \rrbracket = \left\{ egin{array}{ll} \mathcal{U}, & \mathit{если} \ \llbracket \alpha \rrbracket = \llbracket \beta \rrbracket = \mathcal{U} \\ \mathcal{J}, & \mathit{иначe} \end{array} \right.$$

Дизъюнкция

$$\llbracket \alpha \lor \beta \rrbracket = \left\{ egin{array}{ll} arPi, & \mathit{если} \ \llbracket \alpha \rrbracket = \llbracket \beta \rrbracket = arPi \end{matrix} \right.$$
 И, иначе

$$[X] = f(X) \qquad [X]^{X:=a} = a$$

Отрицание

$$\llbracket 
eg lpha 
rbracket = \left\{egin{array}{ll} \mathcal{J}, & \textit{если } \llbracket lpha 
rbracket = \mathcal{U} \ \mathcal{U}, & \textit{иначе} \end{array}
ight.$$

Конъюнкция

$$\llbracket \alpha \& \beta 
rbracket = \left\{egin{array}{ll} \emph{И}, & \textit{если } \llbracket \alpha 
rbracket = \llbracket \beta 
rbracket = \emph{И} \\ \emph{Л}, & \textit{иначе} \end{array}\right.$$

Дизъюнкция

$$\llbracket lpha ee eta 
Vert = \left\{egin{array}{ll} \mathcal{J}, & \mathit{если} \ \llbracket lpha 
Vert = \llbracket eta 
Vert = \mathcal{J}, \\ \mathcal{U}, & \mathit{иначe} \end{array}
ight.$$

Импликация

#### Тавтологии

Если  $\alpha$  истинна при любой оценке переменных, то она *общезначима* (является *тавтологией*):

 $\models \alpha$ 

#### Тавтологии

Если  $\alpha$  истинна при любой оценке переменных, то она *общезначима* (является *тавтологией*):

$$\models \alpha$$

Выражение  $A \to A$  — тавтология. Переберём все возможные значения единственной переменной A:

$$[A \to A]^{A:=\mathcal{U}} = \mathcal{U}$$
$$[A \to A]^{A:=\mathcal{I}} = \mathcal{U}$$

#### Тавтологии

Если  $\alpha$  истинна при любой оценке переменных, то она *общезначима* (является *тавтологией*):

$$\models \alpha$$

Выражение  $A \to A$  — тавтология. Переберём все возможные значения единственной переменной A:

$$[A \to A]^{A:=\mathcal{U}} = \mathcal{U}$$
$$[A \to A]^{A:=\mathcal{I}} = \mathcal{U}$$

Выражение  $A \to \neg A$  тавтологией не является:

$$[\![A \to \neg A]\!]^{A:=\mathcal{U}} = \mathcal{J}$$

Если  $\alpha$  истинна при любой оценке переменных, при которой истинны высказывания  $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ , будем говорить, что  $\alpha$  — *следствие* этих высказываний:

$$\gamma_1,\ldots,\gamma_n\models\alpha$$

Если  $\alpha$  истинна при любой оценке переменных, при которой истинны высказывания  $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ , будем говорить, что  $\alpha$  — *следствие* этих высказываний:

$$\gamma_1,\ldots,\gamma_n \models \alpha$$

Истинна при какой-нибудь оценке — выполнима.

Если  $\alpha$  истинна при любой оценке переменных, при которой истинны высказывания  $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ , будем говорить, что  $\alpha$  — *следствие* этих высказываний:

$$\gamma_1,\ldots,\gamma_n \models \alpha$$

- Истинна при какой-нибудь оценке выполнима.
- ▶ Не истинна ни при какой оценке невыполнима.

Если  $\alpha$  истинна при любой оценке переменных, при которой истинны высказывания  $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ , будем говорить, что  $\alpha$  — *следствие* этих высказываний:

$$\gamma_1,\ldots,\gamma_n \models \alpha$$

- Истинна при какой-нибудь оценке выполнима.
- ▶ Не истинна ни при какой оценке невыполнима.
- ▶ Не истинна при какой-нибудь оценке опровержима.

### Теория доказательств

- ▶ Из чего состоит доказательство (неформально):
  - 1. Аксиомы утверждения, от которых отталкиваемся.
  - 2. Правила вывода способы делать умозаключения, переходить от одних утверждений к другим.

### Теория доказательств

- ▶ Из чего состоит доказательство (неформально):
  - 1. Аксиомы утверждения, от которых отталкиваемся.
  - 2. Правила вывода способы делать умозаключения, переходить от одних утверждений к другим.
- Давайте определим формально, что такое аксиомы и правила вывода, и затем дадим формальное определение доказательству как таковому.

#### Определение (схема высказывания)

Строка, строящаяся по правилам для построения высказываний, с одним отличием— вместо пропозициональных переменных можно указывать маленькие греческие буквы.

#### Определение (схема высказывания)

Строка, строящаяся по правилам для построения высказываний, с одним отличием — вместо пропозициональных переменных можно указывать маленькие греческие буквы.

По-простому: схемы высказываний — высказывания с метапеременными

#### Определение (схема высказывания)

Строка, строящаяся по правилам для построения высказываний, с одним отличием— вместо пропозициональных переменных можно указывать маленькие греческие буквы.

По-простому: схемы высказываний — высказывания с метапеременными

### Пример

$$\blacktriangleright (A \to \alpha) \lor (\beta \to B)$$

### Определение (схема высказывания)

Строка, строящаяся по правилам для построения высказываний, с одним отличием — вместо пропозициональных переменных можно указывать маленькие греческие буквы.

По-простому: схемы высказываний — высказывания с метапеременными

### Пример

- $\blacktriangleright (A \to \alpha) \lor (\beta \to B)$
- $(\alpha \to \beta) \to (\neg \beta \to \neg \alpha)$

#### Определение (схема высказывания)

Строка, строящаяся по правилам для построения высказываний, с одним отличием — вместо пропозициональных переменных можно указывать маленькие греческие буквы.

По-простому: схемы высказываний — высказывания с метапеременными

### Пример

- $\blacktriangleright (A \to \alpha) \lor (\beta \to B)$
- $(\alpha \to \beta) \to (\neg \beta \to \neg \alpha)$
- ► A ∨ B & A

#### Определение

Будем говорить, что высказывание  $\sigma$  строится (иначе: задаётся) по схеме Ш, если существует такая замена метапеременных  $u_1, u_2, ..., u_n$  в высказывании на какие-либо выражения  $\varphi_1, \varphi_2, ..., \varphi_n$ , что после её проведения получается высказывание  $\sigma$ :

$$\sigma = \coprod [\mathsf{u}_1 := \varphi_1][\mathsf{u}_2 := \varphi_2]...[\mathsf{u}_n := \varphi_n]$$

Заметьте, здесь ч; — мета-метапеременные для метапеременных, а Ш — мета-метапеременная для схем.

# Схемы высказываний: примеры

Схема

$$A \rightarrow \alpha \lor B \lor \alpha$$

задаёт, к примеру, следующие высказывания:

- $ightharpoonup A 
  ightarrow X \lor B \lor X$ , при  $\alpha := X$ .
- ightharpoonup A o (M o N) ee B ee (M o N), при lpha := M o N.

# Схемы высказываний: примеры

Схема

$$A \rightarrow \alpha \lor B \lor \alpha$$

задаёт, к примеру, следующие высказывания:

- $ightharpoonup A 
  ightarrow X \lor B \lor X$ , при  $\alpha := X$ .
- ▶  $A \rightarrow (M \rightarrow N) \lor B \lor (M \rightarrow N)$ , при  $\alpha := M \rightarrow N$ .

и НЕ задаёт следующие высказывания:

- $ightharpoonup A 
  ightharpoonup X \lor B \lor Y$  все вхождения lpha должны заменяться одинаково во всём выражении.
- ▶  $(A \to (M \to N) \lor B \lor M) \to N$  структура скобок должна сохраняться.

#### Аксиомы исчисления высказываний

#### Определение

Назовём следующие схемы высказываний схемами аксиом исчисления высказываний:

(1) 
$$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha$$

(2) 
$$(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma)$$

(3) 
$$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \& \beta$$

(4) 
$$\alpha \& \beta \rightarrow \alpha$$

(5) 
$$\alpha \& \beta \rightarrow \beta$$

(6) 
$$\alpha \rightarrow \alpha \vee \beta$$

(7) 
$$\beta \rightarrow \alpha \vee \beta$$

(8) 
$$(\alpha \to \gamma) \to (\beta \to \gamma) \to (\alpha \lor \beta \to \gamma)$$

$$(9) \quad (\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \neg \beta) \to \neg \alpha$$

(10)  $\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$ 

Все высказывания, которые задаются схемами аксиом, назовём аксиомами исчисления высказываний.

# Правило вывода Modus Ponens

Первый, упомянувший правило — Теофраст (древнегреческий философ, IV-III век до н.э.).

# Правило вывода Modus Ponens

Первый, упомянувший правило — Теофраст (древнегреческий философ, IV-III век до н.э.).

Переход по следствию: «сейчас сентябрь; если сейчас сентябрь, то сейчас осень; следовательно, сейчас осень».

# Правило вывода Modus Ponens

Первый, упомянувший правило — Теофраст (древнегреческий философ, IV-III век до н.э.).

Переход по следствию: «сейчас сентябрь; если сейчас сентябрь, то сейчас осень; следовательно, сейчас осень».

Если имеет место  $\alpha$  и  $\alpha \to \beta$ , то имеет место  $\beta$ .

$$\frac{\alpha \quad \alpha \to \beta}{\beta}$$

### Определение (доказательство в исчислении высказываний)

Доказательством (выводом) назовём конечную последовательность высказываний  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ ,

### Определение (доказательство в исчислении высказываний)

Доказательством (выводом) назовём конечную последовательность высказываний  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ , причём каждое  $\delta_i$  либо:

ightharpoonup является аксиомой — существует замена метапеременных для какой-либо схемы аксиом, позволяющая получить формулу  $\delta_i$ , либо

#### Определение (доказательство в исчислении высказываний)

Доказательством (выводом) назовём конечную последовательность высказываний  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ , причём каждое  $\delta_i$  либо:

- ightharpoonup является аксиомой существует замена метапеременных для какой-либо схемы аксиом, позволяющая получить формулу  $\delta_i$ , либо
- lacktriangle получается из  $\delta_1,\ldots,\delta_{i-1}$  по правилу Modus Ponens существуют такие индексы j< i и k< i, что  $\delta_k\equiv \delta_j o \delta_i$ .

### Определение (доказательство в исчислении высказываний)

Доказательством (выводом) назовём конечную последовательность высказываний  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ , причём каждое  $\delta_i$  либо:

- ightharpoonup является аксиомой существует замена метапеременных для какой-либо схемы аксиом, позволяющая получить формулу  $\delta_i$ , либо
- lacktriangleright получается из  $\delta_1,\ldots,\delta_{i-1}$  по правилу Modus Ponens существуют такие индексы j< i и k< i, что  $\delta_k\equiv \delta_j \to \delta_i$ .

#### Пример:

$$A \rightarrow (A \rightarrow A),$$
  
 $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A),$   
 $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A),$   
 $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A),$   
 $A \rightarrow A$ 

# Доказательство подробнее

Почему это доказательство? То же подробнее:

# Доказательство подробнее

Почему это доказательство? То же подробнее:

(1) 
$$A \rightarrow (A \rightarrow A)$$
  
 $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \ [\alpha, \beta := A]$ 

Сх. акс. 1

(1) 
$$A \to (A \to A)$$
 Cx. akc. 1  $\alpha \to \beta \to \alpha \ [\alpha, \beta := A]$ 

(2) 
$$(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$
 Cx. akc. 2  $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma) [\alpha, \gamma := A; \beta := A \rightarrow A]$ 

(1) 
$$A \to (A \to A)$$
 Cx. akc. 1  $\alpha \to \beta \to \alpha \ [\alpha, \beta := A]$ 

(2) 
$$(A \to (A \to A)) \to (A \to ((A \to A) \to A)) \to (A \to A)$$
 Cx. akc. 2  $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma) [\alpha, \gamma := A; \beta := A \to A]$ 

(3) 
$$(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$
 M.P. 1,2 
$$A \rightarrow (A \rightarrow A) \quad (A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$
 
$$(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$

(1) 
$$A \to (A \to A)$$
 Cx. akc. 1  $\alpha \to \beta \to \alpha \ [\alpha, \beta := A]$ 

(2) 
$$(A \to (A \to A)) \to (A \to ((A \to A) \to A)) \to (A \to A)$$
 Cx. akc. 2  $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma) [\alpha, \gamma := A; \beta := A \to A]$ 

(3) 
$$(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$

$$A \rightarrow (A \rightarrow A) \quad (A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$

$$(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$

$$(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$

$$(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$

(4) 
$$A \to ((A \to A) \to A)$$
 Cx. akc. 1  $\alpha \to \beta \to \alpha \ [\alpha := A, \beta := A \to A]$ 

(1) 
$$A \to (A \to A)$$
 Cx. akc. 1  $\alpha \to \beta \to \alpha \ [\alpha, \beta := A]$ 

(2) 
$$(A \to (A \to A)) \to (A \to ((A \to A) \to A)) \to (A \to A)$$
 Cx. akc. 2  $(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \beta \to \gamma) \to (\alpha \to \gamma) [\alpha, \gamma := A; \beta := A \to A]$ 

(3) 
$$(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$
 M.P. 1,2  
 $A \rightarrow (A \rightarrow A) \quad (A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$   
 $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$ 

(4) 
$$A \to ((A \to A) \to A)$$
 Cx. akc. 1  $\alpha \to \beta \to \alpha \ [\alpha := A, \beta := A \to A]$ 

(5) 
$$A \rightarrow A$$
 M.P. 4,3  $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$  M.P. 4,3  $A \rightarrow A$ 

### Дополнительные определения

### Определение (доказательство формулы $\alpha$ )

— такое доказательство (вывод)  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ , что  $\alpha \equiv \delta_n$ . Формула  $\alpha$  доказуема (выводима), если существует её доказательство. Обозначение:

 $\vdash \alpha$ 

## Дополнительные определения

## Определение (доказательство формулы $\alpha$ )

— такое доказательство (вывод)  $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ , что  $\alpha \equiv \delta_n$ . Формула  $\alpha$  доказуема (выводима), если существует её доказательство. Обозначение:

 $\vdash \alpha$ 

### Определение (вывод формулы lpha из гипотез $\gamma_1,\ldots,\gamma_k$ )

- такая последовательность  $\delta_1, \ldots, \delta_n$ , причём каждое  $\delta_i$  либо:
  - является аксиомой;
  - либо получается по правилу Modus Ponens из предыдущих;
  - lacktriangle либо является одной из гипотез: существует  $t:\delta_i\equiv\gamma_t.$

Формула  $\alpha$  выводима из гипотез  $\gamma_1,\dots,\gamma_k$ , если существует её вывод. Обозначение:

$$\gamma_1,\ldots,\gamma_k\vdash\alpha$$

### Корректность и полнота

#### Определение (корректность теории)

Теория корректна, если любое доказуемое в ней утверждение общезначимо. То есть,  $\vdash \alpha$  влечёт  $\models \alpha$ .

#### Определение (полнота теории)

Теория полна, если любое общезначимое в ней утверждение доказуемо. То есть,  $\models \alpha$  влечёт  $\vdash \alpha$ .

# Корректность исчисления высказываний

### Лемма (корректность)

Если  $\vdash \alpha$ , то  $\models \alpha$ 

#### Доказательство.

Индукция по длине вывода n. Для каждого высказывания  $\delta_n$  из вывода разбор случаев:

- 1. Аксиома убедиться, что все аксиомы общезначимы.
- 2. Modus Ponens j, k убедиться, что если  $\models \delta_j$  и  $\models \delta_j \rightarrow \delta_n$ , то  $\models \delta_n$ .

### Общезначимость схемы аксиом №9

Общезначимость схемы аксиом — истинность каждой аксиомы, задаваемой данной схемой, при любой оценке:

$$[\![(\alpha \to \beta) \to (\alpha \to \neg \beta) \to \neg \alpha]\!] = \mathsf{M}$$

Построим таблицу истинности формулы в зависимости от оценки  $\alpha$  и  $\beta$ :

$[\![\alpha]\!]$	$\llbracket\beta\rrbracket$	$[\neg \alpha]$	$\llbracket \alpha \to \beta \rrbracket$	$[\![\alpha \to \neg \beta]\!]$	$\llbracket (\alpha \to \neg \beta) \to \neg \alpha \rrbracket$	$\llbracket (lpha  ightarrow eta)  ightarrow (lpha  ightarrow \lnot eta)  ightarrow \lnot lpha  rbracket$
Л	Л	И	И	И	И	И
Л	И	И	И	И	И	И
И	Л	Л	Л	И	Л	И
И	И	Л	И	Л	И	И

Пусть в выводе есть формулы  $\delta_j, \ \delta_k = \delta_j \to \delta_n, \ \delta_n$  (причём j < n и k < n).

Пусть в выводе есть формулы  $\delta_j$ ,  $\delta_k = \delta_j \to \delta_n$ ,  $\delta_n$  (причём j < n и k < n).

Фиксируем какую-нибудь оценку. По индукционному предположению,  $\delta_j$  и  $\delta_j \to \delta_n$  общезначимы. Поэтому при данной оценке  $[\![\delta_i]\!] = \mathsf{N}$  и  $[\![\delta_i]\!] = \mathsf{N}$ .

Пусть в выводе есть формулы  $\delta_j$ ,  $\delta_k = \delta_j \to \delta_n$ ,  $\delta_n$  (причём j < n и k < n).

Фиксируем какую-нибудь оценку. По индукционному предположению,  $\delta_j$  и  $\delta_j \to \delta_n$  общезначимы. Поэтому при данной оценке  $[\![\delta_j]\!] = \mathsf{N}$  и  $[\![\delta_j \to \delta_n]\!] = \mathsf{N}$ .

Построим таблицу истинности для импликации:

$[\![\delta_j]\!]$	$[\![\delta_n]\!]$	$[\![\delta_j  o \delta_n]\!]$
Л	Л	И
Л	И	И
И	Л	Л
И	И	N

Пусть в выводе есть формулы  $\delta_j$ ,  $\delta_k = \delta_j \to \delta_n$ ,  $\delta_n$  (причём j < n и k < n).

Фиксируем какую-нибудь оценку. По индукционному предположению,  $\delta_j$  и  $\delta_j \to \delta_n$  общезначимы. Поэтому при данной оценке  $[\![\delta_j]\!] = \mathsf{N}$  и  $[\![\delta_j \to \delta_n]\!] = \mathsf{N}$ .

Построим таблицу истинности для импликации:

$[\![\delta_j]\!]$	$\llbracket \delta_{\boldsymbol{n}} \rrbracket$	$\llbracket \delta_j \to \delta_n  rbracket$
Л	Л	И
Л	И	И
И	Л	Л
И	И	И

Из таблицы видно, что  $[\![\delta_n]\!]=\Pi$  только если  $[\![\delta_j\to\delta_n]\!]=\Pi$  или  $[\![\delta_j]\!]=\Pi$ . Значит, это невозможно, и  $[\![\delta_n]\!]=\Pi$