

# Dnombrements

## Ensembles Finis

### MPSI 2

#### Propriété 0.0.1

Soit  $n$  et  $p$  deux entiers naturels non nuls.

Soit  $f$  une application de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, p \rrbracket$ .

- Si  $f$  est bijective, alors  $n = p$
- Si  $f$  est injective, alors  $n \leq p$
- Si  $f$  est surjective, alors  $n \geq p$

#### Définition 0.0.1

Soit  $E$  un ensemble non vide.

On dit que  $E$  est fini si il existe un entier naturel non nul  $n$  et une bijection de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  sur  $E$

Si un tel entier existe, il est unique et est le cardinal de  $E$ .

**Notations:**  $\text{card}(E)$ ,  $\#E$ ,  $|E|$

**Convention:**  $\text{card}(\emptyset) = 0$

#### Propriété 0.0.2

Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n$ .

Soit  $F$  un sous-ensemble de  $E$ .

Alors  $F$  est également un ensemble fini et  $\text{card}(F) \leq n$  et  $(\text{card}(F) = n) \iff (E = F)$

On procède par récurrence sur le cardinal de  $E$ .

**Lemme:** Si  $E$  est un ensemble fini de cardinal  $n \geq 1$ ,

Et si  $a$  est un élément de  $E$ ,

Alors  $E \setminus \{a\}$  est un ensemble fini de cardinal  $n - 1$

#### Démonstration de la propriété

Soit  $P(n)$  : Pour tout ensemble  $E$  de cardinal  $n$ , pour tout sous-ensemble  $F$  de  $E$ ,

$F$  est fini et  $\text{card}(F) \leq n$  et  $(\text{card}(F) = n) \iff (E = F)$

$n = 0$ :  $E = \emptyset$  et  $F = \emptyset$  et  $\text{card}(E) = \text{card}(F) = 0$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  tel que  $P(n-1)$  soit vrifi.

Montrons  $P(n)$

Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n$ .

Soit  $F$  une partie de  $E$ .

1<sup>er</sup> cas:  $F = E$  alors  $\text{card}(F) = n$

2<sup>me</sup> cas:  $F \neq E$

Alors  $\exists a \in E, a \notin F$

Soit  $a$  un tel lment.

$a \notin F$  donc  $F \subset E \setminus \{a\}$

Or, d'aprs la lemme,  $E \setminus \{a\}$  est de cardinal  $n-1$ , donc d'aprs l'hypothse de rccurrence,  $F$  est fini et  $\text{card}(F) \leq n-1$

Finalement:  $F = E \Rightarrow \text{card}(E) = \text{card}(F)$

$F \neq E \Rightarrow \text{card}(F) < \text{card}(E)$

D'o  $(\text{card}(F) = n) \iff (E = F)$

Donc  $P(n)$  est vrifi.

D'aprs le principe de rccurrence,  $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$

### Dmonstration du lemme

Soit  $E$  un ensemble fini de cardinal  $n \geq 1$ .

Il existe une bijection de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  sur  $E$ .

1<sup>er</sup> cas:  $n = 1$

$f: \{1\} \longrightarrow E$

$1 \longmapsto f(1)$

$E = \{f(1)\}$ , donc  $E \setminus \{f(1)\} = \emptyset$ , de cardinal 0.

2<sup>me</sup> cas:  $n \geq 2$

Soit  $a$  un lment de  $E$ .

$f$  réalise une bijection de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  sur  $E$ , donc  $\exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , unique,  $f(i) = a$

- Si  $i = n$  alors  $f(n) = a$

$f|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket}$  réalise une bijection de  $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$  sur  $f(\llbracket 1, n-1 \rrbracket)$

Or  $f(\llbracket 1, n-1 \rrbracket) = f(\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{n\})$   
 $= E \setminus \{a\}$

Donc  $f|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket}$  réalise une bijection de  $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$  sur  $E \setminus \{a\}$ .

Donc  $E$  est de cardinal  $n-1$

- Si  $i \neq n$

Notons  $i_0$  l'unique lment de  $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$  tel que  $f(i_0) = a$

On considère  $\tau: \llbracket 1, n-1 \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1, n-1 \rrbracket$

$$i \longmapsto \begin{cases} i & \text{si } (i \neq i_0 \text{ et } i \neq n) \\ i_0 & \text{si } i = n \\ n & \text{si } i = i_0 \end{cases}$$

$\tau$  réalise une bijection de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  sur  $\llbracket 1, n \rrbracket$ .

On applique ensuite le premier cas avec  $\tau(\llbracket 1, n \rrbracket)$  au lieu de  $\llbracket 1, n \rrbracket$

□

**Propriété 0.0.3**

Soit  $P$  une partie finie, non vide et incluse dans  $\mathbb{N}$ , de cardinal  $p$ .

Alors il existe une unique bijection strictement croissante de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  sur  $P$ .

**Existence:**

- $P$  est une partie non vide de  $\mathbb{N}$ , et admet un plus petit élément que l'on note  $y_1$ .  
On pose  $\phi(1) = y_1$
- Soit  $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$  tel que  $(\phi(i))_{i \in \llbracket 1, k \rrbracket}$  est défini et  $\phi(1) < \dots < \phi(k)$   
Soit  $P_k = \{x \in \mathbb{N}, x \in P \text{ et } x > \phi(k)\}$   
 $P_k$  est non vide car  $k < p$ , donc admet un plus petit élément. On le note  $\phi(k+1)$   
On construit alors  $\phi$  par itération, et elle est strictement croissante.

**Unicité:** Soit  $\psi$  une application strictement croissante bijective de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  sur  $P$ .

Alors  $P = \{\psi(1), \psi(2), \dots, \psi(p)\}$  et  $\psi(1) < \dots < \psi(p)$

- $\psi(1)$  est le plus petit élément de  $P$ , donc  $\psi(1) = \phi(1)$
- $\psi(2)$  est le plus petit élément de  $P \setminus \{\psi(1)\}$ . Or  $P \setminus \{\psi(1)\} = P_1$ , donc par définition,  $\phi(2) = \psi(2)$
- ...

Conclusion:  $\phi = \psi$

□

**Propriété 0.0.4**

Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles finis de même cardinal  $n$ .

Soit  $f : E \rightarrow F$  une application.

On a alors équivalence entre:

- ①  $f$  est injective
- ②  $f$  est surjective
- ③  $f$  est bijective

- ① Supposons  $f$  injective.

Montrer que  $f$  est surjective.

Donc montrer que  $f(E) = F$

Soit  $g : E \rightarrow f(E)$  une application.

$$x \mapsto f(x)$$

$g$  réalise une bijection de  $E$  sur  $f(E)$  par définition de l'espace d'arrivée.

Par ailleurs,  $E$  est de cardinal  $n$ , donc il existe une bijection  $\phi$  de  $\llbracket 1, n \rrbracket$  sur  $E$ .

$$g \circ \phi : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow f(E)$$

$g \circ \phi$  est une bijection, donc  $\text{card}(f(E)) = n$

D'où, sachant  $f(E) \subset F$  et  $\text{card}(E) = \text{card}(F)$ ,  $E = F$

Donc  $f$  est surjective.

② Supposons  $f$  surjective.

Montrer que  $f$  est bijective.

□