

2.1]

11d) n triangular \Rightarrow so are $9n+1$, $25n+3$, $49n+6$

$$n = \frac{m(m+1)}{2} \text{ for some } m \in \mathbb{N}$$

$$\text{Then } 9n+1 = \frac{9m(m+1)}{2} + 1 = \frac{9m^2 + 9m + 2}{2} = \frac{(3m+1)(3m+2)}{2}$$

$$= \frac{N(N+1)}{2} \text{ for } N = 3m+1, \text{ hence triangular.}$$

$$\text{Similarly, } 25n+3 = \frac{25m(m+1)}{2} + 3 = \frac{25m^2 + 25m + 6}{2} = \frac{(5m+2)(5m+3)}{2}$$

$$= \frac{N(N+1)}{2} \text{ for } N = 5m+2$$

and

$$49n+6 = \frac{49m^2 + 49m + 12}{2} = \frac{(7m+3)(7m+4)}{2} = \frac{N(N+1)}{2}$$

$$\text{for } N = 7m+3.$$



$$\begin{aligned}
 \underline{7} \quad & \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2 - \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\frac{n+1}{2} \right)^2 \left[(n+2)^2 - n^2 \right] \\
 & = \frac{(n+1)^2}{4} (n^2 + 4n + 4 - n^2) \\
 & = \frac{(n+1)^2}{4} (4n + 4) = (n+1)^3.
 \end{aligned}$$

■

$$\underline{8} \quad t_n = \frac{n(n+1)}{2} \implies \frac{1}{t_n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\begin{aligned}
 \text{Then } \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{t_n} &= 1 + 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\
 &\quad + \dots + 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\
 &= 1 + 2 \left(\frac{1}{2} \right) - \frac{2}{n+1}
 \end{aligned}$$

$$< 2.$$

■

10 Part-given numbers: $p_1 = 1$, $p_n = p_{n-1} + (3n-2)$ for $n \geq 2$

Prove: $p_n = \frac{n(3n-1)}{2}$ for $n \geq 1$

proof: The base case ($n=1$) obviously holds.

(
via
induction
=

Suppose that $p_n = \frac{n(3n-1)}{2}$ for some $n \in \mathbb{N}$.

Then $p_{n+1} = p_n + (3(n+1)-2)$

$$= \frac{n(3n-1)}{2} + 3n+1 \quad \text{via IH}$$

$$= \frac{3n^2 - n + 6n + 2}{2}$$

$$= \frac{3n^2 + 5n + 2}{2} = \frac{(3n+2)(n+1)}{2}$$

$$= \frac{(n+1)(3(n+1)-1)}{2}$$



2.2]

31c) $n \in \mathbb{N} \Rightarrow n^4 = 5k$ or $n^4 = 5k+1$:

By the Binomial Theorem, $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.

If $n \in \mathbb{N}$, then $n = 5q+r$ for $0 \leq r < 5$, so

$$n^4 = (5q+r)^4 = 625q^4 + 4(125q^3)r + 6(25q^2)r^2 + 4(5q)r^3 + r^4$$

$$= 5 \underbrace{(125q^4 + 100q^3r + 30q^2r^2 + 4qr^3)}_{\text{multiple of 5}} + r^4 ;$$

it remains to analyze r^4 for $r=0,1,2,3,4$:

$$r=0 \Rightarrow r^4=0$$

$$r=3 \Rightarrow r^4=81=80+1$$

$$r=1 \Rightarrow r^4=1$$

$$r=4 \Rightarrow r^4=256=255+1$$

$$r=2 \Rightarrow r^4=16=15+1$$

In each case, $r^4 = 5k$ or $r^4 = 5k+1$.



$$\underline{6} \quad n \in \mathbb{N} \implies n^3 = 7k, \quad 7k+1, \quad \text{or} \quad 7k-1$$

pf: If $n = 7m$ for some $m \in \mathbb{N}$, then $n^3 = 7(49m^3) = 7k$.

Otherwise, $n = 7m + r$ for some $m \in \mathbb{N}$, $0 < r < 7$, and

$$(7m + r)^3 = \underbrace{343m^3 + 3(49m^2)r + 3(7m)r^2 + r^3}_{\text{multiple of } 7}.$$

It suffices to analyze r^3 for $r = 1, 2, 3, 4, 5, 6$:

r	r^3
1	1
2	$8 = 7 + 1$
3	$27 = 28 - 1 = 7 \cdot 4 - 1$
4	$64 = 63 + 1 = 7 \cdot 9 + 1$
5	$125 = 126 - 1 = 7 \cdot 18 - 1$
6	$216 = 217 - 1 = 7 \cdot 31 - 1$

in each case,
 $r^3 = 7k + 1$ or
 $r^3 = 7k - 1$.

8 No integer in the sequence $11, 111, 1111, \dots$ is a perfect square.

pf.: As in the hint, each of these numbers is of the form $4k+3$.

Given $n \in \mathbb{N}$, $n = 2k$ or $n = 2k+1$, so

$$n^2 = 4k^2 \quad \text{or} \quad n^2 = 4(k^2+k)+1.$$

In other words, a perfect square cannot be of the form $4k+3$.



10 For $n \geq 1$, the integer $n(7n^2 + 5)$ is a multiple of 6.

pf. Note that $7n^2 + 5 = 6n^2 + n^2 + 6 - 1 = 6(n^2 + 1) + n^2 - 1$, so
 $n(7n^2 + 5) = n(6(n^2 + 1) + n^2 - 1) = 6n(n^2 + 1) + n(n^2 - 1)$.

We therefore have to show that $n(n^2 - 1)$ is divisible by 6.

Consider cases:

n	$n(n^2 - 1)$
$6m$	$6m(n^2 - 1) \checkmark$
$6m + 1$	$n(16m + 1)^2 - 1 = n(36m^2 + 12m) \checkmark$
$6m + 2$	$6m + 2)(16m + 2)^2 - 1 = 16m + 2)(36m^2 + 24m + 3)$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{even}}$ $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{multiple of 3}}$ </div> \checkmark
$6m + 3$	$16m + 3)(16m + 3)^2 - 1 = 16m + 3)(36m^2 + 36m + 8)$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{multiple of 3}}$ $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{even}}$ </div> \checkmark
$6m + 4$	$16m + 4)(16m + 4)^2 - 1 = 16m + 4)(36m^2 + 48m + 15)$ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{even}}$ $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{mult. of 3}}$ </div> \checkmark

$$\begin{array}{r|l}
 n & n(n^2-1) \\
 6n+5 & (6n+5)((6n+5)^2-1) \\
 & = (6n+5)(36n^2+60n+24) \\
 & \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{multiple of 6}}
 \end{array}$$

□