

CEVAC® TRANSMUNE®

Vacuna viva de complejo inmune contra Bursitis Infecciosa,
Cepa Winterfield 2512 G-61 y anticuerpos contra IBD
Para la inmunización activa de pollos de engorde (broilers)

20x 1000 dosis

00000



CEVAC® TRANSMUNE®
20 x 1000 dosis

STD 700

Producido por: Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals
Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.5., Hungría.

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA,
Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801,
Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.
Reg. SAG N°: 2193-B

Fecha de Fab.:

Serie n°:

Fecha de Exp.:

APROBADO
SAG

10-05-2022

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa Winterfield 2512, G-61 0.1 - 80 CID₅₀

Excipientes csp 1 dosis

Administración por inyección *in ovo* o subcutánea.

ADVERTENCIA

Utilizar el contenido de este empaque inmediatamente después de la reconstitución.

No aceptar si el sello está roto.

Ver detalles en inserto incluido.

ALMACENAMIENTO

Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinaria

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® TRANSMUNE®

Vacuna viva de complejo inmune contra
Bursitis Infecciosa,
Cepa Winterfield 2512 G-61 y anticuerpos contra IBD

1000 dosis



Polvo Liofilizado

Administración:

Inyección in ovo o subcutánea.

Almacenamiento:

Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

Advertencia:

Utilizar todo el contenido del frasco de una sola vez. Ver instrucciones completas en el inserto.

USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

Reg. SAG No.: 2193-B

APROBADO
SAG

10-05-2022

00000 - Producido por
Ceva-Phylaxia, Hungría
Fab.:
Serie No.:
Exp.:

CEVAC® TRANSMUNE®

Vacuna viva de complejo inmune contra Bursitis Infecciosa,
Cepa Winterfield 2512 G-61 y anticuerpos contra IBD
Para la inmunización activa de pollos de engorde (broilers)

20x 5000 dosis

58886-02



CEVAC® TRANSMUNE®
20 x 5000 dosis

STD 700

Producido por:

Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5., Hungría.

Fecha de Fab.:

Serie n°:

Fecha de Exp.:

APROBADO
SAG

10-05-2022

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA,
Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801,
Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.
Reg. SAG N°: 2193-B

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa Winterfield 2512, G-61 0.1 - 80 CID₅₀

Excipientes csp 1 dosis

Administración por inyección *in ovo* o subcutánea.

ADVERTENCIA

Utilizar el contenido de este empaque inmediatamente después de la reconstitución.

No aceptar si el sello está roto.

Ver detalles en inserto incluido.

ALMACENAMIENTO: Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinaria

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

STD 434

CEVAC® TRANSMUNE®

Vacuna viva de complejo inmune contra
Bursitis Infecciosa,
Cepa Winterfield 2512 G-61 y anticuerpos contra IBD

5000 dosis



Polvo Liofilizado

Administración:

Inyección in ovo o subcutánea.

Almacenamiento:

Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

Advertencia:

Utilizar todo el contenido del frasco de una sola vez. Ver instrucciones completas en el inserto.

**USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Reg. SAG No: 2193-B

**APROBADO
SAG**

10-05-2022

58885-01 - Producido por:
Ceva-Phylaxia, Hungría

Fab.:

Serie No.:

Exp.:

CEVAC® TRANSMUNE®

Vacuna viva de complejo inmune contra Bursitis Infecciosa,
Cepa Winterfield 2512 G-61 y anticuerpos contra IBD
Para la inmunización activa de pollos de engorde (broilers)

20x 10000

00000

dosis



CEVAC® TRANSMUNE®
20 x 10000 dosis

STD 700

Producido por: Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals
Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.5., Hungría.

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA,
Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801,
Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.
Reg. SAG N°: 2193-B

Fecha de Fab.:

Serie n°:

Fecha de Exp.:

APROBADO
SAG

10-05-2022

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa Winterfield 2512, G-61 0.1 - 80 CID₅₀

Excipientes csp 1 dosis

Administración por inyección *in ovo* o subcutánea.

ADVERTENCIA

Utilizar el contenido de este empaque inmediatamente después de la reconstitución.

No aceptar si el sello está roto.

Ver detalles en inserto incluido.

ALMACENAMIENTO

Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinaria

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® TRANSMUNE®

Vacuna viva de complejo inmune contra
Bursitis Infecciosa,
Cepa Winterfield 2512 G-61 y anticuerpos contra IBD

10000 dosis



Polvo Liofilizado

Administración:

Inyección in ovo o subcutánea.

Almacenamiento:

Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

Advertencia:

Utilizar todo el contenido del frasco de una sola vez. Ver instrucciones completas en el inserto.

USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

Reg. SAG No.: 2193-B

APROBADO
SAG

10-05-2022

00000 - Producido por
Ceva-Phylaxia, Hungría
Fab.:
Serie No.:
Exp.:

CEVAC[®] TRANSMUNE

Diluyente estéril para administración
in ovo - subcutanea

5x100 ml
5x250 ml
5x500 ml

5x200 ml
5x400 ml



CEVAC[®] TRANSMUNE

Diluyente estéril para administración
in ovo - subcutanea

5x100 ml
5x250 ml
5x500 ml

5x200 ml
5x400 ml



COMPOSICIÓN

Cada mL de diluyente contiene	
Cloruro de sodio	8.0 mg
Cloruro de potasio	0.2 mg
Fosfato disódico dihidrato	1.422 mg
Fosfato dipotásico dihidrógeno	0.2 mg
Agua para inyección csp	1 mL

Almacenar entre 5 - 25°C. No congelar.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Importado y distribuido por:
Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.
Para ser usado en la vacuna Reg. SAG N° 2193-B

**APROBADO
SAG**

10-05-2022

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

USO VETERINARIO

CEVAC® TRANSMUNE

Diluyente estéril para administración
in ovo - subcutanea

100 ml
200 ml
250 ml
400 ml
500 ml



COMPOSICIÓN

Cada mL de diluyente contiene

Cloruro de sodio	8.0 mg
Cloruro de potasio	0.2 mg
Fosfato disódico dihidrato	1.422 mg
Fosfato dipotásico dihidrógeno	0.2 mg
Agua para inyección csp	1 mL

Almacenar entre 5 - 25°C. No congelar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Para ser usado en la vacuna Reg. SAG N° 2193-B

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

**APROBADO
SAG**

10-05-2022

USO VETERINARIO



CEVAC CEVA[®] TRANSMUNE
Diluyente estéril para vacunas (Solución salina)
5x500 ml

COMPOSICIÓN

Cloruro de sodio 9.0 mg
Agua para inyección c.s.p. 1.0 ml

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ALMACENAR ENTRE 5 - 25°C. NO CONGELAR

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.
Para ser usado en la vacuna Reg. SAG N° 2193-B

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Fabricado por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. - 1107 Budapest Szállás
u. 5. Hungría

**APROBADO
SAG**

10-05-2022



CEVAC CEVA[®] TRANSMUNE
Diluyente estéril para vacunas (Solución salina)
500 ml

COMPOSICIÓN

Cloruro de sodio 9.0 mg
Agua para inyección c.s.p. 1.0 ml

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ALMACENAR ENTRE 5 - 25°C. NO CONGELAR

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Para ser usado en la vacuna Reg. SAG N° 2193-B

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Fabricado por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. - 1107 Budapest Szállás
u. 5. Hungría

**APROBADO
SAG**

10-05-2022



00000



CEVAC CEVA[®] TRANSMUNE

Diluyente estéril para vacunas (Solución salina)
5x1000 ml

COMPOSICIÓN

Cloruro de sodio 9.0 mg
Agua para inyección c.s.p. 1.0 ml

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ALMACENAR ENTRE 5 - 25°C. NO CONGELAR

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.
Para ser usado en la vacuna Reg. SAG N° 2193-B

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Fabricado por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. - 1107 Budapest Szállás
u. 5. Hungría

APROBADO
SAG
10-05-2022



CEVAC CEVA[®] TRANSMUNE

Diluyente estéril para vacunas (Solución salina)

1000 ml

COMPOSICIÓN

Cloruro de sodio 9.0 mg

Agua para inyección c.s.p. 1.0 ml

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAR ENTRE 5 - 25°C. NO CONGELAR

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Para ser usado en la vacuna Reg. SAG N° 2193-B

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Fabricado por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. - 1107 Budapest Szállás
u. 5. Hungria

APROBADO
SAG

10-05-2022



00000

CEVAC® TRANSMUNE®

Vacuna viva de complejo inmune contra Bursitis Infecciosa,
Cepa Winterfield 2512 G-61 y anticuerpos contra IBD
Para la inmunización activa de pollos de engorde (broilers)



APROBADO
SAG

10-05-2022

COMPOSICION

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa Winterfield 2512, G-61 0.1 - 80 CID₅₀

Excipientes csp 1 dosis

INDICACION DE USO

Para la inmunización activa de embriones de pollos broilers sanos de 18 días de edad o pollos broilers sanos de 1 día de edad, para prevenir la Bursitis Infecciosa.

PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra virus Gumboro. El contenido de anticuerpos presentes en la vacuna forman un complejo inmune

con el virus vacunal de tipo intermedio-plus o caliente que permite la liberación lenta del virus y su replicación en la bolsa de Fabricio, cuando los anticuerpos neutralizantes maternos alcanzan un valor GMT $\geq$ 3.000.

CONTRAINDICACIONES

No vacunar embriones o pollitos de 1 día de edad que provengan de reproductoras no vacunadas contra IBD antes del comienzo de la postura y cuyos anticuerpos neutralizantes sean menores a GMT < 3000 título VN.

EFFECTOS NO DESEADOS

La aplicación de CEVAC® TRANSMUNE® a pollos (embriones) sin anticuerpos maternos contra IBD podría causar daños de la bolsa y significativa inmunosupresión.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

La vacuna puede ser administrada por inyección *in ovo* o subcutánea.

- Inyección *in ovo* para huevos de pollo embrionados de 18 días de incubación: la dosis de vacuna rehidratada es 0.05 ml, (por ejemplo 2000 dosis reconstituidas con 100 ml de diluyente, 5000 dosis reconstituidas con 250 ml de diluyente o 10 000 dosis reconstituidas con 500 ml de diluyente).
- Inyección subcutánea para pollos de 1 día de edad: la dosis de vacuna rehidratada es 0.1 ml (por ejemplo 1000 dosis reconstituidas con 100 ml de diluyente, 2000 dosis reconstituidas con 200 ml de diluyente, 2500 dosis reconstituidas con 250 ml de diluyente o 5000 dosis reconstituidas con 500 ml de diluyente).



Disolver completamente el contenido de la vacuna liofilizada contenida en el frasco en un volumen de diluyente que corresponda al tamaño del envase y la ruta de administración (*in ovo* o subcutánea).

Método de inyección *in ovo*

Los embriones deberán ser inyectados a los 18 días de edad, prácticamente al momento de la transferencia de huevos de las bandejas de incubación a las bandejas de nacedoras. Antes de la inyección, verifique la correcta posición de los huevos (eje vertical largo con la cámara de aire hacia arriba).

Úsele únicamente equipo de inyección automático específico para la inyección *in ovo*.

Después de la inyección, los huevos deben ser transferidos a las bandejas de nacedoras sin demora a fin de prevenir cualquier daño por enfriamiento de los embriones.

Método de inyección subcutánea

Esta deberá ser realizada bajo la piel del cuello del ave por medio de un equipo de inyección automático o manual.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Debe hacerse ovoscopia de los huevos que serán inyectados y los embriones muertos deberán ser separados y descartados.

El equipo utilizado para la inyección debe estar libre de residuos de desinfectantes.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda disponer los desechos mediante incineración.

Producto sin utilizar deben ser devueltos a la empresa importadora.

ALMACENAMIENTO

Liofilizado: Mantener refrigerado entre 2° y 8°C. No congelar.

Diluyente: Almacenar entre 5° y 25°C. No congelar.

INTERACCIONES CON OTRAS VACUNAS Y MEDICAMENTOS

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos o posteriores a la inmunización.

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Inyección *in ovo*: inyección de huevos embrionados de 18 días de edad.

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801 Las Condes, Santiago. Bajo licencia de Ceva Santé Animal, France.
Reg. SAG N°: 2193-B

APROBADO
SAG

10-05-2022

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Hungría



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** CEVAC CEVA® TRANSMUNE
- b) **Nombre Genérico:** Vacuna viva de complejo inmune contra Bursitis Infecciosa
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo Liofilizado

2. Composición

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa Winterfield 2512, G-61

0,1 - 80 CID₅₀

Excipientes csp

1 dosis

3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular de inmunidad activa contra virus Gumboro. El contenido de anticuerpos presentes en la vacuna, forman un complejo inmune con el virus vacunal de tipo intermedio-plus o caliente (hot) que permite la liberación lenta del virus y su replicación en la bolsa de Fabricio, cuando los anticuerpos neutralizantes maternos alcanzan un valor GMT > 3.000

4. Particularidades clínicas

- a) **Especies de destino y subcategoría:** Pollos broilers

- b) **Indicaciones de uso:**

Inmunización activa de embriones sanos de pollo y pollitos sanos, contra la enfermedad causada por cepas clásicas y muy virulentas del virus de la enfermedad infecciosa de la bursa (IBD o enfermedad de Gumboro)

- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo:**

Dosis:

0.05 ml/embrión, como dosis única

0.1 ml/pollito, como dosis única

Edad o peso:

Huevos embrionados: 18 días de incubación.

Pollos: 1 día de edad

Condición fisiológica

Embriones y animales sanos

Vía de administración:

In ovo y Subcutánea

Modo de empleo:

Disolver completamente el contenido liofilizado del frasco en un volumen de diluyente que corresponda al tamaño del envase y a la ruta de administración (in ovo o subcutánea).

APROBADO
SAG
10-05-2022



Inyección in ovo

La dosis de vacuna rehidratada es 0.05 ml (por ejemplo 2.000 dosis reconstituidas con 100 ml de diluyente, 5.000 dosis reconstituidas con 250 ml de diluyente o 10.000 dosis reconstituidas con 500 ml de diluyente).

Los embriones deberán ser inyectados a los 18 días de edad, prácticamente al momento de la transferencia de bandejas de incubadora a bandejas de nacedoras. Antes de la inyección, verificar la posición correcta de los huevos (largo del eje vertical con la celda de aire hacia arriba).

Use únicamente equipo de inyección automático dedicado a la inyección in ovo. Luego de la inyección, los huevos deben ser transferidos a las bandejas de la nacedora sin demora a fin de prevenir cualquier daño de enfriamiento de los embriones.

Inyección subcutánea

La dosis de vacuna rehidratada es 0.1 ml (por ejemplo 1.000 dosis reconstituidas con 100 ml de diluyente, 2.000 dosis reconstituidas con 200 ml de diluyente, 2.500 dosis reconstituidas con 250 ml de diluyente o 5.000 dosis reconstituidas con 500 ml de diluyente).

Esta deberá realizarse bajo la piel del cuello del ave por medio de un equipo de inyección automático o manual.

Administrar en forma aséptica

d) **Contraindicaciones:**

No vacunar embriones o pollitos de un día que provengan de reproductoras no vacunadas contra IBD antes del comienzo de la postura y cuyos anticuerpos neutralizantes sean menores a GMT < 3.000 título VN.

No usar el producto en embriones de menos de 18 días.

e) **Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:**

La administración de la vacuna a pollos (embriones) sin anticuerpos maternos contra infección bursal, puede causar daño bursal y significativa inmunosupresión.

f) **Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Los implementos usados para la vacunación deberán estar libres de cualquier residuo de desinfectante.

Deberá realizarse ovoscopia de los huevos que serán inyectados y los embriones muertos deberán ser separados y descartados.

Mantener fuera del alcance de los niños

APROBADO
SAG

10-05-2022

g) **Uso durante la postura y reproducción**

No aplica.

h) **Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado:**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.



- i) **Sobredosis.**
La aplicación de 10 veces la dosis ha demostrado ser segura, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.
- j) **Periodo de resguardo**
Cero días
- k) **Precauciones especiales para el operador:**
Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

5. Particularidades farmacéuticas

- a) **Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado:**
No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente que forma parte de la vacuna.
- b) **Periodo de eficacia:**
24 meses.
Utilizar inmediatamente una vez reconstituida
- c) **Condiciones de almacenamiento:**
Liofilizado: mantener refrigerado entre 2 y 8°C. No congelar.
Diluyente: mantener entre 5- 25°C. No congelar.
- d) **Descripción de los envases:**
Caja etiquetada, con 5 frascos de vidrio o plástico, etiquetados, cerrados con tapones de goma y sellados con cápsulas de aluminio y tapas de plástico, conteniendo 100, 200 o 250 mL, equivalente a 50, 100 o 125 dosis. Incluye prospecto interno.
Fracción liofilizada:
Estuche de cartulina impresa, con 20 frascos de vidrio, etiquetados, cerrados con tapón de goma, sellados con cápsula de aluminio y tapa de plástico, conteniendo 1.000, 2.000, 2.500, 4.000, 5.000, 8.000 ó 10.000 dosis. Incluye prospecto interno.
Diluyente PBS:
Estuche de cartulina impresa, con 5 frascos de plástico, etiquetados, cerrados con tapón de goma, sellados con cápsula de aluminio y tapa de plástico, conteniendo 100, 200, 250, 400 ó 250 mL
Diluyente Solución salina:
Estuche de cartulina impresa, con 5 frascos de plástico etiquetados, cerrados con tapón de goma, sellados con cápsula de aluminio y tapa de plástico conteniendo 500 ó 1.000 mL.
- e) **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere:**
Se recomienda disponer los desechos mediante incineración. Producto sin utilizar debe ser devuelto a la empresa importadora.

APROBADO
SAG
10-05-2022



6. Condición de venta.

Venta bajo receta medico veterinaria

7. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda

Fabricado por:

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5, Hungría

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

APROBADO
SAG

10-05-2022

Bajo licencia de CEVA Sante Animale, Francia

Registro SAG N° 2193-B

USO VETERINARIO