

CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa
y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

APROBADO
SAG

22-02-2023

1 x 250 mL/
1x500
dosis



CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa
y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

1 x 250 mL/
1x500
dosis



Composición: Cada dosis de 0.5 mL contiene:

S. enteritidis, Cepa 038-090, Fagotito 13A $\geq 4 \log 2$ MAT.
A. paragallinarum, serotipo A, Cepa 175 $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.
A. paragallinarum, serotipo B, Cepa 176 $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.
A. paragallinarum, serotipo C, Cepa 177 $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.
Excipientes csp. 0.5 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante: Hidróxido de aluminio gel.

MAT: Título microaglutinación

UFC: Unidades formadoras de colonias

Especies de destino: Gallinas de postura y reproductoras.

Indicación de uso: Como ayuda en la prevención de Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo: La vacuna debe administrarse a lotes de aves entre 8-12 semanas de edad.

La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0,5 ml por ave.

Primovacunación: entre 8-12 semanas de edad.

Booster: 4 semanas posteriores a la primo vacunación.

Contraindicaciones: No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.

Precauciones Generales: Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Debe usarse equipo de inyección estéril.

La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla.

Agitar suficientemente el frasco antes de su uso.

Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada.

Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

Advertencia: No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Precauciones especiales para el operador: Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

Periodo de resguardo: Cero días.

Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado: entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Venta bajo receta médico veterinaria

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5. Hungría

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile. Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°:2256-B

USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa
y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

APROBADO
SAG
22-02-2023

5x250 mL/
**5x500
dosis**



CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa
y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

5x250 mL/
**5x500
dosis**



Composición: Cada dosis de 0.5 mL contiene:

S. enteritidis, Cepa 038-090, Fagotito 13A $\geq 4 \log_2$ MAT.
A. paragallinarum, serotipo A, Cepa 175 $5 \times 7 \log_{10}$ UFC pre inactivación.
A. paragallinarum, serotipo B, Cepa 176 $5 \times 7 \log_{10}$ UFC pre inactivación.
A. paragallinarum, serotipo C, Cepa 177 $5 \times 7 \log_{10}$ UFC pre inactivación.
Excipientes csp. 0.5 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante: Hidróxido de aluminio gel.

MAT: Título microaglutinación

UFC: Unidades formadoras de colonias

Especies de destino: Gallinas de postura y reproductoras.

Indicación de uso: Como ayuda en la prevención de Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo: La vacuna debe administrarse a lotes de aves entre 8-12 semanas de edad.

La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0,5 ml por ave.

Primovacunación: entre 8-12 semanas de edad.

Booster: 4 semanas posteriores a la primo vacunación.

Contraindicaciones: No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.

Precauciones Generales: Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Debe usarse equipo de inyección estéril.

La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla.

Agitar suficientemente el frasco antes de su uso.

Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada.

Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

Advertencia: No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Precauciones especiales para el operador: Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

Periodo de resguardo: Cero días.

Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado: entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Venta bajo receta médico veterinaria

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5. Hungría

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile. Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°:2256-B

USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra
Coriza Infecciosa y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

APROBADO
SAG

22-02-2023

250 ml/
500
dosis



00000

Composición: Cada dosis de 0.5 mL contiene:

S. enteritidis, Cepa 038-090, Fagotipo 13A..... $\geq 4 \log 2$ MAT.

A. paragallinarum, serotipo A, Cepa 175..... $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.

A. paragallinarum, serotipo B, Cepa 176..... $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.

A. paragallinarum, serotipo C, Cepa 177..... $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.

Excipientes csp.....0.5 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante: Hidróxido de aluminio gel.

MAT: Título microaglutinación

UFC: Unidades formadoras de colonias

Especies de destino:

Gallinas de postura y reproductoras.

Indicación de uso:

Como ayuda en la prevención de Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo:

La vacuna debe administrarse a lotes de aves entre 8-12 semanas de edad. La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

Primovacunación: entre 8-12 semanas de edad.

Booster: 4 semanas posteriores a la primo vacunación.

Contraindicaciones: No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.

Precauciones Generales: Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Debe usarse equipo de inyección estéril.

La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla. Agitar suficientemente el frasco antes de su uso. Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada. Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

Advertencia: No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Precauciones especiales para el operador: Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

Periodo de resguardo: Cero días.

Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado: entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Venta bajo receta médico veterinaria

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5. Hungría

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud

Animal Chile SpA, Av.

Apoquindo 3669, of.801

Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé

Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 2256-B

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado:

Serie:

Vence:

STD 487

CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa
y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

1x500 mL/
1x1000
dosis



APROBADO
SAG
22-02-2023

CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa
y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

1x500 mL/
1x1000
dosis



Composición: Cada dosis de 0.5 mL contiene:
S. enteritidis, Cepa 038-090, Fagotito 13A $\geq 4 \log 2$ MAT.
A. paragallinarum, serotipo A, Cepa 175 $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.
A. paragallinarum, serotipo B, Cepa 176 $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.
A. paragallinarum, serotipo C, Cepa 177 $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.
Excipientes csp. 0.5 mL
Preservante: Timerosal
Adyuvante: Hidróxido de aluminio gel.
MAT: Título microaglutinación
UFC: Unidades formadoras de colonias
Especies de destino: Gallinas de postura y reproductoras.
Indicación de uso: Como ayuda en la prevención de Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de Salmonella enteritidis.
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo: La vacuna debe administrarse a lotes de aves entre 8-12 semanas de edad.
La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0,5 ml por ave.
Primovacunación: entre 8-12 semanas de edad.
Booster: 4 semanas posteriores a la primo vacunación.
Contraindicaciones: No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.
Precauciones Generales: Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Debe usarse equipo de inyección estéril.

La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla.
Agitar suficientemente el frasco antes de su uso.
Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada.
Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.
Advertencia: No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.
Precauciones especiales para el operador: Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.
Periodo de resguardo: Cero días.
Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado: entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz.
Venta bajo receta médico veterinaria
Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5. Hungría
Importado y distribuido por:
En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801 Las Condes, Santiago - Chile. Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.
Reg. SAG N°:2256-B

USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa
y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

APROBADO
SAG

22-02-2023

5x500 mL/
**5x1000
dosis**



CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra Coriza Infecciosa
y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

5x500 mL/
**5x1000
dosis**



51331-01

Composición: Cada dosis de 0.5 mL contiene:

S. enteritidis, Cepa 038-090, Fagotito 13A $\geq 4 \log_2$ MAT.
A. paragallinarum, serotipo A, Cepa 175 $5 \times 7 \log_{10}$ UFC pre inactivación.
A. paragallinarum, serotipo B, Cepa 176 $5 \times 7 \log_{10}$ UFC pre inactivación.
A. paragallinarum, serotipo C, Cepa 177 $5 \times 7 \log_{10}$ UFC pre inactivación.
Excipientes csp 0.5 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante: Hidróxido de aluminio gel.

MAT: Título microaglutinación

UFC: Unidades formadoras de colonias

Especies de destino: Gallinas de postura y reproductoras.

Indicación de uso: Como ayuda en la prevención de Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo: La vacuna debe administrarse a lotes de aves entre 8-12 semanas de edad.

La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0,5 ml por ave.

Primovacuna: entre 8-12 semanas de edad.

Booster: 4 semanas posteriores a la primo vacunación.

Contraindicaciones: No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.

Precauciones Generales: Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Debe usarse equipo de inyección estéril.

La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla.

Agitar suficientemente el frasco antes de su uso.

Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada.

Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

Advertencia: No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Precauciones especiales para el operador: Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

Periodo de resguardo: Cero días.

Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado: entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Venta bajo receta médico veterinaria

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5. Hungría

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes, Santiago - Chile bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia

Registro SAG N° 2256-B

USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® CORYMUNE 4 K

Vacuna inactivada contra
Coriza Infecciosa y *Salmonella enteritidis*
Suspensión inyectable

APROBADO
SAG

22-02-2023

51330-01

500 ml/
1000
dosis



Composición: Cada dosis de 0.5 mL contiene:

S. enteritidis, Cepa 038-090, Fagotito 13A..... $\geq 4 \log 2$ MAT.

A. paragallinarum, serotipo A, Cepa 175.....

..... $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.

A. paragallinarum, serotipo B, Cepa 176.....

..... $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.

A. paragallinarum, serotipo C, Cepa 177.....

..... $5 \times 7 \log 10$ UFC pre inactivación.

Excipientes csp.....0.5 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante: Hidróxido de aluminio gel.

MAT: Título microaglutinación

UFC: Unidades formadoras de colonias

Especies de destino:

Gallinas de postura y reproductoras.

Indicación de uso:

Como ayuda en la prevención de Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo:

La vacuna debe administrarse a lotes de aves entre 8-12 semanas de edad. La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0,5 ml por ave.

Primovacuna: entre 8-12 semanas de edad.

Booster: 4 semanas posteriores a la primo vacunación.

Contraindicaciones: No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.

Precauciones Generales: Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Debe usarse equipo de inyección estéril.

La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla. Agitar suficientemente el frasco antes de su uso. Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada. Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

Advertencia: No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Precauciones especiales para el operador: Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

Periodo de resguardo: Cero días.

Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado: entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Venta bajo receta médico veterinaria

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5. Hungría

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes Santiago - Chile bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia Registro SAG N° 2256-B

USO VETERinario

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado:

Serie:

Vence:



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** CEVAC CEVA® CORYMUNE 4K
- b) **Nombre Genérico:** Vacuna inactivada contra Coriza infecciosa y Salmonella enteritidis
- c) **Forma farmacéutica:** Suspensión Inyectable

2. Composición

Cada dosis contiene:

S. enteritidis, Cepa 038-090, Fagotipo 13A

A. paragallinarum, Serotipo A, Cepa 175

A. paragallinarum, Serotipo B, Cepa 176

A. paragallinarum, Serotipo C, Cepa 177

Excipientes csp

-Preservante: Timerosal

-Adyuvante: Hidróxido de aluminio gel.

MAT: Título microaglutinación

UFC: Unidades formadoras de colonias.

$\geq 4 \log^2$ MAT

5×10^7 UFC pre inactivación.

5×10^7 UFC pre inactivación

5×10^7 UFC pre inactivación

0.5 mL

**APROBADO
SAG**

22-02-2023

3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra *Salmonella enteritidis* y *A. paragallinarum* serotipos A, B y C.

4. Particularidades clínicas

a) **Especies de destino y subcategoría:** Gallinas de postura y reproductoras

b) **Indicaciones de uso:**

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo:**

Dosis:

0.5 ml

Edad o peso, frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

Primovacuna: entre 8 – 12 semanas de edad.

Booster: 4 semanas posteriores a la primovacuna

**Condición fisiológica**

Animales sanos

Vía de administración:

Subcutánea (bajo la piel del cuello) o intramuscular (en la pechuga o en el muslo)

Modo de empleo:

Agitar vigorosamente antes y durante la aplicación

Previo al uso, mantenga la vacuna a temperatura ambiente por 1-2 horas

Administrar en forma aséptica

d) Contraindicaciones:

No administrar durante la postura

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:

Ocasionalmente, puede observarse una reacción local inflamatoria luego de la administración, en el sitio de inyección, la que desaparece luego de 2-3 semanas post administración. La vacunación no genera reacciones sistémicas.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.

APROBADO
SAG

22-02-2023

g) Uso durante la postura

No usar durante la postura

h) Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis.

La administración del doble es bien tolerada, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) Periodo de resguardo

Cero días

k) Precauciones especiales para el operador:

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

5. Particularidades farmacéuticas**a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado:**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.



b) **Período de eficacia:**

24 meses.

Una vez abierto el frasco, utilizar inmediatamente y en su totalidad.

c) **Condiciones de almacenamiento:**

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

d) **Descripción de los envases:**

Caja de cartón, etiquetada, con 1 o 5 frascos de plástico, etiquetados, cerrados con tapones de goma, sellados con cápsulas de aluminio y tapas de plástico, conteniendo 250 ó 500 mL, equivalente a 500 ó 1.000 dosis.

e) **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere:**

Se recomienda disponer los desechos mediante incineración. Producto sin utilizar debe ser devuelto a la empresa importadora.

6. **Condición de venta.**

Venta bajo receta medica veterinaria

7. **Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda**

Fabricado por:

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5, Hungría

**APROBADO
SAG**

22-02-2023

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile

Bajo licencia de CEVA Sante Animale, Francia

Registro SAG N° 2256-B

USO VETERINARIO