

CEVAC® CORYMUNE 7 K

Vacuna inactivada para la inmunización contra Coriza infecciosa,
Salmonella enteritidis, Enfermedad de Newcastle,
Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Caída de Postura (EDS).
Emulsión inyectable

5x250 mL/
**5x500
dosis**



CEVAC® CORYMUNE 7 K

Vacuna inactivada para la inmunización contra Coriza infecciosa,
Salmonella enteritidis, Enfermedad de Newcastle,
Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Caída de Postura (EDS).
Emulsión inyectable

5x250 mL/
**5x500
dosis**



Cada dosis de 0.5 mL contiene
Virus Newcastle cepa NDV-SZ, La Sota $\geq 50 \text{ PD}_{50}$
Virus de Bronquitis Infecciosa, Cepa M-41, Mass $\geq 6 \log_2 \text{ HI}$
Adenovirus Aviar, Cepa B8/78 $\geq 7 \log_2 \text{ HI}$
S. enteritidis, Cepa 038-090, Fagotipo 13A $\geq 5 \log_2 \text{ MAT}$
A. paragallinarum, Serotipo A, cepa 175 $5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
A. paragallinarum, Serotipo B, cepa 176 $5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
A. paragallinarum, Serotipo C, cepa 177 $5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
Excipientes csp 0.5 ml

Preservante: Timerosal
Adyuvante oleoso

HI: Título inhibición hemaglutinación
MAT: Título microaglutinación
UFC: Unidades formadoras de colonias
PD₅₀: Dosis protectora 50

**APROBADO
SAG
30-10-2023**

ESPECIES DE DESTINO:

Gallinas de postura y reproductoras.

INDICACIÓN DE USO:

Como ayuda en la prevención de Bronquitis Infecciosa producida por virus Massachusetts, Enfermedad de Newcastle, Síndrome de Caída de Postura, Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

POSOLOGÍA, EDAD O PESO, CONDICIÓN FISIOLÓGICA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

La vacuna debe administrarse a lotes de pollas entre 14-18 semanas de edad, 2-4 semanas antes del comienzo de la postura.

La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

Las aves deben haber sido previamente inmunizadas con vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle y Bronquitis infecciosa y, de 4 a 6 semanas antes, con una vacuna inactivada contra coriza infecciosa y *Salmonella enteritidis*.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.

PRECAUCIONES GENERALES:

Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Debe usarse equipo de inyección estéril. La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla.

Agitar suficientemente el frasco antes de su uso. Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada. Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

ADVERTENCIA:

No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos. Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

PERIODO DE REGUARDO:

Cero días

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Venta bajo receta médico veterinaria


Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co., Ltd. | 107 Budapest, Hungría.

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile. Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 2272-B

**USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



00000

250 ml/
500
dosis



Cada dosis de 0.5 mL contiene

Virus Newcastle cepa NDV-SZ, La Sota	$\geq 50 \text{ PD}_{50}$
Virus de Bronquitis Infecciosa, Cepa M-41, Mass	$\geq 6 \log_2 \text{ HI}$
Adenovirus Aviar, Cepa B8/78	$\geq 7 \log_2 \text{ HI}$
<i>S. enteritidis</i> , Cepa 038-090, Fagotipo 13A	$\geq 5 \log_2 \text{ MAT}$
<i>A. paragallinarum</i> , Serotipo A, cepa 175	$5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
<i>A. paragallinarum</i> , Serotipo B, cepa 176	$5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
<i>A. paragallinarum</i> , Serotipo C, cepa 177	$5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
Excipientes csp	0.5 ml

Preservante: Timerosal
Adyuvante oleoso

HI: Título inhibición hemaglutinación
MAT: Título microaglutinación
UFC: Unidades formadoras de colonias
 PD_{50} : Dosis protectora 50

ESPECIES DE DESTINO:

Gallinas de postura y reproductoras.

INDICACIÓN DE USO:

Como ayuda en la prevención de Bronquitis Infecciosa producida por virus Massachusetts, Enfermedad de Newcastle, Síndrome de Caída de Postura, Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

POSOLÓGIA, EDAD O PESO, CONDICIÓN FISIOLÓGICA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

La vacuna debe administrarse a lotes de pollas entre 14-18 semanas de edad, 2-4 semanas antes del comienzo de la postura.

La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

Las aves deben haber sido previamente inmunizadas con vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle y Bronquitis infecciosa y, de 4 a 6 semanas antes, con una vacuna inactivada contra coriza infecciosa y *Salmonella enteritidis*.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.

PRECAUCIONES GENERALES:

Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Debe usarse equipo de inyección estéril.

La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla.

Agitar suficientemente el frasco antes de su uso.

Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada. Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

ADVERTENCIA:

No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

PERIODO DE REGUARO: Cero días

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Venta bajo receta médico veterinaria

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co., Ltd. 1107 Budapest, Hungría.

Importado y distribuido por:
En Chile: Ceva Salud Animal
Chile SpA, Av. Apoquindo 3669
of. 801, Las Condes,
Santiago - Chile. Bajo licencia de
Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 2272-B

APROBADO
SAG
30-10-2023

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado:
Serie:
Vence:

CEVAC® CORYMUNE 7 K

Vacuna inactivada para la inmunización contra Coriza infecciosa,
Salmonella enteritidis, Enfermedad de Newcastle,
Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Caída de Postura (EDS).
Emulsión inyectable

5x500 mL/
5x1000
dosis



CEVAC® CORYMUNE 7 K

Vacuna inactivada para la inmunización contra Coriza infecciosa,
Salmonella enteritidis, Enfermedad de Newcastle,
Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Caída de Postura (EDS).
Emulsión inyectable

5x500 mL/
5x1000
dosis



51238-01

Cada dosis de 0.5 mL contiene
Virus Newcastle cepa NDV-SZ, La Sota $\geq 50 \text{ PD}_{50}$
Virus de Bronquitis Infecciosa, Cepa M-41, Mass $\geq 6 \log_2 \text{ HI}$
Adenovirus Aviar, Cepa B8/78 $\geq 7 \log_2 \text{ HI}$
S. enteritidis, Cepa 038-090, Fagotipo 13A $\geq 5 \log_2 \text{ MAT}$
A. paragallinarum, Serotipo A, cepa 175 $5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
A. paragallinarum, Serotipo B, cepa 176 $5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
A. paragallinarum, Serotipo C, cepa 177 $5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
Excipientes csp 0.5 ml

Preservante: Timerosal
Adyuvante oleoso

HI: Título inhibición hemaglutinación
MAT: Título microaglutinación
UFC: Unidades formadoras de colonias
PD₅₀: Dosis protectora 50

ESPECIES DE DESTINO:

Gallinas de postura y reproductoras.

INDICACIÓN DE USO:

Como ayuda en la prevención de Bronquitis Infecciosa producida por virus Massachusetts, Enfermedad de Newcastle, Síndrome de Caída de Postura, Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

POSOLOGÍA, EDAD O PESO, CONDICIÓN FISIOLÓGICA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

La vacuna debe administrarse a lotes de pollas entre 14-18 semanas de edad, 2-4 semanas antes del comienzo de la postura.

La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

APROBADO
SAG
30-10-2023

Las aves deben haber sido previamente inmunizadas con vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle y Bronquitis infecciosa y, de 4 a 6 semanas antes, con una vacuna inactivada contra coriza infecciosa y *Salmonella enteritidis*.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.

PRECAUCIONES GENERALES:

Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria.

Debe usarse equipo de inyección estéril.

La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla.

Agitar suficientemente el frasco antes de su uso.

Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada.

Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

ADVERTENCIA:

No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

PERIODO DE REGUARDO: Cero días

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Venta bajo receta médico veterinaria

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co., Ltd. 1107 Budapest, Hungría.

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801 Las Condes, Santiago - Chile. Bajo licencia de Ceva Sante Animale, Francia.

Registro SAG N°2272-B

USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® CORYMUNE 7 K

Vacuna inactivada para la inmunización
contra Coriza infecciosa, *Salmonella enteritidis*,
Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa
y Síndrome de Caída de Postura (EDS).
Emulsión inyectable

51237-01

500 ml/
1000
dosis



Cada dosis de 0.5 mL contiene	
Virus Newcastle cepa NDV-SZ, La Sota	$\geq 50 \text{ PD}_{50}$
Virus de Bronquitis Infecciosa, Cepa M-41, Mass	$\geq 6 \log_2 \text{ HI}$
Adenovirus Aviar, Cepa B8/78	$\geq 7 \log_2 \text{ HI}$
<i>S. enteritidis</i> , Cepa 038-090, Fagotipo 13A	$\geq 5 \log_2 \text{ MAT}$
<i>A. paragallinarum</i> , Serotipo A, cepa 175	$5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
<i>A. paragallinarum</i> , Serotipo B, cepa 176	$5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
<i>A. paragallinarum</i> , Serotipo C, cepa 177	$5 \times 7 \log_{10} \text{ UFC pre inactivación}$
Excipientes csp	0.5 ml

Preservante: Timerosal
Adyuvante oleoso

HI: Título inhibición hemaglutinación
MAT: Título microaglutinación
UFC: Unidades formadoras de colonias
PD₅₀: Dosis protectora 50

ESPECIES DE DESTINO:

Gallinas de postura y reproductoras.

INDICACIÓN DE USO:

Como ayuda en la prevención de Bronquitis Infecciosa producida por virus Massachusetts, Enfermedad de Newcastle, Síndrome de Caída de Postura, Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

POSOLÓGÍA, EDAD O PESO, CONDICIÓN FISIOLÓGICA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

La vacuna debe administrarse a lotes de pollas entre 14-18 semanas de edad, 2-4 semanas antes del comienzo de la postura.

La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

Las aves deben haber sido previamente inmunizadas con vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle y Bronquitis infecciosa y, de 4 a 6 semanas antes, con una vacuna inactivada contra coriza infecciosa y *Salmonella enteritidis*.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a aves enfermas. No vacunar durante la postura.

PRECAUCIONES GENERALES:

Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria. Debe usarse equipo de inyección estéril.

La vacuna debe ser mantenida a temperatura ambiente (15 a 25°C) durante 3-4 horas antes de utilizarla.

Agitar suficientemente el frasco antes de su uso.

Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada. Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

ADVERTENCIA:

No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

PERIODO DE REGUARDO: Cero días

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Venta bajo receta médico veterinaria

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co., Ltd. 1107 Budapest, Hungría.

Importado y distribuido por:
Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669, of. 801
Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Ceva Sante
Animale, Francia.

Registro SAG N°2272-B

APROBADO
SAG
30-10-2023

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** CEVAC CEVA® CORYMUNE 7K
- b) **Nombre Genérico:** Vacuna inactivada contra Coriza infecciosa, *Salmonella enteritidis*, Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Caída de Postura (EDS).
- c) **Forma farmacéutica:** Emulsión Inyectable

2. Composición

Cada dosis contiene:

Virus Newcastle, Cepa NDV-SZ, La Sota	$\geq 6 \log_2 \text{HI}$ (dosis completa), o $\geq 4 \log_2 \text{HI}$ (1/50 dosis), $\geq 50 \text{PD}_{50}$
Virus Bronquitis Infecciosa aviar, Cepa M-41, Mass	$\geq 6 \log_2 \text{HI}$
Adenovirus aviar, Cepa B8/78	$\geq 7 \log_2 \text{HI}$
<i>A. paragallinarum</i> , Serotipo A; Código 175	$5 \times 7 \log_{10} \text{UFC}$ pre inactivación
<i>A. paragallinarum</i> , Serotipo B; Código 176	$5 \times 7 \log_{10} \text{UFC}$ pre inactivación
<i>A. paragallinarum</i> , Serotipo C; Código 177	$5 \times 7 \log_{10} \text{UFC}$ pre inactivación
<i>S. enteritidis</i> , Cepa 038-090, Fagotipo 13A	$\geq 5 \log_2 \text{MAT}$
Excipientes csp	0.5 mL
Preservante: Timerosal	
Adyuvante oleoso	
HI: Título inhibición hemaglutinación	
MAT: Título microaglutinación	
UFC: Unidades formadoras de colonias	
PD_{50} : Dosis protectora 50	

APROBADO
SAG
30-10-2023

3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra virus Newcastle, virus Bronquitis infecciosa, Adenovirus aviar, *Salmonella enteritidis* y *A. paragallinarum* serotipos A, B y C.



4. Particularidades clínicas:

a) **Especies de destino y subcategoría:** Gallinas de postura y reproductoras.

b) **Indicaciones de uso**

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de Bronquitis infecciosa producida por virus Massachussets, Enfermedad de Newcastle, Síndrome de Caída de Postura, Coriza Infecciosa y para disminuir la excreción de *Salmonella enteritidis*.

c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.**

Dosis:

0.5 ml

Edad o peso, frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

Entre 14-18 semanas de edad, 2 - 4 semanas antes del comienzo de la postura.

Las aves deben haber sido previamente inmunizadas con vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle y Bronquitis infecciosa y, de 4 a 6 semanas antes, con una vacuna inactivada contra Coriza infecciosa y *Salmonella enteritidis*.

Condición fisiológica:

Animales sanos

Vía de administración:

Subcutánea (bajo la piel del cuello) o por vía intramuscular (en la pechuga o en el muslo)

Modo de empleo:

Agitar vigorosamente antes y durante la aplicación.

Previo al uso, mantenga la vacuna a temperatura ambiente por 1-2 horas.

Administrar en forma aséptica.

d) **Contraindicaciones**

No vacunar durante la postura.

e) **Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la (s) especie (s) de destino derivados del uso del producto inmunológico.**

Puede observarse una reacción local inflamatoria luego de la administración, en el sitio de inyección, la que desaparece luego de 2-3 semanas post administración.

La vacunación no genera reacciones sistémicas.

f) **Advertencias y precauciones especiales de uso.**

Mantener fuera del alcance de los niños.

g) **Uso durante postura.**

No usar durante la postura

APROBADO
SAG
30-10-2023



h) Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis

La administración del doble es bien tolerada, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) Periodo de resguardo

Cero días

APROBADO
SAG
30-10-2023

k) Precauciones especiales para el operador.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

5. Particularidades farmacéuticas.

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado.

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

b) Período de eficacia.

23 meses.

Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad.

c) Condiciones de almacenamiento.

Mantener refrigerado: entre 2 y 8 °C. No congelar. Proteger de la luz.

d) Descripción de los envases.

Caja de cartón etiquetada, con 1 o 5 frascos de plástico, etiquetado, cerrado con tapón de goma y sellados con cápsulas de aluminio y tapas de plástico, conteniendo 250 o 500 mL, equivalente a 500 o 1000 dosis.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho, si la hubiere.

Se recomienda disponer los desechos mediante incineración. Producto sin utilizar debe ser devuelto a la empresa importadora.

6. Condición de venta.

Venta bajo receta medico veterinaria

7. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda



Fabricado por:

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co., Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.5,
Hungria

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de Ceva Sante Animale, Francia.



Registro SAG N ° 2272-B

USO VETERINARIO