

1000 DOSIS/DOSES
CEVAC® MD HVT
VACUNA DE LA ENFERMEDAD DE MAREK
Serotipo 3, Virus Vivo
VER EL INSERTO PARA INSTRUCCIONES
VACINA CONTRA A DOENÇA DE MAREK
Serotipo 3, Virus Vivo
PARA MAIS INFORMAÇÕES VIDE BULA
2067LATAM-01
CEVA ANIMAL HEALTH LLC
Lenexa, KS 66215 USA
VLN 368 / PCN 16L1.06
LOTE/PART.:
FABR.:
VENC.:

APROBADO
SAG
29-02-2024

2000 DOSIS/DOSES
CEVAC® MD HVT
VACUNA DE LA ENFERMEDAD DE MAREK
Serotipo 3, Virus Vivo
VER EL INSERTO PARA INSTRUCCIONES
VACINA CONTRA A DOENÇA DE MAREK
Serotipo 3, Virus Vivo
PARA MAIS INFORMAÇÕES VIDE BULA
2518LATAM-01
CEVA ANIMAL HEALTH LLC
Lenexa, KS 66215 USA
VLN 368 / PCN 16L1.06
LOTE/PART.:
FABR.:
VENC.:

4000 DOSIS/DOSES
CEVAC® MD HVT
VACUNA DE LA ENFERMEDAD DE MAREK
Serotipo 3, Virus Vivo
VER EL INSERTO PARA INSTRUCCIONES
VACINA CONTRA A DOENÇA DE MAREK
Serotipo 3, Virus Vivo
PARA MAIS INFORMAÇÕES VIDE BULA
2519LATAM-01
CEVA ANIMAL HEALTH LLC
Lenexa, KS 66215 USA
VLN 368 / PCN 16L1.06
LOTE/PART.:
FABR.:
VENC.:

SERIAL NO

EXP DATE



200mL

**DILUYENTE PARA RECONSTITUIR
VACUNAS AVIARES CONGELADAS**

No usar este diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: mantener a temperatura ambiente (recomendado 15 - 30°C).

Para mayor información, ver prospecto interno.

Utilizar todo el contenido después de preparado.

Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

**APROBADO
SAG
29-02-2024**

Registro SAG No: 2446-B

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC
8906 Rosehill Rd.
Lenexa, Kansas 66215, USA
VLN 368

PY014XUCL-01

SERIAL NO

EXP DATE



400mL

**DILUYENTE PARA RECONSTITUIR
VACUNAS AVIARES CONGELADAS**

No usar este diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: mantener a temperatura ambiente (recomendado 15 - 30°C).

Para mayor información, ver prospecto interno.

Utilizar todo el contenido después de preparado.

Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

**APROBADO
SAG**

29-02-2024

Registro SAG No: 2446-B

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC
8906 Rosehill Rd.
Lenexa, Kansas 66215, USA
VLN 368

PY014XVCL-01

SERIAL NO

EXP DATE



800mL

**DILUYENTE PARA RECONSTITUIR
VACUNAS AVIARES CONGELADAS**

No usar este diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: mantener a temperatura ambiente (recomendado 15 - 30°C).

Para mayor información, ver prospecto interno.

Utilizar todo el contenido después de preparado.

Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

**APROBADO
SAG**
29-02-2024

Registro SAG No: 2446-B

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC
8906 Rosehill Rd.
Lenexa, Kansas 66215, USA
VLN 368

PY014XWCL-01



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

a) **Nombre Fantasia:** CEVAC® MD HVT

b) **Nombre Genérico:** Vacuna viva contra Enfermedad de Marek, HVT, Serotipo 3, Congelada.

c) **Forma farmacéutica:** Suspensión inyectable.

2.- Composición

Cada reconstituida dosis contiene:

Virus Herpes Pavo (HVT), Cepa FC-126, Serotipo 3

≥ 2.088 UFP

Excipientes cps

1 dosis

- Preservante: Gentamicina, Anfotericina B

3.- Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la Enfermedad de Marek.

4.-Particularidades clínicas:

a) **Especies de destino y subcategoría:** Pollos Broilers, pollos/pollas de reemplazo de reproductores y pollas de reemplazo.

b) **Indicaciones de uso:**

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Marek

c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo**

Dosis:

1 dosis/pollo o embrión

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

Dosis única.

Edad o peso:

Pollitos de 1 día de edad o embriones de 18-19 días de incubación

Condición fisiológica:

Pollos o embriones sanos.

Vía de administración:

Subcutánea (en la parte posterior del cuello) o *In-ovo*.

APROBADO
SAG

29-02-2024

Modo de empleo:

Preparación de la vacuna

- Descongelar solo las ampollas que serán utilizadas, con un máximo de 3 a la vez.
- Retirar la ampolla del contenedor y colocar en un baño de agua limpia (20 – 30° C), agitando suavemente para obtener un descongelado rápido y uniforme.
- Romper el cuello de la ampolla, extraer cuidadosamente la vacuna con una aguja calibre 18-20 y añadir suavemente el contenido a la bolsa del diluyente a temperatura ambiente.
- Con una pequeña cantidad de diluyente enjuagar la ampolla para retirar el contenido completo.
- Mezclar el contenido de la bolsa de diluyente agitando suavemente.



- Utilizar la vacuna inmediatamente y agitar suavemente durante la aplicación para asegurar la correcta suspensión de células.

Vacunación subcutánea

- Diluir 1.000 dosis en 200 mL de diluyente.
- Utilizar jeringa automática, agujas y demás equipo esterilizado en autoclave o por ebullición.
- Utilizar una aguja corta (3/8 o 1/2 pulgada) de calibre 20.
- Administrar 0,2 mL en forma aséptica.

Vacunación In Ovo

- Leer el manual de operación del sistema de inyección de huevos antes de iniciar la vacunación.
- Sanitizar el sistema de inyección antes y después de su uso, siguiendo los procedimientos descritos en el manual de operación.
- Elegir la dilución a utilizar, dependiendo del volumen a inyectar en cada huevo:
 - Diluir 1.000 dosis en 100 mL y administrar 0,1 mL
 - Diluir 1.000 dosis en 50 mL y administrar 0,05 mL

APROBADO
SAG
29-02-2024

d) Contraindicaciones

No administrar durante la postura

d) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico

No se han descrito.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso

- Todas las aves deben ser vacunadas al mismo tiempo.
- Mantener las ampollas congeladas en todo momento antes de su uso.
- Verificar diariamente el nivel de nitrógeno líquido del contenedor.
- El manejo y almacenamiento inadecuado de la vacuna puede provocar pérdida de la potencia.
- No remover la vacuna del nitrógeno líquido sino hasta que esté listo para utilizarla.
- No utilizar si la vacuna se ha descongelado en el interior del contenedor de nitrógeno líquido.
- Nunca volver a congelar una ampolla que haya sido previamente descongelada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

g) Uso durante la postura

No usar durante la postura



h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis

La administración de 10 veces la dosis recomendada ha demostrado ser segura, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) Período de resguardo

21 días.

APROBADO
SAG
29-02-2024

k) Precauciones especiales para el operador:

- Tanto los contenedores de nitrógeno líquido como las ampollas de vacuna congeladas deben ser manipulados únicamente por personal capacitado.
- Observar las medidas de seguridad, incluyendo el uso de guantes, mascarillas y gafas de protección para evitar los riesgos potenciales al manipular el nitrógeno líquido y la posibilidad de explosión de las ampollas de vidrio al momento de extraerlas del tanque de nitrógeno líquido, así como al momento de descongelarlas.
- Los contenedores de nitrógeno líquido deben ser almacenados en un ambiente seco y ventilado. La inhalación de los vapores de nitrógeno es peligrosa.
- En caso de quemaduras, consultar inmediatamente al médico.
- En caso de inoculación accidental, consultar al médico.

5.- Particularidades farmacéuticas.

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún otro producto farmacéutico, excepto con el diluyente recomendado por el fabricante.

b) Período de eficacia.

24 meses.

Una vez diluida, utilizar en forma inmediata. Eliminar el producto sobrante.

c) Condiciones de almacenamiento.

Mantener la vacuna congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

Mantener el diluyente a temperatura ambiente, entre 15-30°C.



d) Descripción de los envases.

Vial de vidrio, tipo I, sellador por calor, etiquetado, conteniendo 1.000, 2.000 ó 4.000 dosis. Bolsa de polietileno, etiquetada, conteniendo 200, 400 ó 800 mL de diluyente. Incluye prospecto interno.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración.

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6.- Condición de venta.

Venta bajo receta medica veterinaria

7.- Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC
8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, USA



Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC

Registro SAG N° 2446-B

USO VETERINARIO