

PZ563HDC

VER VIALES PARA NÚMERO DE SERIE Y FECHA DE EXPIRACIÓN

FABRICADO POR: CEVA ANIMAL HEALTH INC., 131 Malcom Rd., Guelph, Ontario Canada N1K 1A8 • Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

Contraindicaciones: No usar en conjunto con ningún medicamento con efecto coccidiostático (anticoccidial).

Precauciones: Asegurarse de no utilizar anticoccidiales (coccidiostatos) en el alimento. Incluso bajas cantidades de anticoccidiales pueden reducir o anular la efectividad de la vacuna. Antibióticos de amplio espectro que poseen actividad anticoccidial (ej. Tetraciclinas, sulfas y nitrofuranos) no deberían ser utilizados junto a IMMUCOX® por los primeros 16 días luego de la vacunación. No sobreposicionar ni subdosificar. Vacunar únicamente aves sanas.

Vacuna viva contra coccidiosis aviar
 producida por *Eimeria acervulina* -
Eimeria brunetti - *Eimeria maxima* -
Eimeria necatrix - *Eimeria tenella*.

IMMUCOX® 5
 Suspensión oral

10x1000 Dosis
 (10 mL)



Especies de destino y subcategoría: Pollos broiler, pollas de reemplazo, pollos/pollas de reemplazo de reproductores Indicaciones de uso para cada especie(s) de destino y subcategoría: Inmunización activa, como ayuda en la prevención de coccidiosis producida por *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria maxima*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria tenella*.

Establecimiento de la inmunidad: 30 días posteriores a la vacunación. Dosis: 0.25 mL/pollo Vía de administración: Oral Modo de empleo: - Para 10.000 dosis de IMMUCOX® 5, añadir 70 g de diluyente de gotitas de gel en 2.5 L de agua destilada fría. - Mezclar bien con una mezcladora. - Agitar bien 10.000 dosis de la vacuna IMMUCOX® 5, verter y mezclar con una mezcladora. No es necesaria más agitación si se usa el mismo día. - Vacunar en una proporción de 25 mL por cada 100 aves, a través de una máquina o dispositivo de gotitas de gel.

No mezclar con otros productos, excepto lo especificado en este rotulado. Consulte a un médico en caso de exposición en humanos. Utilizar el contenido completo una vez abierto. Disponer el contenido sobrante de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Contiene Dicromato de Potasio como preservante.

Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado entre 2 y 8 °C. No congelar. El diluyente debe mantenerse a temperatura ambiente entre 15 y 30°C. Una vez abierto, utilizar todo el contenido del envase.

Periodo de resguardo/retiro: No vacunar dentro de los 21 días previo al sacrificio.

N° SERIE

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico: No se han descrito

Advertencias y precauciones especiales de uso

Si las aves se albergan en un espacio confinado, deben de ser liberadas del confinamiento hacia el sexto día posterior a la vacunación o bien el área debe de duplicarse en tamaño.

Para alcanzar la inmunidad protectora, las aves vacunadas deben tener contacto con los oocistos excretados por las fecas, post vacunación. Mantener fuera del alcance de los niños.

Precauciones especiales para el operador: En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. Si se salpica en los ojos, enjuague con agua. Utilizar guantes al momento de preparar y administrar la vacuna a los animales.

Aviso: La capacidad de IMMUCOX® de ayudar en el desarrollo de inmunidad contra coccidiosis en pollos depende de varios factores. Estos incluyen, pero no están limitados a, las condiciones de almacenamiento y manejo de la vacuna por el usuario, administración de la vacuna, la respuesta individual del ave a la vacuna, y si las instrucciones de uso y cuidado en el uso de la vacuna se han seguido cuidadosamente.

Las eficacia de la vacuna puede verse reducida o anulada mediante el congelamiento o la exposición a altas temperaturas, y si las instrucciones de uso y cuidado en el uso de la misma no se han seguido correctamente, excesiva morbilidad y mortalidad pueden ocurrir. Consulte un veterinario avícola o laboratorio de diagnóstico para correcto diagnóstico. Informe al veterinario o laboratorio de diagnóstico que las aves han sido vacunadas con IMMUCOX®.

Composición: Cada dosis reconstituida contiene:

<i>Eimeria acervulina</i> , Cepa Ceva 502-13	≥ 151 oocistos
<i>Eimeria brunetti</i> , Cepa Ceva 505-13	≥ 40 oocistos
<i>Eimeria maxima</i> , Cepa Guelph 503-13	≥ 50 oocistos
<i>Eimeria necatrix</i> , Cepa Guelph 506-13	≥ 51 oocistos
<i>Eimeria tenella</i> , Cepa Ceva 504-13	≥ 25 oocistos
Excipientes csp	1 dosis

-Preservantes: Dicromato de potasio

Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado: No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización

Forma farmacéutica: Suspensión oral.

PRODUCTO BIOLÓGICO DE USO VETERINARIO. VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN/RECETA MÉDICO VETERINARIA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración.

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados

Condición de venta: Venta bajo receta medico veterinaria

En Chile: Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA., Avda. Apoquindo 3669 Of.801, Las Condes, Santiago – Chile, Bajo licencia de Ceva Animal Health Inc. Canada, Registro SAG No.:xxx

USO VETERINARIO. Prohibida la venta fraccionada.

REGISTRO SAG N° 2599-B

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO

SAG

15-06-2023

CUSTOMER PROOF • pdf format • CHECK CAREFULLY!



Customer: Biomune - Kelly

CS Representative: Libby Himmelwright • lhimmelwright@tabcoinc.com

P.O.#: - - - - Tabco Part #: 56448 (In)

Date: 07-13-22 08-10-22 12-28-22 01-13-23

06-13-23

Description: Immucox 5

Varnish: ☐ Pattern ☒ Flood
 Lamination: ☐
 Size: 4.375 " x 5.75 " Unwind #:

Colors:

☒ black	☒ PMS 354	☐ u.v. gloss
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

SHEETS

PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, size, placement and color breaks. They are not intended to represent exact colors. Every effort has been taken to ensure the accuracy and conformance to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability rests solely with the CUSTOMER.

☐ Approved as shown
 ☐ Approved w/ corrections
 ☐ Make corrections & resubmit

Approved by: Date:

**Vacuna viva contra
coccidiosis aviar
producida por *Eimeria*
acervulina - *Eimeria*
brunetti - *Eimeria*
maxima - *Eimeria*
necatrix - *Eimeria tenella*.**

Ooquistes Vivos
IMMUCOX® 5
Suspensión oral

1000 dosis
(10 mL)



Para la vacunación contra coccidiosis en pollos de 1 a 3 días de edad.

Contiene ooquistes vivos de *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* y *E. tenella*. Contiene Dicromato de Potasio como preservante.

Para mayor información ver estuche.

Almacenar entre 2-8°C. NO CONGELAR. No mezclar con otros productos, excepto lo especificado en este rotulado. Consulte a un médico en caso de exposición en humanos. Utilizar el contenido completo una vez abierto. USO VETERINARIO.

PY553HDCL

Fabricado por:
CEVA ANIMAL HEALTH INC.
131 Malcolm Rd., Guelph, Ontario,
Canada N1K 1A8
Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

Reg. SAG No.:...

Lote/Serie No.:

Vto/Exp.:

200%

**Vacuna viva contra
coccidiosis aviar
producida por *Eimeria*
acervulina - *Eimeria*
brunetti - *Eimeria*
maxima - *Eimeria*
necatrix - *Eimeria tenella*.**

Ooquistes Vivos
IMMUCOX® 5
Suspensión oral

1000 dosis
(10 mL)



Para la vacunación contra coccidiosis en pollos de 1 a 3 días de edad.

Contiene ooquistes vivos de *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* y *E. tenella*. Contiene Dicromato de Potasio como preservante.

Para mayor información ver estuche.

Almacenar entre 2-8°C. NO CONGELAR. No mezclar con otros productos, excepto lo especificado en este rotulado. Consulte a un médico en caso de exposición en humanos. Utilizar el contenido completo una vez abierto. USO VETERINARIO.

PY553HDCL

Fabricado por:
CEVA ANIMAL HEALTH INC.
131 Malcolm Rd., Guelph, Ontario,
Canada N1K 1A8
Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

Reg. SAG No.:...

Lote/Serie No.:

Vto/Exp.:

**APROBADO
SAG**

15-06-2023

REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

PZ563IDCL

VER VIALES PARA NÚMERO DE SERIE Y FECHA DE EXPIRACIÓN
FABRICADO POR: CEVA ANIMAL HEALTH INC., 131 Malcom Rd., Guelph, Ontario Canada N1K 1A8 • Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

Contraindicaciones: No usar en conjunto con ningún medicamento con efecto coccidiostato (anticoccidial).
Precauciones: Asegurarse de no utilizar anticoccidiales (coccidiostatos) en el alimento. Incluso bajas cantidades de anticoccidiales pueden reducir o anular la efectividad de la vacuna. Antibióticos de amplio espectro que poseen actividad anticoccidial (ej. Tetraciclinas, sulfas y nitrofuranos) no deberían ser utilizados junto a IMMUCOX® por los primeros 16 días luego de la vacunación. No sobreposicionar ni subdosificar. Vacunar únicamente aves sanas.

Vacuna viva contra coccidiosis aviar
producida por *Eimeria acervulina* -
Eimeria brunetti - *Eimeria maxima* -
Eimeria necatrix - *Eimeria tenella*.

IMMUCOX® 5
Suspensión oral

10x2000 Dosis
(10 mL)



Especies de destino y subcategoría: Pollos broiler, pollas de reemplazo, pollos/pollas de reemplazo de reproductores **Indicaciones de uso para cada especie(s) de destino y subcategoría:** Inmunización activa, como ayuda en la prevención de coccidiosis producida por *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria maxima*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria tenella*.
Establecimiento de la inmunidad: 30 días posteriores a la vacunación. **Dosis:** 0.25 mL/pollo **Vía de administración:** Oral **Modo de empleo:** - Para 10.000 dosis de IMMUCOX® 5, añadir 70 g de diluyente de gotitas de gel en 2.5 L de agua destilada fría. - Mezclar bien con una mezcladora. - Agitar bien 10.000 dosis de la vacuna IMMUCOX® 5, verter y mezclar con una mezcladora. No es necesaria más agitación si se usa el mismo día. - Vacunar en una proporción de 25 mL por cada 100 aves, a través de una máquina o dispositivo de gotitas de gel.
No mezclar con otros productos, excepto lo especificado en este rotulado. Consulte a un médico en caso de exposición en humanos. Utilizar el contenido completo una vez abierto. Disponer el contenido sobrante de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Contiene Dicromato de Potasio como preservante.
Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado entre 2 y 8 °C. No congelar. El diluyente debe mantenerse a temperatura ambiente entre 15 y 30°C. Una vez abierto, utilizar todo el contenido del envase.
Periodo de resguardo/retiro: No vacunar dentro de los 21 días previo al sacrificio.

N° SERIE

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico: No se han descrito.
Advertencias y precauciones especiales de uso
Si las aves se albergan en un espacio confinado, deben de ser liberadas del confinamiento hacia el sexto día posterior a la vacunación o bien el área debe de duplicarse en tamaño.
Para alcanzar la inmunidad protectora, las aves vacunadas deben tener contacto con los oocistos excretados por las fecas, post vacunación. **Mantener fuera de las áreas de los niños.**
Precauciones especiales para el operador: En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. Si se salpica en los ojos, enjuague con agua. Utilizar guantes al momento de preparar y administrar la vacuna a los animales.

Aviso: La capacidad de IMMUCOX® de ayudar en el desarrollo de inmunidad contra coccidiosis en pollos depende de varios factores. Estos incluyen, pero no están limitados a, las condiciones de almacenamiento y manejo de la vacuna por el usuario, administración de la vacuna, la respuesta individual del ave a la vacuna, y si las instrucciones de uso y cuidado en el uso de la vacuna se han seguido cuidadosamente.
Las eficacia de la vacuna puede verse reducida o anulada mediante el congelamiento o la exposición a altas temperaturas, y si las instrucciones de uso y cuidado en el uso de la misma no se han seguido correctamente, excesiva morbilidad y mortalidad pueden ocurrir. Consulte un veterinario avícola o laboratorio de diagnóstico para correcto diagnóstico. Informe al veterinario o laboratorio de diagnóstico que las aves han sido vacunadas con IMMUCOX®.
Composición: Cada dosis reconstituida contiene:
Eimeria acervulina, Cepa Ceva 502-13 ≥ 151 oocistos
Eimeria brunetti, Cepa Ceva 505-13 ≥ 40 oocistos
Eimeria maxima, Cepa Guelph 503-13 ≥ 50 oocistos
Eimeria necatrix, Cepa Guelph 506-13 ≥ 51 oocistos
Eimeria tenella, Cepa Ceva 504-13 ≥ 25 oocistos
Excipientes csp 1 dosis
-Preservantes: Dicromato de potasio
Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado: No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización
Forma farmacéutica: Suspensión oral.
PRODUCTO BIOLÓGICO DE USO VETERINARIO. VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN/RECETA MÉDICO VETERINARIA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración.
Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados
Condición de venta: Venta bajo receta medico veterinaria
En Chile: Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA., Avda. Apoquindo 3669 Of.801, Las Condes, Santiago – Chile, Bajo licencia de Ceva Animal Health Inc. Canada, Registro SAG No.:xxx
USO VETERINARIO. Prohibida la venta fraccionada.



REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
15-06-2023

CUSTOMER PROOF • pdf format • CHECK CAREFULLY!



ph (913) 287-3333 • fax (913) 287-3338

Customer: Biomune - Kelly

CS Representative: Libby Himmelwright • lhimmelwright@tabcoinc.com

P.O.#: ---- Tabco Part #: 56536 (ln)

Date: 08/18/22 12/28/22 01/13/23 06/13/23

Description: Immucox 5

Varnish: ☐ Pattern ☒ Flood Lamination: ☐ Size: 4.375 " x 5.75 " Unwind #:
Across Around
Colors: ☒ black ☒ PMS 354 ☐ u.v. gloss
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SHEETS
← Across →
↑ Around ↓

PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, size, placement and color breaks. They are not intended to represent exact colors. Every effort has been taken to ensure the accuracy and conformance to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability rests solely with the CUSTOMER.

☐ Approved as shown ☐ Approved w/ corrections ☐ Make corrections & resubmit

Approved by: _____ Date: _____

**Vacuna viva contra
coccidiosis aviar
producida por *Eimeria*
acervulina - *Eimeria*
brunetti - *Eimeria*
maxima - *Eimeria*
necatrix - *Eimeria tenella*.**

Ooquistes Vivos
IMMUCOX® 5
Suspensión oral

2000 dosis
(10 mL)



Para la vacunación contra coccidiosis en pollos de 1 a 3 días de edad.

Contiene ooquistes vivos de *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* y *E. tenella*. Contiene Dicromato de Potasio como preservante.

Para mayor información ver estuche.

Almacenar entre 2-8°C. NO CONGELAR. No mezclar con otros productos, excepto lo especificado en este rotulado. Consulte a un médico en caso de exposición en humanos. Utilizar el contenido completo una vez abierto. USO VETERINARIO.

PY5531DCL

Fabricado por:
CEVA ANIMAL HEALTH INC.
131 Malcolm Rd., Guelph, Ontario,
Canada N1K 1A8
Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

Reg. SAG No.:...

Lote/Serie No.:

Vto/Exp.:

200%

**Vacuna viva contra
coccidiosis aviar
producida por *Eimeria*
acervulina - *Eimeria*
brunetti - *Eimeria*
maxima - *Eimeria*
necatrix - *Eimeria tenella*.**

Ooquistes Vivos
IMMUCOX® 5
Suspensión oral

2000 dosis
(10 mL)



Para la vacunación contra coccidiosis en pollos de 1 a 3 días de edad.

Contiene ooquistes vivos de *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* y *E. tenella*. Contiene Dicromato de Potasio como preservante.

Para mayor información ver estuche.

Almacenar entre 2-8°C. NO CONGELAR. No mezclar con otros productos, excepto lo especificado en este rotulado. Consulte a un médico en caso de exposición en humanos. Utilizar el contenido completo una vez abierto. USO VETERINARIO.

PY5531DCL

Fabricado por:
CEVA ANIMAL HEALTH INC.
131 Malcolm Rd., Guelph, Ontario,
Canada N1K 1A8
Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

Reg. SAG No.:...

Lote/Serie No.:

Vto/Exp.:

**APROBADO
SAG**

15-06-2023

**REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

PZ553LDC1

VER VIALES PARA NÚMERO DE SERIE Y FECHA DE EXPIRACIÓN
FABRICADO POR: CEVA ANIMAL HEALTH INC., 131 Malcom Rd., Guelph, Ontario Canada N1K 1A8 • Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

Contraindicaciones: No usar en conjunto con ningún medicamento con efecto coccidiostático (anticoccidial).
Precauciones: Asegurarse de no utilizar anticoccidiales (coccidiostatos) en el alimento. Incluso bajas cantidades de anticoccidiales pueden reducir o anular la efectividad de la vacuna. Antibióticos de amplio espectro que poseen actividad anticoccidial (ej. Tetraciclinas, sulfas y nitrofuranos) no deberían ser utilizados junto a IMMUCOX® por los primeros 16 días luego de la vacunación. No sobreposicionar ni subdosificar. Vacunar únicamente aves sanas.

Vacuna viva contra coccidiosis aviar
producida por *Eimeria acervulina* -
Eimeria brunetti - *Eimeria maxima* -
Eimeria necatrix - *Eimeria tenella*.

IMMUCOX® 5
Suspensión oral

10x5000 Dosis
(10 mL)



Especies de destino y subcategoría: Pollos broiler, pollas de reemplazo, pollos/pollas de reemplazo de reproductores **Indicaciones de uso para cada especie(s) de destino y subcategoría:** Inmunización activa, como ayuda en la prevención de coccidiosis producida por *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria maxima*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria tenella*.
Establecimiento de la inmunidad: 30 días posteriores a la vacunación. **Dosis:** 0,25 mL/pollo **Vía de administración:** Oral **Modo de empleo:** - Para 10.000 dosis de IMMUCOX® 5, añadir 70 g de diluyente de gotitas de gel en 2,5 L de agua destilada fría. - Mezclar bien con una mezcladora. - Agitar bien 10.000 dosis de la vacuna IMMUCOX® 5, verter y mezclar con una mezcladora. No es necesaria más agitación si se usa el mismo día. - Vacunar en una proporción de 25 mL por cada 100 aves, a través de una máquina o dispositivo de gotitas de gel.
No mezclar con otros productos, excepto lo especificado en este rotulado. Consulte a un médico en caso de exposición en humanos. Utilizar el contenido completo una vez abierto. Disponer el contenido sobrante de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Contiene Dicromato de Potasio como preservante.
Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado entre 2 y 8 °C. No congelar. El diluyente debe mantenerse a temperatura ambiente entre 15 y 30°C. Una vez abierto, utilizar todo el contenido del envase.
Periodo de resguardo/retiro: No vacunar dentro de los 21 días previo al sacrificio.

N° SERIE

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico: No se han descrito.
Advertencias y precauciones especiales de uso
Si las aves se albergan en un espacio confinado, deben de ser liberadas del confinamiento hacia el sexto día posterior a la vacunación o bien el área debe de duplicarse en tamaño.
Para alcanzar la inmunidad protectora, las aves vacunadas deben tener contacto con los oocistos excretados por las fecas, post vacunación. **Mantener fuera de las áreas de los niños.**
Precauciones especiales para el operador: En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. Si se salpica en los ojos, enjuague con agua. Utilizar guantes al momento de preparar y administrar la vacuna a los animales.

Aviso: La capacidad de IMMUCOX® de ayudar en el desarrollo de inmunidad contra coccidiosis en pollos depende de varios factores. Estos incluyen, pero no están limitados a, las condiciones de almacenamiento y manejo de la vacuna por el usuario, administración de la vacuna, la respuesta individual del ave a la vacuna, y si las instrucciones de uso y cuidado en el uso de la vacuna se han seguido cuidadosamente.
Las eficacia de la vacuna puede verse reducida o anulada mediante el congelamiento o la exposición a altas temperaturas, y si las instrucciones de uso y cuidado en el uso de la misma no se han seguido correctamente, excesiva morbilidad y mortalidad pueden ocurrir. Consulte un veterinario avícola o laboratorio de diagnóstico para correcto diagnóstico. Informe al veterinario o laboratorio de diagnóstico que las aves han sido vacunadas con IMMUCOX®.

Composición: Cada dosis reconstituida contiene:
Eimeria acervulina, Cepa Ceva 502-13 ≥ 151 ooquistes
Eimeria brunetti, Cepa Ceva 505-13 ≥ 40 ooquistes
Eimeria maxima, Cepa Guelph 503-13 ≥ 50 ooquistes
Eimeria necatrix, Cepa Guelph 506-13 ≥ 51 ooquistes
Eimeria tenella, Cepa Ceva 504-13 ≥ 25 ooquistes
Excipientes csp 1 dosis
-Preservantes: Dicromato de potasio

Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado: No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización

Forma farmacéutica: Suspensión oral.

PRODUCTO BIOLÓGICO DE USO VETERINARIO. VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN/RECETA MÉDICO VETERINARIA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración.
Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados

Condición de venta: Venta bajo receta medico veterinaria

En Chile: Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA., Avda. Apoquindo 3669 Of.801, Las Condes, Santiago – Chile, Bajo licencia de Ceva Animal Health Inc. Canada, Registro SAG No.:xxx

USO VETERINARIO. Prohibida la venta fraccionada.



REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
15-06-2023

CUSTOMER PROOF • pdf format • CHECK CAREFULLY!



ph (913) 287-3333 • fax (913) 287-3338

Customer: Biomune - Kelly

CS Representative: Libby Himmelwright • lhimmelwright@tabcoinc.com

P.O.#: ---- Tabco Part #: 56537 (ln)

Date: 08/18/22 12/28/22 01/13/23 06/13/23

Description: Immucox 5

Varnish: ☐ Pattern ☒ Flood	Lamination: ☐	Size: <u>4.375</u> " x <u>5.75</u> "	Unwind #:
		<i>Across</i>	<i>Around</i>
Colors: ☒ black	☒ PMS 354	☐ u.v. gloss	SHEETS
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	

PDF proofs are electronic files intended for delivery via the internet. They are intended for proofing of content, size, placement and color breaks. They are not intended to represent exact colors. Every effort has been taken to ensure the accuracy and conformance to applicable regulations on this proof. HOWEVER, please check carefully as the final liability rests solely with the CUSTOMER.

☐ Approved as shown ☐ Approved w/ corrections ☐ Make corrections & resubmit

Approved by: _____ Date: _____

**Vacuna viva contra
coccidiosis aviar
producida por *Eimeria*
acervulina - *Eimeria*
brunetti - *Eimeria*
maxima - *Eimeria*
necatrix - *Eimeria tenella*.**

Ooquistes Vivos
IMMUCOX® 5
Suspensión oral

5000 dosis
(10 mL)



Para la vacunación contra coccidiosis en pollos de 1 a 3 días de edad.

Contiene ooquistes vivos de *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* y *E. tenella*. Contiene Dicromato de Potasio como preservante.

Para mayor información ver estuche.

Almacenar entre 2-8°C. NO CONGELAR. No mezclar con otros productos, excepto lo especificado en este rotulado. Consulte a un médico en caso de exposición en humanos. Utilizar el contenido completo una vez abierto. USO VETERINARIO.

PY553LDCL

Fabricado por:
CEVA ANIMAL HEALTH INC.
131 Malcolm Rd., Guelph, Ontario,
Canada N1K 1A8
Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

Reg. SAG No.:...

Lote/Serie No.:

Vto/Exp.:

**Vacuna viva contra
coccidiosis aviar
producida por *Eimeria*
acervulina - *Eimeria*
brunetti - *Eimeria*
maxima - *Eimeria*
necatrix - *Eimeria tenella*.**

Ooquistes Vivos
IMMUCOX® 5
Suspensión oral

5000 dosis
(10 mL)



Para la vacunación contra coccidiosis en pollos de 1 a 3 días de edad.

Contiene ooquistes vivos de *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* y *E. tenella*. Contiene Dicromato de Potasio como preservante.

Para mayor información ver estuche.

Almacenar entre 2-8°C. NO CONGELAR. No mezclar con otros productos, excepto lo especificado en este rotulado. Consulte a un médico en caso de exposición en humanos. Utilizar el contenido completo una vez abierto. USO VETERINARIO.

PY553LDCL

Fabricado por:
CEVA ANIMAL HEALTH INC.
131 Malcolm Rd., Guelph, Ontario,
Canada N1K 1A8
Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

Reg. SAG No.:...

Lote/Serie No.:

Vto/Exp.:

**APROBADO
SAG**

15-06-2023

**REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

200%

DILUYENTE GEL EN GOTA



contenido: 70 g

Modo de empleo:
Seguir las direcciones cuidadosamente

Para 10.000 dosis de IMMUCOX® 5, añadir 70 g de diluyente de gotitas de gel en 2.5 L de agua destilada fría.

- Mezclar bien con una mezcladora.
- Agitar bien 10.000 dosis de la vacuna IMMUCOX® 5, verter y mezclar con una mezcladora. No es necesaria más agitación si se usa el mismo día.
- Vacune en una proporción de 25 mL por cada 100 aves, a través de una máquina o dispositivo de gotitas de gel.

Composición: Carragenano, carboximetilcelulosa, maltodextrina.

Condiciones de almacenamiento:

El diluyente debe mantenerse a temperatura ambiente entre 15 y 30°C
Una vez abierto, utilizar todo el contenido del envase.

Condición de venta: Venta bajo receta medica veterinaria.

USO VETERINARIO

Reg. SAG N°: xxxx

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Avda. Apoquindo 3669 Of.801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de Ceva Animal Health Inc. Canada.

Fab por: CEVA ANIMAL HEALTH INC.
131 Malcolm Rd., Guelph, Ontario, Canada N1K 1A8
Can. Vet. Biol. Estab. Lic. No. 23

PY050XHCL

Lote/Serie No.:

Vto/Exp.:

REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

15-06-2023



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) Nombre Fantasía: IMMUCOX® 5
- b) Nombre Genérico: Vacuna viva contra coccidiosis aviar producida por *Eimeria acervulina* - *Eimeria brunetti* - *Eimeria maxima* - *Eimeria necatrix* - *Eimeria tenella*.
- c) Forma farmacéutica: Suspensión oral.

2.- Composición

Cada dosis reconstituida contiene:

Eimeria acervulina, Cepa Ceva 502-13 $\geq$ 151 ooquistes
Eimeria brunetti, Cepa Ceva 505-13..... $\geq$ 40 ooquistes
Eimeria máxima, Cepa Guelph 503-13..... $\geq$ 50 ooquistes
Eimeria necatrix, Cepa Guelph 506-13..... $\geq$ 51 ooquistes
Eimeria tenella, Cepa Ceva 504-13..... $\geq$ 25 ooquistes
Excipientes csp..... 1 dosis
-Preservantes: Dicromato de potasio

APROBADO
SAG
15-06-2023

3.- Propiedades inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra *Eimeria Acervulina*-*E. Brunetti*-*E. Maxima*- *E. Necatrix*- *E. Tenella*,

REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

4.-Particularidades clínicas:

- a) **Especies de destino y subcategoría:** Pollos broiler, pollas de reemplazo, pollos/pollas de reemplazo de reproductores

- b) **Indicaciones de uso para cada especie(s) de destino y subcategoría:**

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de coccidiosis producida por *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria maxima*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria tenella*.

Establecimiento de la inmunidad: 30 días posteriores a la vacunación.

- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.**

- **Dosis:**
0,25 mL/pollo
- **Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:**
Dosis única



- **Edad o peso:**
A partir del 1 día de edad y hasta los 3 días de edad
- **Condición fisiológica:**
Aves sanas.
- **Vía de administración:**
Oral.
- **Modo de empleo:**

**APROBADO
SAG**

15-06-2023

**REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

- Para 10.000 dosis de IMMUCOX® 5, añadir 70 g de diluyente de gotitas de gel en 2.5 L de agua destilada fría.
- Mezclar bien con una mezcladora.
- Agitar bien 10.000 dosis de la vacuna IMMUCOX® 5, verter y mezclar con una mezcladora. No es necesaria más agitación si se usa el mismo día.
- Vacune en una proporción de 25 mL por cada 100 aves, a través de una máquina o dispositivo de gotitas de gel.

d) Contraindicaciones

No usar en conjunto con ningún medicamento con efecto coccidiostato (anticoccidial).

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico: No se han descrito

f) Advertencias y precauciones especiales de uso

Si las aves se albergan en un espacio confinado, deben de ser liberadas del confinamiento hacia el sexto día posterior a la vacunación o bien el área debe de duplicarse en tamaño.

Para alcanzar la inmunidad protectora, las aves vacunadas deben tener contacto con los ooquistes excretados por las fecas, post vacunación. Mantener fuera del alcance de los niños.

g) Uso durante postura y animales reproductores

No aplica.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado: No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización

i) Sobredosis: No aplica



j) **Periodo de resguardo:** 21 días

k) **Precauciones especiales para el operador:** En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. Si se salpica en los ojos, enjuague con agua.
Utilizar guantes al momento de preparar y administrar la vacuna a los animales.

5.- Particularidades farmacéuticas.

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico. Existe incompatibilidad con coccidiostatos, incluyendo los antibióticos de amplio espectro que tengan actividad anticoccidial.

b) **Periodo de eficacia:** 6 meses. Una vez abierto, utilizar todo el contenido del envase.

c) **Condiciones de almacenamiento:** Mantener refrigerado entre 2 y 8 °C. No congelar. El diluyente debe mantenerse a temperatura ambiente entre 15 y 30°C

d) Descripción de los envases.

Estuche de cartulina etiquetado, con 10 frascos de vidrio tipo I, etiquetados, cerrados con tapón de halobutilo y cápsula de aluminio con recubrimiento tear-off, conteniendo 1.000, 2.000 o 5.000 dosis cada uno.

Bolsa de polietileno de baja densidad, sellada, etiquetada, conteniendo 70 gramos de diluyente gel.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración.

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados

6.- Condición de venta: Venta bajo receta médica veterinaria

7.- Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y el establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante.

Fabricado por:

Ceva Animal Health Inc.
131 Malcolm Road
Guelph, Ontario, Canadá

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Avda. Apoquindo 3669 Of.801, Las Condes, Santiago – Chile

**APROBADO
SAG**

15-06-2023

**REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

Bajo licencia de Ceva Animal Health Inc. Canada.



8.- Otra Información:

USO VETERINARIO

Mantener fuera del alcance de los niños

Registro SAG N°

APROBADO
SAG

15-06-2023

REGISTRO SAG N° 2599-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO