



ETIQUETA CAJA X 10 FRASCOS LIOFILIZADO
Presentación de 1.000 dosis

1000

Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Viruela Aviar y Laringotraqueitis
Infecciosa Aviar

VECTORMUNE® FP – LT

Polvo liofilizado

10x 1000 Dosis (10 mL)

COMPOSICIÓN: Cada dosis reconstituida contiene: Virus viruela aviar, Cepa Cutter recombinante rFP/LT $\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀, Excipientes c.s.p. 1 dosis, Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B.

PRODUCIDO POR: Ceva Animal Health LLC, 8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, U.S.A.
Tel: (913) 894-0230, VLN 368/PCN 1F31.R0

Almacenar la vacuna a 2-8°C (35-46°F), fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución. No aceptar si el sello está roto. Todos los pollos en una granja deben ser vacunados al mismo tiempo.

PERIODO DE RESGUARDO: 21 días.

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA. Av Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago
Bajo Licencia de Ceva Animal Health LLC, USA

Reg. SAG N°

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO-VETERINARIA

Prohibida la venta fraccionada

Para mayor información: ver inserto.

APROBADO
SAG
14-11-2025

Lote N°:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

PZ420HDCL



c. Proyecto de rotulado gráfico (estuche, etiqueta, blíster, prospecto, folletos).

RÓTULO FRASCO
Presentación de 1.000 dosis

Vacuna de Viruela Aviar-Laringotraqueitis

Vector Vivo de Viruela Aviar

VECTORMUNE® FP – LT

USO VETERINARIO

1000 dosis (10 mL)

PARA INSTRUCCIONES, VER LA CAJA.

COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene $\geq 10^{2.7}$ DICT₅₀ del virus de Viruela Aviar, cepa Cutter, genéticamente modificado con el virus de la Laringotraqueítis Aviar, cepa 632 y NS175.

AVISO: Almacenar a 2-8°C (35-46°F). Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente. Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PY420HFAR-05

Ceva Animal Health LLC

8906 Rosehill Road,
Lenexa, Kansas 66215 USA

Phone: (913) 894-0230

VLN 368/PCN 1F31.R0

Importador y Distribuidor:

Argentina: Ceva Salud Animal SRL

Certificado N°: 08-189

Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA.

Reg. SAG N°:

Lote N°:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

14-11-2025



ETIQUETA CAJA X 10 FRASCOS LIOFILIZADO
Presentación de 2.000 dosis

2000

Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Viruela Aviar y Laringotraqueitis
Infecciosa Aviar

VECTORMUNE® FP – LT

Polvo liofilizado

10x 2000 Dosis (10 mL)

COMPOSICIÓN: Cada dosis reconstituida contiene: Virus viruela aviar, Cepa Cutter recombinante rFP/LT $\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀, Excipientes c.s.p. 1 dosis, Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B.

PRODUCIDO POR: Ceva Animal Health LLC, 8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, U.S.A.
Tel: (913) 894-0230, VLN 368/PCN 1F31.R0

Almacenar la vacuna a 2-8°C (35-46°F), fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución. No aceptar si el sello está roto. Todos los pollos en una granja deben ser vacunados al mismo tiempo.

PERIODO DE RESGUARDO: 21 días.

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA. Av Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago
Bajo Licencia de Ceva Animal Health LLC, USA

Reg. SAG N°

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO-VETERINARIA

Prohibida la venta fraccionada

Para mayor información: ver inserto.

APROBADO
SAG
14-11-2025

Lote N°:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

PZ420IDCL

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



RÓTULO FRASCO
Presentación de 2.000 dosis

Vacuna de Viruela Aviar-Laringotraqueitis

Vector Vivo de Viruela Aviar

VECTORMUNE® FP – LT

USO VETERINARIO

2000 dosis (10 mL)

PARA INSTRUCCIONES, VER LA CAJA.

COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene $\geq 10^{2.7}$ DICT₅₀ del virus de Viruela Aviar, cepa Cutter, genéticamente modificado con el virus de la Laringotraqueitis Aviar, cepa 632 y NS175.

AVISO: Almacenar a 2-8°C (35-46°F). Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente. Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PY420IFAR-05

Ceva Animal Health LLC

8906 Rosehill Road,
Lenexa, Kansas 66215 USA

Phone: (913) 894-0230

VLN 368/PCN 1F31.R0

Importador y Distribuidor:

Argentina: Ceva Salud Animal SRL

Certificado N°: 08-189

Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA.

Reg. SAG N°:

Lote N°:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

14-11-2025



ETIQUETA CAJA X 10 FRASCOS LIOFILIZADO
Presentación de 4.000 dosis

4000

Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Viruela Aviar y Laringotraqueitis
Infecciosa Aviar

VECTORMUNE® FP – LT

Polvo liofilizado

10x 4000 Dosis (10 mL)

COMPOSICIÓN: Cada dosis reconstituida contiene: Virus viruela aviar, Cepa Cutter recombinante rFP/LT $\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀, Excipientes c.s.p. 1 dosis, Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B.

PRODUCIDO POR: Ceva Animal Health LLC, 8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, U.S.A.
Tel: (913) 894-0230, VLN 368/PCN 1F31.R0

Almacenar la vacuna a 2-8°C (35-46°F), fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución. No aceptar si el sello está roto. Todos los pollos en una granja deben ser vacunados al mismo tiempo.

PERIODO DE RESGUARDO: 21 días.

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA. Av Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago
Bajo Licencia de Ceva Animal Health LLC, USA

Reg. SAG N°

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO-VETERINARIA

Prohibida la venta fraccionada

Para mayor información: ver inserto.

Lote N°:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

**APROBADO
SAG**

14-11-2025

PZ420KDCL

**REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**



RÓTULO FRASCO
Presentación de 4.000 dosis

Vacuna de Viruela Aviar-Laringotraqueitis

Vector Vivo de Viruela Aviar

VECTORMUNE® FP – LT

USO VETERINARIO

4000 dosis (10 mL)

PARA INSTRUCCIONES, VER LA CAJA.

COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene $\geq 10^{2.7}$ DICT₅₀ del virus de Viruela Aviar, cepa Cutter, genéticamente modificado con el virus de la Laringotraqueítis Aviar, cepa 632 y NS175.

AVISO: Almacenar a 2-8°C (35-46°F). Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente. Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PY420KFAR-05

Ceva Animal Health LLC

8906 Rosehill Road,
Lenexa, Kansas 66215 USA

Phone: (913) 894-0230

VLN 368/PCN 1F31.R0

Importador y Distribuidor:

Argentina: Ceva Salud Animal SRL

Certificado N°: 08-189

Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA.

Reg. SAG N°:

Lote N°:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
14-11-2025



INSERTO

Presentación de 1.000, 2.000 y 4.000 dosis

VECTORMUNE® FP – LT

Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Viruela Aviar y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar

Polvo liofilizado

COMPOSICIÓN:

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Viruela aviar, Cepa Cutter recombinante rFP/LT

Excipientes c.s.p.

Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B

$\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀

1 dosis

ESPECIE DE DESTINO:

Pollos *broilers* y pollas de reemplazo

INDICACIONES DE USO:

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Viruela Aviar y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar.

Inicio de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: por lo menos 24 semanas después de la vacunación.

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Pollos *broilers*/ Pollas de reemplazo: A partir de los 7 días de edad por punción alar.

Huevos embrionados: entre los 18 a 19 días de incubación por inyección *in ovo*. Aplicar un refuerzo a los 7 días de edad mediante punción alar.

Vacunación membrana alar: Para la administración de la membrana alar utilice el diluyente azul estéril para la reconstitución de la vacuna. Diluir 1.000 dosis de vacuna en 10 mL de diluyente azul. Agite bien. Una vez preparada administrar dentro de 2 horas. Sostenga cada pollo/a individualmente y extienda el ala con la parte inferior hacia arriba. Sumerja el aplicador en la vacuna de modo que las ranuras se llenen de líquido. Administrar 0,01 mL por pollo/a, para ello inserte el aplicador de doble punta en la membrana del ala. Evite perforar el músculo del ala, el hueso o los vasos sanguíneos grandes. Vuelva a sumergir el aplicador entre cada vacunación. De 7 a 10 días después de la vacunación, observe varios pollos en busca de evidencia de hinchazón y/o formación de costras.

Vacunación *in ovo*: Para la administración *in ovo* utilizar el diluyente rojo estéril para la reconstitución de la vacuna. Elegir la dilución a utilizar, dependiendo del volumen a inyectar en cada huevo:

- Diluir 1.000 dosis de vacuna en 100 mL de diluyente rojo y administrar 0,1 mL por embrión.
- Diluir 1.000 dosis de vacuna en 50 mL de diluyente rojo y administrar 0,05 mL por embrión.

APROBADO
SAG
14-11-2025

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



La vacuna se administra a huevos embrionados de 18 – 19 días de incubación. Leer el manual del operador del sistema de inyección de huevos antes de iniciar la vacunación. Desinfecte el sistema de inyección de huevos antes y después de su uso siguiendo los procedimientos descritos en el manual del operador. No seguir las instrucciones puede provocar lesiones personales, mortalidad embrionaria excesiva y baja incubabilidad.

EFFECTOS O REACCIONES ADVERSAS:

No se han descrito.

INTERACCIÓN CON OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS O PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

Los pollos que reciban esta vacuna no deben haber sido vacunados previamente con la vacuna contra la viruela aviar. Sólo se puede lograr una protección satisfactoria en aves sanas. Todas las aves de la bandada deben ser vacunadas al mismo tiempo. El almacenamiento o manipulación inadecuados de la vacuna pueden provocar una pérdida de potencia. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES PARA EL OPERADOR:

Utilizar elementos de protección personal durante el manejo del producto. Lavar y desinfectar las manos luego del uso. Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

PERIODO DE RESGUARDO:

21 días

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz. Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO:

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO-VETERINARIA

Prohibida la venta fraccionada

Reg. SAG N°

APROBADO
SAG
14-11-2025

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC. 8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215 - USA.

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA. Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

www.ceva.com



Bajo licencia de:
Ceva Animal Health, LLC, USA.

PX420XXCL

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

14-11-2025



ETIQUETA CAJA DILUYENTE AZUL
Presentación 10 frascos de 10 mL

DILUYENTE ESTÉRIL
Aplicación por pliegue de ala

Contiene 3 agujas aplicadoras

10 x 10 mL
envases

COMPOSICIÓN: colorante azul, glicerina, agua.

No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio.

Almacenar a temperatura ambiente (15 – 30°C), fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médico-veterinaria. Prohibida la venta fraccionada

USO VETERINARIO

Diluir la vacuna a utilizar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Elaborado por Ceva Animal Health LLC

Lenexa, Kansas 66215, USA Teléfono: (913) 894-0230

VLN 368

Importado y distribuido por Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo Licencia de Ceva Animal Health LLC - USA.

Reg. SAG N°

PZ012XDCL

N° de lote:

Fecha de Fab.:

Fecha de Vto.:

APROBADO
SAG
14-11-2025

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



ETIQUETA FRASCO DILUYENTE AZUL
Presentación de 10 mL

DILUYENTE ESTÉRIL
Aplicación por pliegue de ala
USO VETERINARIO
10 mL

Almacenar a temperatura ambiente (15 – 30°C), fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Venta bajo receta médico-veterinaria.

Elaborado por: Ceva Animal Health LLC, 8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, U.S.A. Tel: (913) 894-0230, VLN 368

Ceva Salud Animal Chile SpA,

Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo Licencia de Ceva Animal Health LLC - USA. Reg. SAG N°

N° de lote:

Fecha de Fab.:

Fecha de Vto.:

PY012XECL

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

14-11-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE BAXTER

Presentación de 400 mL

DILUYENTE ESTÉRIL PARA VACUNAS AVIARES

USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO 400 mL

COMPOSICIÓN SOLUCIÓN FOSFATADA ADICIONADA DE SACAROSA Y ROJO FENOL

MODO DE USAR / INSTRUCCIONES

VERIFICAR EL COLOR Y ASPECTO DEL DILUYENTE ANTES DE RECONSTITUIR LA VACUNA. DILUIR LA VACUNA A UTILIZAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEZCLAR CUIDADOSAMENTE LA SOLUCIÓN VACUNAL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR ENTRE 15° Y 30°.

NO REFRIGERAR.

NO UTILIZAR EL DILUYENTE SI SE VE TURBIO O ESTÁ DAÑADO EL ENVASE

INCINERAR ESTE ENVASE Y TODO EL CONTENIDO NO UTILIZADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO DE LA VACUNA PARA MAYOR INFORMACIÓN.

FABRICANTE

BAXTER HOSPITALAR LTDA

AV ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2555 - SÃO PAULO SP -BRASIL

CNPJ 49.351.786/0002-61

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Ceva Salud Animal- México

EN PARAGUAY

Representante - LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SA

Asesor técnico Dr. Erwin Muhr - registro N° 660

N° de registro SENACSA 20791

EN CHILE:

Ceva Salud Animal Chile SpA,

Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Para reconstituir la vacuna Reg. SAG N° _____

PART

FABR

VENC

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
14-11-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE BAXTER
Presentación de 800 mL

DILUYENTE ESTÉRIL PARA VACUNAS AVIARES
USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO 800 mL

COMPOSICIÓN SOLUCIÓN FOSFATADA ADICIONADA DE SACAROSA Y ROJO FENOL

MODO DE USAR / INSTRUCCIONES

VERIFICAR EL COLOR Y ASPECTO DEL DILUYENTE ANTES DE RECONSTITUIR LA VACUNA. DILUIR LA VACUNA A UTILIZAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEZCLAR CUIDADOSAMENTE LA SOLUCIÓN VACUNAL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR ENTRE 15° Y 30°.

NO REFRIGERAR.

NO UTILIZAR EL DILUYENTE SI SE VE TURBIO O ESTÁ DAÑADO EL ENVASE
INCINERAR ESTE ENVASE Y TODO EL CONTENIDO NO UTILIZADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO DE LA VACUNA PARA MAYOR INFORMACIÓN.

FABRICANTE

BAXTER HOSPITALAR LTDA

AV ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2555 - SÃO PAULO SP -BRASIL

CNPJ 49.351.786/0002-61

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Ceva Salud Animal- México

EN PARAGUAY

Representante - LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SA

Asesor técnico Dr. Erwin Muhr - registro N° 660

N° de registro SENACSA 20791

EN CHILE:

Ceva Salud Animal Chile SpA,

Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Para reconstituir la vacuna Reg. SAG N° _____

PART

FABR

VENC

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
14-11-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE BAXTER
Presentación de 1000 mL

DILUYENTE ESTÉRIL PARA VACUNAS AVIARES
USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO 1.000 mL

COMPOSICIÓN SOLUCIÓN FOSFATADA ADICIONADA DE SACAROSA Y ROJO FENOL

MODO DE USAR / INSTRUCCIONES

VERIFICAR EL COLOR Y ASPECTO DEL DILUYENTE ANTES DE RECONSTITUIR LA VACUNA. DILUIR LA VACUNA A UTILIZAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEZCLAR CUIDADOSAMENTE LA SOLUCIÓN VACUNAL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR ENTRE 15° Y 30°.

NO REFRIGERAR.

NO UTILIZAR EL DILUYENTE SI SE VE TURBIO O ESTÁ DAÑADO EL ENVASE
INCINERAR ESTE ENVASE Y TODO EL CONTENIDO NO UTILIZADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO DE LA VACUNA PARA MAYOR INFORMACIÓN.

FABRICANTE

BAXTER HOSPITALAR LTDA

AV ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2555 - SÃO PAULO SP -BRASIL

CNPJ 49.351.786/0002-61

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Ceva Salud Animal- México

EN PARAGUAY

Representante - LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SA

Asesor técnico Dr. Erwin Muhr - registro N° 660

N° de registro SENACSA 20791

EN CHILE:

Ceva Salud Animal Chile SpA.

Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Para reconstituir la vacuna Reg. SAG N° _____

PART

FABR

VENC

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
14-11-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE BAXTER
Presentación de 1200 mL

DILUYENTE ESTÉRIL PARA VACUNAS AVIARES
USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO 1.200 mL

COMPOSICIÓN SOLUCIÓN FOSFATADA ADICIONADA DE SACAROSA Y ROJO FENOL

MODO DE USAR / INSTRUCCIONES

VERIFICAR EL COLOR Y ASPECTO DEL DILUYENTE ANTES DE RECONSTITUIR LA VACUNA. DILUIR LA VACUNA A UTILIZAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEZCLAR CUIDADOSAMENTE LA SOLUCIÓN VACUNAL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR ENTRE 15° Y 30°.

NO REFRIGERAR.

NO UTILIZAR EL DILUYENTE SI SE VE TURBIO O ESTÁ DAÑADO EL ENVASE
INCINERAR ESTE ENVASE Y TODO EL CONTENIDO NO UTILIZADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO DE LA VACUNA PARA MAYOR INFORMACIÓN.

FABRICANTE

BAXTER HOSPITALAR LTDA

AV ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2555 - SÃO PAULO SP -BRASIL

CNPJ 49.351.786/0002-61

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Ceva Salud Animal- México

EN PARAGUAY

Representante - LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SA

Asesor técnico Dr. Erwin Muhr - registro N° 660

N° de registro SENACSA 20791

EN CHILE:

Ceva Salud Animal Chile SpA,

Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Para reconstituir la vacuna Reg. SAG N° _____

PART

FABR

VENC

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
14-11-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE CEVA ANIMAL HEALTH, LLC
Presentación de 400 mL

Serial No

Manufacturing date:

Exp date

400 mL

DILUYENTE PARA RECONSTITUIR
VACUNAS AVIARES LIOFILIZADAS

Composición: Solución fosfatada con adición de sacarosa y rojo fenol.

No usar este diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C). No refrigerar.

Para mayor información, ver prospecto interno.

Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución. Mantener fuera del alcance de los niños. Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

Para reconstituir la vacuna Reg SAG N°

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC
8906 Rosehill Rd.
Lenexa, Kansas 66215, USA

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
14-11-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE CEVA ANIMAL HEALTH, LLC
Presentación de 800 mL

Serial No

Manufacturing date:

Exp date

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

800 mL

DILUYENTE PARA RECONSTITUIR
VACUNAS AVIARES LIOFILIZADAS

Composición: Solución fosfatada con adición de sacarosa y rojo fenol.

No usar este diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C). No refrigerar.

Para mayor información, ver prospecto interno.

Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución. Mantener fuera del alcance de los niños. Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

Para reconstituir la vacuna Reg SAG N°

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC
8906 Rosehill Rd.
Lenexa, Kansas 66215, USA

APROBADO
SAG
14-11-2025



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** Vectormune® FP-LT
- b) **Nombre Genérico:** Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Viruela Aviar y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar.
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo liofilizado

2. Composición

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus viruela aviar, Cepa Cutter recombinante rFP/LT $\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B

3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra los virus de la Viruela Aviar y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar.

4. Particularidades clínicas:

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

- a) **Especies de destino y subcategoría:**

Pollos *broilers* y pollas de reemplazo.

APROBADO
SAG
14-11-2025

- b) **Indicaciones de uso**

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Viruela Aviar y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar.

Inicio de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: por lo menos 24 semanas después de la vacunación.

- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.**

- **Dosis:**

Pollos *broilers*/pollas de reemplazo: 1 dosis/pollo

Huevos embrionados: 1 dosis /embrión

- **Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:**

En huevos embrionados aplicar una dosis de refuerzo a los 7 días de edad.

- **Edad o peso:**

Pollos *broilers*/Pollas de reemplazo: a partir de los 7 días de edad.

Huevos embrionados: 18-19 días de incubación.



**APROBADO
SAG**
14-11-2025

- **Condición fisiológica:**
Embriones y animales sanos.
- **Vía de administración:**
Pollos broilers/Pollas de reemplazo: punción alar.
Huevos embrionados: inyección *in-ovo*.
- **Modo de empleo:**

Vacunación membrana alar

1. Para la administración de la membrana alar utilice el diluyente azul estéril para la reconstitución de la vacuna.
2. Diluir 1.000 dosis de vacuna en 10 mL de diluyente azul. Agite bien. Una vez preparada administrar dentro de 2 horas.
3. Sostenga cada pollo/a individualmente y extienda el ala con la parte inferior hacia arriba.
4. Sumerja el aplicador en la vacuna de modo que las ranuras se llenen de líquido.
5. Administrar 0,01 mL por pollo/a, para ello inserte el aplicador de doble punta en la membrana del ala. Evite perforar el músculo del ala, el hueso o los vasos sanguíneos grandes.
6. Vuelva a sumergir el aplicador entre cada vacunación.
7. De 7 a 10 días después de la vacunación, observe varios pollos en busca de evidencia de hinchazón y/o formación de costras.

Vacunación in ovo

1. Para la administración in ovo utilizar el diluyente rojo estéril para la reconstitución de la vacuna.
2. Elegir la dilución a utilizar, dependiendo del volumen a inyectar en cada huevo:
 - Diluir 1.000 dosis de vacuna en 100 mL de diluyente rojo y administrar 0,1 mL por embrión.
 - Diluir 1.000 dosis de vacuna en 50 mL de diluyente rojo y administrar 0,05 mL por embrión.
3. La vacuna se administra a huevos embrionados de 18 – 19 días de incubación.
4. Leer el manual del operador del sistema de inyección de huevos antes de iniciar la vacunación.
5. Desinfecte el sistema de inyección de huevos antes y después de su uso siguiendo los procedimientos descritos en el manual del operador.
6. No seguir las instrucciones puede provocar lesiones personales, mortalidad embrionaria excesiva y baja incubabilidad.

- d) **Contraindicaciones**
Ninguna conocida.

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

- e) **Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico.**
No se han descrito.



f) **Advertencias y precauciones especiales de uso.**

Los pollos que reciban esta vacuna no deben haber sido vacunados previamente con la vacuna contra la viruela aviar.

Sólo se puede lograr una protección satisfactoria en aves sanas. Todas las aves de la bandada deben ser vacunadas al mismo tiempo.

El almacenamiento o manipulación inadecuados de la vacuna pueden provocar una pérdida de potencia.

Mantener fuera del alcance de los niños.

g) **Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores.**

No utilizar en aves en postura o dentro de las 4 semanas anteriores al inicio del período de postura.

a) **Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado.**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

b) **Sobredosis.**

La administración de 10 veces la dosis se considera seguro. Sin embargo, no se recomienda sobredosificar.

c) **Periodo de resguardo**

21 días

APROBADO
SAG
14-11-2025

d) **Precauciones especiales para el operador.**

Utilizar elementos de protección personal durante el manejo del producto.

Lavar y desinfectar las manos luego del uso.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

5. Particularidades farmacéuticas

a) **Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún otro producto farmacéutico, excepto con el diluyente suministrado por el fabricante.

b) **Período de eficacia(estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis según corresponda.**

Vacuna liofilizada: 24 meses

Diluyente azul: 60 meses.

Diluyente rojo:(Ceva Animal Health, LLC):30 meses.

(Baxter Hospitalar Ltda.): 24 meses.

Utilizar todo el contenido dentro de las 2 horas después de la reconstitución.

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



c) **Condiciones de almacenamiento.**

Vacuna liofilizada: Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Diluyente azul: Almacenar a temperatura ambiente (15 – 30°C).

Diluyente rojo: Almacenar a temperatura ambiente (15 – 30°C).

d) **Descripción de los envases.**

Caja de RPVC, etiquetada, con 10 frascos de vidrio borosilicato tipo 1, etiquetados, cerrados con tapón de goma y sello de aluminio conteniendo 1.000, 2.000 o 4.000 dosis. Incluye inserto.

Caja de cartón etiquetada, con 10 frascos de vidrio de borosilicato tipo I o plástico (HDPE), cerrados con tapón de goma y cápsula de aluminio, conteniendo 10 mL de diluyente azul. Incluye 3 agujas aplicadoras.

Bolsa de PVC, etiquetada, conteniendo 400, 800, 1.000 o 1.200 mL de diluyente rojo.

e) **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere.**

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

REGISTRO SAG N° 2727-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

6. **Condición de venta**

Venta bajo receta médico-veterinaria

7. **Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento, importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda**

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC.

8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, USA.

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de:

Ceva Animal Health LLC, USA.

APROBADO
SAG
14-11-2025

Mantener fuera del alcance de los niños
Registro SAG N° XXX
USO VETERINARIO