



ANVERSO ETIQUETA CAJA X 10 FRASCOS LIOFILIZADO
Presentación de 1.000 dosis

1000

Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Viruela Aviar y Laringotraqueitis
Infecciosa Aviar y viva contra Encefalomiелitis Aviar.

VECTORMUNE® FP – LT+AE

Polvo liofilizado

10x 1000 Dosis

COMPOSICIÓN: Cada dosis reconstituida contiene:

Virus viruela aviar, Cepa Cutter recombinante rFP/LT

$\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀

Virus Encefalomiелitis Aviar, Cepa Calnek

$\geq 10^{2.7}$ EID₅₀

Excipientes c.s.p.

1 dosis

-Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B.

DESCRIPCIÓN: Vectormune® FP-LT+AE contiene virus vivo de viruela aviar genéticamente modificado para la prevención de viruela aviar y laringotraqueítis y el virus vivo convencional para la prevención de encefalomiелitis aviar. El virus de viruela aviar ha sido genéticamente modificado para contener y expresar antígenos protectores claves del virus de la laringotraqueítis.

INDICACIONES DE USO: Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Viruela Aviar, Laringotraqueitis Infecciosa Aviar y Encefalomiелitis Aviar.

Inicio de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: al menos 24 semanas después de la vacunación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. Una vez reconstituido utilizar dentro de 1 hora.

PRODUCIDO POR: Ceva Animal Health LLC, 8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, U.S.A.
Tel: (913) 894-0230

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA. Av Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo Licencia de Ceva Animal Health LLC, USA

Reg. SAG N°XXX

VENTA BAJO RECETA MÉDICO-VETERINARIA

Prohibida la venta fraccionada

VER EL REVERSO PARA INSTRUCCIONES COMPLETAS

Lote N°:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

APROBADO
SAG

18-12-2025

REGISTRO SAG N° 2733-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



REVERSO ETIQUETA CAJA X 10 FRASCOS LIOFILIZADO
Presentación de 1.000 dosis

ESPECIE DE DESTINO Pollos *broilers* y pollas de reemplazo

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Administrar 1 dosis/pollo, en dosis única por punción alar. Retire el sello y el tapón del vial de vacuna y del vial de diluyente. Vierta todo el contenido del vial de diluyente en el vial de vacuna, tapar y agitar bien. La vacuna está lista para usar y debe usarse dentro de una hora. Sostenga cada ave individualmente y extienda el ala con la parte inferior hacia arriba.

Sumerja el aplicador en la vacuna de modo que las ranuras se llenen de líquido para administrar 0,01 mL por pollo. Inserte el aplicador de doble punta en la membrana alar.

Evite perforar el músculo del ala, el hueso o los vasos sanguíneos grandes. Vuelva a sumergir el aplicador entre cada vacunación.

De 7 a 10 días después de la vacunación, observe varios pollos en busca de evidencia de una reacción local satisfactoria (pápula) que incluya inflamación y formación de costra en el sitio de la aplicación.

ADVERTENCIAS O PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO: Los pollos que reciban esta vacuna no deben haber sido vacunados previamente con la vacuna contra la viruela aviar. Sólo se puede lograr una protección satisfactoria en aves sanas. Todas las aves de la bandada deben ser vacunadas al mismo tiempo. El almacenamiento o manipulación inadecuados de la vacuna pueden provocar una pérdida de potencia. Mantener fuera del alcance de los niños. La vacunación debe completarse al menos 4 semanas antes del período de postura.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna conocida.

EFFECTOS O REACCIONES ADVERSAS: No se han descrito.

PERIODO DE RESGUARDO: 21 días

INTERACCIÓN CON OTROS PRODUCTOS: No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

PRECAUCIONES PARA EL OPERADOR: Utilizar elementos de protección personal durante el manejo del producto. Lavar y desinfectar las manos luego del uso. Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN: Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

USO VETERINARIO

APROBADO
SAG

18-12-2025

REGISTRO SAG N° 2733-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



c. Proyecto de rotulado gráfico (estuche, etiqueta, blíster, prospecto, folletos).

RÓTULO FRASCO
Presentación de 1.000 dosis

Vacuna de Encefalomiелitis Aviar-Viruela Aviar-Laringotraqueitis

Virus Vivo, Vector Vivo de Viruela Aviar

VECTORMUNE® FP-LT+AE

1000 DOSIS

PARA INSTRUCCIONES, VER LA CAJA.

COMPOSICIÓN: Virus de la Encefalomiелitis Aviar por lo menos $10^{2.7}$ DIE₅₀/dosis;

Virus de la Viruela Aviar-Laringotraqueitis Aviar por lo menos $10^{2.7}$ DITC₅₀/dosis.

Excipientes c.s.p. 1 dosis.

AVISO: Almacenar a 2-8°C (35-46°F). Una vez reconstituida, utilizar dentro de 1 hora.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

USO VETERINARIO.

PY421HFAR-06

Ceva Animal Health LLC

8906 Rosehill Road,
Lenexa, Kansas 6621, USA

Phone: (913) 894-0230

VLN 368/PCN 10S1.R0

Importador y distribuidor:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL

Certificado N° 08-210

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA.

Reg. SAG N°XXX

Lote N°:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

APROBADO
SAG
18-12-2025

REGISTRO SAG N° 2733-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



ETIQUETA CAJA DILUYENTE AZUL
Presentación 10 frascos de 10 mL

DILUYENTE ESTÉRIL
Aplicación por pliegue de ala

Contiene 3 agujas aplicadoras

10 x 10 mL
envases

COMPOSICIÓN: colorante azul, glicerina, agua.

No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio.

Almacenar a temperatura ambiente (15 – 30°C), fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Venta bajo receta médico-veterinaria. Prohibida la venta fraccionada.

USO VETERINARIO

Diluir la vacuna a utilizar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Elaborado por Ceva Animal Health LLC

Lenexa, Kansas 66215, USA Teléfono: (913) 894-0230

VLN 368

Importado y distribuido por Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo Licencia de Ceva Animal Health LLC - USA.

Reg. SAG N°

APROBADO
SAG
18-12-2025

PZ012XDCL

N° de lote:

Fecha de Fab.:

Fecha de Vto.:

REGISTRO SAG N° 2733-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



ETIQUETA FRASCO DILUYENTE AZUL
Presentación de 10 mL

DILUYENTE ESTÉRIL
Aplicación por pliegue de ala
USO VETERINARIO
10 mL

Almacenar a temperatura ambiente (15 – 30°C), fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Venta bajo receta médico-veterinaria.

Elaborado por: Ceva Animal Health LLC, 8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, U.S.A. Tel: (913) 894-0230, VLN 368

Importado y Distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA,
Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago
Bajo Licencia de Ceva Animal Health LLC - USA. Reg. SAG N°
N° de lote:
Fecha de Fab.:
Fecha de Vto.:
PY012XECL

APROBADO
SAG
18-12-2025

REGISTRO SAG N° 2733-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** Vectormune® FP-LT+AE
- b) **Nombre Genérico:** Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Viruela Aviar y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar y viva contra Encefalomiелitis Aviar.
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo liofilizado

2. Composición

REGISTRO SAG N° 2733-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus viruela aviar, Cepa Cutter recombinante rFP/LT $\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀

Virus Encefalomiелitis Aviar, Cepa Calnek $\geq 10^{2.7}$ EID₅₀

Excipientes c.s.p. 1 dosis

-Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B

3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra los virus de la Viruela Aviar, Laringotraqueitis Infecciosa Aviar y Encefalomiелitis Aviar.

4. Particularidades clínicas:

- a) **Especies de destino y subcategoría:**

Pollos *broilers* y pollas de reemplazo.

APROBADO
SAG
18-12-2025

- b) **Indicaciones de uso**

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Viruela Aviar, Laringotraqueitis Infecciosa Aviar y Encefalomiелitis Aviar.

Inicio de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: al menos 24 semanas después de la vacunación.

- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.**

- **Dosis:** 1 dosis/pollo.
- **Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:** dosis única
- **Edad o peso:** a partir de las 8 semanas de edad y con al menos 4 semanas antes del inicio de la postura.
- **Condición fisiológica:** Pollos sanos.
- **Vía de administración:** Punción alar.
- **Modo de empleo:**

Retire el sello y el tapón del vial de vacuna y del vial de diluyente. Vierta todo el contenido del vial de diluyente en el vial de vacuna, tapar y agitar bien. La vacuna está lista para usar y debe usarse dentro de una hora.

Sostenga cada ave individualmente y extienda el ala con la parte inferior



hacia arriba.

Sumerja el aplicador en la vacuna de modo que las ranuras se llenen de líquido para administrar 0,01 mL por pollo. Inserte el aplicador de doble punta en la membrana alar.

Evite perforar el músculo del ala, el hueso o los vasos sanguíneos grandes. Vuelva a sumergir el aplicador entre cada vacunación.

De 7 a 10 días después de la vacunación, observe varios pollos en busca de evidencia de una reacción local satisfactoria (pápula) que incluya inflamación y formación de costra en el sitio de la aplicación.

d) **Contraindicaciones**

Ninguna conocida.

REGISTRO SAG N° 2733-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

e) **Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico.**

No se han descrito.

f) **Advertencias y precauciones especiales de uso.**

Los pollos que reciban esta vacuna no deben haber sido vacunados previamente con la vacuna contra la viruela aviar.

Sólo se puede lograr una protección satisfactoria en aves sanas. Todas las aves de la bandada deben ser vacunadas al mismo tiempo.

El almacenamiento o manipulación inadecuados de la vacuna pueden provocar una pérdida de potencia.

Mantener fuera del alcance de los niños.

g) **Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores.**

La vacunación debe completarse al menos 4 semanas antes del inicio de la postura.

a) **Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado.**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

b) **Sobredosis.**

La administración de 10 veces la dosis se considera seguro. Sin embargo, no se recomienda sobredosificar.

c) **Periodo de resguardo**

21 días

APROBADO
SAG
18-12-2025



d) **Precauciones especiales para el operador.**

Utilizar elementos de protección personal durante el manejo del producto.

Lavar y desinfectar las manos luego del uso.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata

**APROBADO
SAG
18-12-2025**

5. Particularidades farmacéuticas

a) **Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún otro producto farmacéutico, excepto con el diluyente suministrado por el fabricante.

b) **Período de eficacia(estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis según corresponda.**

Vacuna liofilizada: 21 meses

Diluyente azul: 60 meses.

Una vez reconstituido utilizar dentro de 1 hora.

**REGISTRO SAG N° 2733-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

c) **Condiciones de almacenamiento.**

Vacuna liofilizada: Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Diluyente azul: Almacenar a temperatura ambiente (15 – 30°C).

d) **Descripción de los envases.**

Caja de RPVC, etiquetada, con 10 frascos de vidrio borosilicato tipo 1, etiquetados, cerrados con tapón de goma de halobutilo y sello de aluminio conteniendo 1.000 dosis.

Caja de cartón etiquetada, con 10 frascos de vidrio borosilicato tipo 1 o plástico PEAD, cerrados con tapón de goma y capsula de aluminio, conteniendo 10 mL de diluyente azul. Incluye 3 agujas aplicadoras.

e) **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere.**

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6. Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria



7. **Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento, importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda**

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC.

8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, USA.

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de:

Ceva Animal Health, LLC, USA.

APROBADO
SAG
18-12-2025

8. **Otra información**

Mantener fuera del alcance de los niños
Registro SAG N° XXX
USO VETERINARIO

REGISTRO SAG N° 2733-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO