



Vacuna viva contra la Enfermedad
Infecciosa de la Bursa, Polvo liofilizado

UNIVAX® BD
USO VETERINARIO

10 x 1,000 Dosis

VENCE:

FABR.:

LOTE:

Code 151637

180155-01

Fabricado por:
Intervet Inc.
29160 Intervet Lane,
Millsboro, DE 19966, USA
VLN 165A/PCN 1431.5E

Importado y distribuido por:
Intervet Veterinaria Chile Limitada
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5
Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.
Reg. SAG N°664-B

USO VETERINARIO

Prohibida la venta fraccionada
Venta bajo receta médico veterinaria

APROBADO
SAG

09-07-2022



UNIVAX® BD
Vacuna viva contra la Enfermedad
Infecciosa de la Bursa

Vacuna viva contra la
Enfermedad Infecciosa de la
Bursa, Polvo liofilizado

UNIVAX® BD
USO VETERINARIO

10 x 1,000 Dosis

1000



COMPOSICIÓN:
Cada dosis contiene: Virus de la Enfermedad de la
Bursa, cepa ST-12 > 10^{3.2} TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis
Preservante: Gentamicina

INDICACIÓN DE USO: Inmunización activa, como
ayuda en la prevención de la Enfermedad Infecciosa
de la Bursa.

ESPECIE DE DESTINO: Polos y huevos embrionados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a
temperatura entre 2° y 8° C. No congelar. Utilizar
el contenido completo una vez abierto el frasco.

Dosis, vía de administración y modo de empleo,
advertencias y precauciones especiales de uso,
contraindicaciones, efectos no deseados o reacciones
adversas, precauciones para el operador y precauciones
para la disposición: Ver inserto interno.

PERIODO DE RESGUARDO: 21 días.

Venta bajo receta Médico Veterinario.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ANIMALES DOMÉSTICOS.**

3 color: Black, PMS: 3282, 157, (60% black) Jan 30, 2018
USDA Product Code: 1271.00 9:45 am
Revision#: 180155-01
Carton Size: 2-1/2"h x 4-1/2"w x 1-15/16"d Die Line: CSK11616C
Coding Space (top): 2-1/4"w x 3/4"h CCT: 061

3 Color: **Black**, **PMS: 157**, **Cool Gray 8**

January 30, 2018

USDA Product Code: 1271.00

8:45 am

Revision#: 190555-01

CCT004

Label Size: 2-3/4" W x 1" H

Coding Space: 11/16" W x 13/16" H

1,000 dosis

**Vacuna viva contra la
Enfermedad Infecciosa de
la Bursa, Polvo liofilizado**

UNIVAX® BD

USO VETERINARIO

Composición: Cada dosis contiene: Virus de la
Enfermedad de la Bursa, cepa ST-12 $\geq 10^{2.3}$
TCID₅₀ Almacenar entre 2° y 8°C. No congelar.
Utilizar el contenido completo una vez abierto el
vasco.

Para mayor información ver inserto interno

Venta bajo receta médico veterinario

Fabricado por:
Intervet Inc.

29160 Intervet Lane,
Millsboro, DE 19966, USA
VLN 165A/PCN 1431.5E

Importado por:

Intervet Veterinaria Chile Limitada
Reg. SAG N° 664-B

1000

190555-01

LOTE:

FABR:

VENCE:

**APROBADO
SAG**

09-07-2022



Vacuna viva contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa, Polvo liofilizado

UNIVAX® BD USO VETERINARIO

10 x 5,000 Dosis

VENCE:
FABR.:
LOTE:

Code 161629 182401-01

Fabricado por:
Intervet Inc.
29160 Intervet Lane,
Millsboro, DE 19966, USA
VLN 165A/PCN 1431.5E

Importado y distribuido por:
Intervet Veterinaria Chile Limitada
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5
Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.
Reg. SAG N°664-B

USO VETERINARIO

**Prohibida la venta fraccionada
Venta bajo receta médico veterinaria**

**APROBADO
SAG**

09-07-2022



UNIVAX® BD
Vacuna viva contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa

Vacuna viva contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa, Polvo liofilizado

UNIVAX® BD
USO VETERINARIO

10 x 5,000 Dosis

5000



TM



COMPOSICIÓN:
Cada dosis contiene: Virus de la Enfermedad de la Bursa, cepa ST-12 $\geq 10^{2.5}$ TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis
Preservante: Gentamicina

INDICACIÓN DE USO: Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad Infecciosa de la Bursa.

ESPECIE DE DESTINO: Pollos y huevos embrionados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura entre 2° y 8° C. No congelar. Utilizar el contenido completo una vez abierto el frasco.

Dosis, vía de administración y modo de empleo, advertencias y precauciones especiales de uso, contraindicaciones, efectos no deseados o reacciones adversas, precauciones para el operador y precauciones para la disposición: Ver inserto interno.

PERIODO DE RESGUARDO: 21 días.

Venta bajo receta Médico Veterinario.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

3 color: Black, PMS: 3282, 157, (60% black) Jan 30, 2018
USDA Product Code: 1271.00 8:45 am
Revision#: 182401-01
Carton Size: 2-1/2"h x 4-1/2"w x 1-15/16"d DieLine: CSK11616C
Coding Space (top): 2-1/4"w x 3/4"h CCT: 061

3 Color: **Black**, **PMS: 157**, **Cool Gray 8**

January 30, 2018

USDA Product Code: 1271.00

8:45 am

Revision#: 196629-01

CCT004

Label Size: 2-3/4" W x 1" H

Coding Space: 11/16" W x 13/16" H

5,000 dosis

**Vacuna viva contra la
Enfermedad Infecciosa de
la Bursa, Polvo liofilizado**

UNIVAX® BD

USO VETERINARIO

Composición: Cada dosis contiene: Virus de la
Enfermedad de la Bursa, cepa ST-12 $\geq 10^{2.3}$
TCID₅₀ Almacenar entre 2° y 8°C. No congelar.
Utilizar el contenido completo una vez abierto el
vasco.

Para mayor información ver inserto interno
Venta bajo receta médico veterinario

Fabricado por:
Intervet Inc.

29160 Intervet Lane,
Millsboro, DE 19966, USA
VLN 165A/PCN 1431.5E

Importado por:

Intervet Veterinaria Chile Limitada
Reg. SAG N° 664-B

5000

196629-01

LOTE:

FABR:

VENCE:

**APROBADO
SAG**

09-07-2022

180623-01

UNIVAX® BD

Vacuna Viva Contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa

Polvo Liofilizado

USO VETERINARIO

Esta es una vacuna de virus vivo adaptada a cultivo de tejido de pollo que contiene una cepa atenuada cuidadosamente seleccionada del virus contra la enfermedad infecciosa de la bursa producida en cultivo celular y combinado con agentes estabilizadores. Esta vacuna liofilizada se suministra en frascos sellados al vacío.

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene: Virus de la Enfermedad de la Bursa, cepa ST-12 $\geq 10^{2.3}$ TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis. Preservante: Gentamicina.

ESPECIE DE DESTINO

Pollos y huevos embrionados.

INDICACIÓN DE USO

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad Infecciosa de la Bursa.

APROBADO
SAG

09-07-2022

DOSIS, EDAD Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

- Mediante la vía in ovo en huevos embrionados de 18 ó 19 días utilizando una máquina vacunadora para administrar 0,05 ml en cada huevo embrionado.
- Mediante administración subcutánea de 0,2 ml en pollos a partir del día de edad utilizando una jeringa de 22 y ½.
- Mediante el agua de bebida a los 7 días de edad o más.

MODO DE EMPLEO

Administración por vía In Ovo:

Vacune por vía in ovo solamente huevos embrionados saludables de 18 a 19 días de edad. Para evitar lesiones personales y mortalidad embrionaria en los huevos, lea el manual del operador y siga detenidamente las instrucciones del equipo de vacunación antes de intentar cualquier vacunación por la ruta in ovo. Desinfecte el sistema de inyección de acuerdo al manual de operación.

1. No abra ni mezcle la vacuna sino hasta antes de estar lista para usarla.
2. Rehidrate un envase a la vez y use su contenido total dentro de las dos horas posteriores a su apertura.
3. Levante el borde del sello de aluminio del envase de la vacuna para exponer el tapón de goma. Transfiera un volumen reducido (5 ml) del diluyente al envase de la vacuna utilizando una jeringa estéril de 5 ó 10 ml. El vacío interno del envase ayudará a reconstituir la vacuna rápidamente. Establezca las presiones interna y externa del envase.
4. Para frascos de 1000 dosis reconstituya en 50 ml de diluyente y para frascos de 5000 dosis reconstituya en 250 ml de diluyente.
5. Agite el envase vigorosamente para ayudar a la reconstitución de la vacuna.
6. Transfiera completamente la vacuna rehidratada al resto del envase del diluyente usando la jeringa original. Enjuague la jeringa y el recipiente de la vacuna repitiendo el procedimiento anterior.
7. Mezcle completamente la vacuna rehidratada durante 20 a 30 segundos.
8. La vacuna está ya lista para su aplicación.

Administración por vía subcutánea:

1. No abra ni mezcle la vacuna sino hasta antes de estar lista para usarla.
2. Rehidrate un envase a la vez y use su contenido total dentro de las dos horas posteriores.
3. Levante el borde del sello de aluminio del envase de la vacuna para exponer el tapón de goma. Transfiera un volumen reducido (5 ml) al envase de la vacuna utilizando una jeringa estéril de 5 ó 10 ml. El vacío interno en el envase ayudará a reconstituir la vacuna rápidamente. Establezca las presiones interna y externa del envase.
4. Para frascos de 1000 dosis reconstituya en 200 ml de diluyente y para frascos de 5000 dosis reconstituya en 1 litro de diluyente.
5. Agite el envase vigorosamente para ayudar a la reconstitución de la vacuna.
6. Transfiera completamente la vacuna rehidratada al resto del envase del diluyente usando la jeringa original. Enjuague la jeringa y el recipiente de la vacuna repitiendo el procedimiento anterior.
7. Mezcle completamente la vacuna rehidratada durante 20 a 30 segundos.
8. La vacuna está ya lista para su aplicación.

Use aguja calibre 22 ½ pulgadas y ajuste el vacunador automático por adelantado para que inocule 0.2 ml.

Administración por el Método del agua de bebida:

1. Reúna la vacuna y el equipo necesario para la vacunación de todas las aves.
2. No abra ni mezcle la vacuna sino hasta antes de su uso.
3. Levante el borde del sello de aluminio sin quitar el tapón de goma.
4. Use agua de bebida limpia, fresca y sin cloro a la cual se le ha agregado leche en polvo como se indica en **COMO VACUNAR EN AGUA DE BEBIDA**.
5. Sostenga el frasco sumergido en un balde de agua bajo un chorro de la misma agua vacunal, levante el borde del tapón de goma de manera que el agua (con la leche agregada) penetre dentro del frasco.
6. Coloque el tapón en posición original y agite el frasco para disolver completamente la vacuna.

COMO VACUNAR EN AGUA DE BEBIDA

No mezcle la vacuna en el agua de bebida sino hasta antes de utilizarla. El agua de bebida para la vacunación debe mezclarse con leche en polvo para prevenir su inactivación por cloro u otros posibles aditivos presentes en el agua, así como también para estabilizar el virus vacunal. La leche en polvo debe añadirse al agua en una proporción de 3 gramos por 11 litros, o 90 gramos por 300 litros.

Prive a las aves de agua durante varias horas antes de la vacunación con el fin de desarrollar sed en las mismas. Lave y enjuague bien los bebederos para evitar todo residuo de desinfectante. Diluya la vacuna antes de usarla con agua limpia, fresca y sin cloro (con la leche añadida). Vierta la vacuna disuelta dentro de los siguientes volúmenes de agua y mezcle completamente:

Cada 1000 aves	Litros
Aves	
Semana 1	6,5
Semana 2 a 4	10
Semanas 4 a 8	20
Mayor a 8 semanas	40

Distribuya la vacuna diluida de manera que todas las aves puedan beber dentro del término de una hora. No añada más agua hasta que se haya consumido completamente la vacuna.

Evite la exposición directa de la vacuna disuelta en el agua a la luz solar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Vacune solamente aves sanas.

Todas las aves de un grupo deben vacunarse el mismo día. Aísle las aves susceptibles de las aves vacunadas que se encuentren en el mismo galpón.

En caso de brote epidémico, vacune primero las aves sanas, progresando hacia las áreas afectadas a fin de vacunar las aves enfermas en último término.

Mantener fuera del alcance de los niños.

INTERACCIONES

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

PRECAUCIONES PARA EL OPERADOR

Lavar bien las manos después de haber manipulado la vacuna.

PRECAUCIONES PARA LA DISPOSICIÓN

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Contraindicaciones: Ninguna.

Efectos no deseados: No se han descrito.

Período de resguardo: 21 días.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura entre 2° y 8° C. No congelar.

Utilizar el contenido completo una vez abierto el frasco.

Presentaciones:

Estuches conteniendo: 10 frascos x 1.000 dosis y 10 frascos x 5.000 dosis.

Fabricado por:

Intervet Inc.
29160 Intervet Lane,
Millsboro, DE 19966, USA
VLN 165A/PCN 1431.5E

Importado por:

Intervet Veterinaria Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

**APROBADO
SAG**

09-07-2022

1 Color: **Black**
USDA Product Code: N/A
Revision#: 164791-04
Label Size: 2-1/2" x 1-3/16"
Coding Space: 1/2" x 1"

April 20, 2016
12:00 pm

NON-VARNISH
AREA

50 mL

**STERILE
DILUENT**

Diluyente para ser utilizado con
UNIVAX® BD, Reg. SAG N° 664-B

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN: Agua purificada estéril
INSTRUCCIONES DE USO: Ver prospecto
interno.

**ALMACENAR A TEMPERATURA
AMBIENTE ENTRE 15° Y 30° C.**

FABRICADO POR: Intervet Inc.
29160 Intervet Lane,
Millsboro, DE 19966, USA
VLN 165A/PCN 1431.5E

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet Veterinaria Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5
Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V.,
Holanda.
164791-04

Set.:
Exp.

**APROBADO
SAG**

09-07-2022

NON-VARNISH
AREA

1 Color: **Black**
USDA Product Code: N/A
Revision#: 164791-04
Label Size: 2-1/2" x 1-3/16"
Coding Space: 1/2" x 1"

April 20, 2016
12:00 pm

NON-VARNISH
AREA

200 mL

STERILE DILUENT

**Diluyente para ser utilizado con
UNIVAX[®] BD, Reg. SAG N° 664-B**

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN: Agua purificada estéril
INSTRUCCIONES DE USO: Ver prospecto
interno.

**ALMACENAR A TEMPERATURA
AMBIENTE ENTRE 15° Y 30° C.**

FABRICADO POR: Intervet Inc.

29160 Intervet Lane,
Millsboro, DE 19966, USA
VLN 165A/PCN 1431.5E

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet Veterinaria Chile Ltda.
Mariano Sanchez Fontecilla 310, piso 5 Las Condes,
Santiago, Chile.
Baja licencia de Intervet International B.V., Holanda.
164791-04

Set.:
Exp.

**APROBADO
SAG**

09-07-2022

NON-VARNISH
AREA

1 Color: **Black**
USDA Product Code: N/A
Revision#: 164791-04
Label Size: 2-1/2" x 1-3/16"
Coding Space: 1/2" x 1"

April 20, 2016
12:00 pm

NON-VARNISH
AREA

250 mL

**STERILE
DILUENT**

**Diluyente para ser utilizado con
UNIVAX® BD, Reg. SAG N° 664-B**

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN: Agua purificada estéril
INSTRUCCIONES DE USO: Ver prospecto
interno.

**ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE
ENTRE 15° Y 30° C.**

FABRICADO POR: Intervet Inc.
29160 Intervet Lane,
Millsboro, DE 19966, USA
VLN 165A/PCN 1431.5E

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet Veterinaria Chile Ltda.
Mariano Sanchez Fontecilla 310, piso 5 Las Condes,
Santiago, Chile.
Baja licencia de Intervet International B.V., Holanda.
164791-04

Ser.:
Exp.

**APROBADO
SAG**

09-07-2022

NON-VARNISH
AREA

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

a) Nombre de fantasía

Univax® BD

b) Nombre genérico

Vacuna viva contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa.

c) Forma farmacéutica

Polvo Liofilizado

2. COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Virus de la Enfermedad de la Bursa, cepa ST-12 $\geq 10^{2,3}$ TCID₅₀

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Preservante: Gentamicina

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

a) Especie de destino

Pollos y huevos embrionados

b) Indicaciones de uso

Inmunización activa, como ayuda para la prevención de la Enfermedad Infecciosa de la Bursa.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo

Dosis

1 dosis/pollo o embrión

APROBADO
SAG
09-07-2022

Edad o peso

A partir de 1er día de edad (subcutánea), 7 días de edad (oral) ó 18 – 19 días de incubación (in ovo)

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento

Dosis única

Condición fisiológica

Animales sanos

Vía de administración

Oral, subcutánea, in ovo

APROBADO
SAG

09-07-2022

Modo de empleo

Preparación de la vacuna

Administración mediante el agua de bebida:

1. Prepare la vacuna y el equipo necesario para vacunar al grupo completo de una sola vez.
2. No abra y mezcle la vacuna hasta que esté lista para usar.
3. Retire el sello de aluminio del frasco de la vacuna con cuidado para no dañar el tapón de goma.
4. Use agua de bebida limpia, fresca y sin cloro, a la cual se le ha agregado leche en polvo (ver procedimiento en "como vacunar")
5. Sostenga el frasco sumergido en un balde de agua o bajo un chorro de la misma agua vaccinal, levante el borde del tapón de goma de manera que el agua (con la leche agregada) penetre dentro del frasco.
6. Coloque el tapón en posición original y agite el frasco para disolver completamente la vacuna.

Administración *in ovo*:

1. No abra y reconstituya la vacuna hasta que esté lista para usar.
2. Reconstituya sólo 1 frasco a la vez y utilice todo el contenido dentro de 2 horas.
3. Retire el sello de aluminio del frasco de vacuna para exponer el tapón de goma. Utilizando una aguja estéril y una jeringa de 5 ó 10 ml, saque una pequeña cantidad de diluyente (5 ml) del frasco de diluyente, y transfíralo al frasco de la vacuna. El vacío del frasco de la vacuna hace que el diluyente ingrese fácilmente. Saque la jeringa del frasco.
4. Para frascos de 1.000 dosis reconstituya en 50 mL de diluyente y para frascos de 5.000 dosis reconstituya en 250 mL de diluyente.
5. Agite vigorosamente el frasco de la vacuna que esta con el diluyente para rehidratar el polvo liofilizado.

6. Utilice la misma aguja y jeringa estéril, transfiera completamente la vacuna rehidratada al frasco de diluyente. Lave la jeringa y el frasco de vacuna retirando el diluyente adicional, repitiendo el proceso.
7. Agite vigorosamente la vacuna rehidratada por 20 a 30 segundos para mezclar bien.
8. La vacuna está lista para usar.

Administración subcutánea:

1. No abra y reconstituya la vacuna hasta que esté lista para usar.
2. Reconstituya sólo 1 frasco a la vez y utilice todo el contenido dentro de 2 horas.
3. Retire el sello de aluminio del frasco de vacuna para exponer el tapón de goma. Utilizando una aguja estéril y una jeringa de 5 ó 10 ml, saque una pequeña cantidad de diluyente (5 ml) del frasco de diluyente, y transfíralo al frasco de la vacuna. El vacío del frasco de la vacuna hace que el diluyente ingrese fácilmente. Saque la jeringa del frasco
4. Para frascos de 1.000 dosis reconstituya en 200 mL de diluyente y para frascos de 5.000 dosis reconstituya en 1 litro de diluyente.
5. Agite vigorosamente el frasco de la vacuna que esta con el diluyente para rehidratar el polvo liofilizado
6. Utilice la misma aguja y jeringa estéril, transfiera completamente la vacuna rehidratada al frasco de diluyente. Lave la jeringa y el frasco de vacuna retirando el diluyente adicional, repitiendo el proceso
7. Agite vigorosamente la vacuna rehidratada por 20 a 30 segundos para mezclar bien
8. La vacuna está lista para usar.

Como vacunar

Administración *in ovo*

Desinfecte la máquina vacunadora y asegúrese que está correctamente calibrada para entregar 0,05 ml a cada huevo embrionado.

Administración subcutánea

Insertar un tubo de llenado (tubo de transferencia afilado, largo), dentro de la botella de la vacuna. Conecte el tubo de llenado por medio de una tubería plástica o de goma a una vacunadora automática equipada con una aguja de calibre 22 ½. La vacunadora automática debe estar correctamente calibrada, con anticipación, para entregar 0,2 ml.

APROBADO
SAG

09-07-2022

Administración mediante el agua de bebida

- No mezcle la vacuna dentro del agua de bebida hasta que esté lista para usar.
- El agua de bebida para la vacunación debe mezclarse con leche en polvo para prevenir su inactivación por cloro u otros posibles aditivos presentes en el agua, así como también para estabilizar el virus vaccinal. La leche en polvo debe añadirse al agua en una proporción de 3 gramos por 11 litros ó 90 gramos por 300 litros.
- Prive a las aves de agua durante varias horas antes de la vacunación con el fin de que las aves tengan sed. Lave y enjuague bien los bebederos para evitar todo residuo de desinfectante.
- Diluya la vacuna inmediatamente antes de usar, con agua limpia, fresca y sin cloro (con la leche añadida). Vierta la vacuna disuelta dentro de los siguientes volúmenes de agua y mezcle completamente:

Cada 1.000 aves	Litros
1 semana	6,5
2 a 4 semanas	10
4 a 8 semanas	20
8 semanas y más	40



- Distribuya la vacuna diluida de manera que todas las aves puedan beber dentro del período de 1 hora y no añada más agua hasta que se haya consumido completamente la vacuna.
- Evite la exposición directa al sol de la vacuna disuelta en el agua.

d) Contraindicaciones

Ninguna

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico

No se han descrito

f) Advertencia y Precauciones especiales de uso

Vacune solamente aves sanas.

Todas las aves de un grupo deben vacunarse el mismo día. Aísle las aves susceptibles de las aves vacunadas que se encuentren en el mismo galpón.

En caso de brote epidémico, vacune primero las aves sanas, progresando hacia las áreas afectadas a fin de vacunar las aves enfermas en último término.

Mantener fuera del alcance de los niños

g) Uso durante preñez, lactancia, postura y animales reproductores

No aplica.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis

No aplica

j) Período de resguardo

21 días.



k) Precauciones especiales para el operador

Lavarse bien las manos después de haber manipulado la vacuna.

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente que forma parte de la vacuna o con agua de bebida, según corresponda.

b) Período de eficacia

18 meses.

Utilizar el contenido completo una vez abierto el frasco

c) Condiciones de almacenamiento

Mantener refrigerado: entre 2 y 7°C. No congelar.

d) Descripción de los envases

Estuche de cartón impreso, con 10 frascos de vidrio borosilicato tipo I, etiquetados, cerrados con tapón de goma y sello de aluminio, conteniendo 1.000 ó 5.000 dosis. Incluye prospecto interno

Frasco de vidrio borosilicato o PET, etiquetado, cerrado con tapón de goma y sello de aluminio, conteniendo 50, 200, 250 ó 1.000 mL de diluyente.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados

6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

7. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA FABRICANTE, IMPORTADORA Y LICENCIANTE

FABRICADO POR

Intervet Inc., USA.
29160 Intervet Lane,
Millsboro, Delaware 19966, USA
VLN 165A/PCN 1431.5E



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Intervet Chile Limitada.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5.
Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

USO VETERINARIO

REG. SAG N° 664-B