

PRIMUN SALMONELLA E®Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis***Polvo liofilizado para reconstituir Suspension Oral**Documentación Técnica**C. PROYECTO DE ROTULADO GRÁFICO DE ETIQUETAS, ESTUCHES, PROSPECTOS Y FOLLETOS****Estuche con 1 frasco x 1.000, 2.000 o 4.000 dosis****Primun Salmonella E®**Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*

Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral

Leer el inserto antes de usar

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**Composición:**Cada dosis reconstituida contiene *Salmonella enterica*, subsp. *enterica*, serovar Enteritidis, cepa CAL10 Sm+/RIF+/Ssq- (1-6 x 10⁸ ufc) + Excipientes c.s.p. (1 dosis).**Especie de destino:**

Pollas de reemplazo (futuras ponedoras y reproductoras).

APROBADO
SAG
21-11-2023**Indicaciones de uso:**Inmunización activa, para reducir la colonización de los órganos internos (bazo, hígado, ciego y ovarios) y la excreción fecal de cepas de campo de *Salmonella Enteritidis*.

- Establecimiento de la inmunidad: A partir de los 14 días después de la primera dosis y a partir de las 4 semanas tras la 2ª y 3ª dosis.
- Duración de la inmunidad: Hasta 80 semanas después de completar el programa de 3 dosis y hasta 40 semanas después de la cuarta vacunación.

Dosis, vía de administración, modo de empleo, advertencias y precauciones especiales de uso, entre otros: Ver inserto.**Periodo de resguardo:**

Carne: 21 días después de la 1ª, 2ª y 3ª vacunación.

Carne: 14 días después de la 4ª vacunación.

Huevos: Cero días después de la 4ª vacunación.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8 °C. No congelar. Proteger de la luz.

Una vez reconstituida, usar antes de 3 horas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

REGISTRO SAG N°:

**APROBADO
SAG
21-11-2023**

Contenido: 1.000 dosis, 2.000 dosis ó 4.000 dosis.

Fecha Elaboración:

Fecha Vencimiento:

N° Serie:

**REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

Fabricado por:

Laboratorios Calier S.A. c/o. Barcelonés 26, Pla del Ramassà. 08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA, España.

Importado y distribuido por:

AGROVET SpA, Lo Echevers 381, Quilicura. Santiago de Chile.

Bajo licencia de Laboratorios Calier S.A. – España.

Estuche con 10 frascos x 1.000, 2.000 o 4.000 dosis

Primun Salmonella E®

Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*
Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral

Leer el inserto antes de usar

Composición:

Cada dosis reconstituida contiene *Salmonella enterica*, subsp. *enterica*, serovar Enteritidis, cepa CAL10 Sm+/RIF+/Ssq- (1-6 x 10⁸ ufc) + Excipientes c.s.p. (1 dosis).

Especie de destino:

Pollas de reemplazo (futuras ponedoras y reproductoras).

Indicaciones de uso, dosis, vía de administración, modo de empleo, advertencias y precauciones especiales, entre otros: Ver inserto.

Periodo de resguardo:

Carne: 21 días después de la 1ª, 2ª y 3ª vacunación.

Carne: 14 días después de la 4ª vacunación.

Huevos: Cero días después de la 4ª vacunación.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8 °C. No congelar. Proteger de la luz.

Una vez reconstituida, usar antes de 3 horas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

REGISTRO SAG N°:

PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA.

APROBADO
SAG

21-11-2023

Contenido: 10x1.000 dosis, 10x2.000 dosis ó 10x4.000 dosis.

Fecha Elaboración:

Fecha Vencimiento:

N° Serie:

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Fabricado por:

Laboratorios Calier S.A. c/o. Barcelonés 26, Pla del Ramassà. 08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA, España.

Importado y distribuido por:

AGROVET SpA, Lo Echevers 381, Quilicura. Santiago de Chile.

APROBADO
SAG
21-11-2023

Bajo licencia de Laboratorios Calier S.A. – España.

Etiqueta frasco x 1.000, 2.000 o 4.000 dosis

Primun Salmonella E®

Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*
Polvo liofilizado para reconstituir Suspensión Oral

Leer el inserto antes de usar.

Composición:

Cada dosis reconstituida contiene *Salmonella enterica*, subsp. *enterica*, serovar Enteritidis, cepa CAL10 Sm+/RIF+/Ssq- (1-6 x 10⁸ ufc) + Excipientes c.s.p. (1 dosis).

Especie de destino:

Pollas de reemplazo (futuras ponedoras y reproductoras).

Indicaciones de uso, dosis, vía de administración, modo de empleo, advertencias y precauciones especiales, entre otros: Ver inserto.

Periodo de resguardo:

Carne: 21 días después de la 1ª, 2ª y 3ª vacunación.

Carne: 14 días después de la 4ª vacunación.

Huevos: Cero días después de la 4ª vacunación.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8 °C. No congelar. Proteger de la luz.

Una vez reconstituida, usar antes de 3 horas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

APROBADO
SAG

21-11-2023

REGISTRO SAG N°:

Contenido: 1.000 dosis, 2.000 dosis ó 4.000 dosis.

Fecha Elaboración: Fecha
Vencimiento: N° Serie:

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Fabricado por:

Laboratorios Calier S.A. c/o. Barcelonés 26, Pla del Ramassà. 08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA, España.

Importado y distribuido por:

AGROVET SpA, Lo Echevers 381, Quilicura. Santiago de Chile.

APROBADO
SAG
21-11-2023

Bajo licencia de Laboratorios Calier S.A. – España.

Inserto

Primun Salmonella E®

Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*

Polvo liofilizado para reconstituir Suspensión Oral

Composición:

Cada dosis reconstituida contiene:

<i>Salmonella enterica</i> , subsp. <i>enterica</i> , serovar Enteritidis, cepa CAL10 Sm+/RIF+/Ssq-	1-6 x 10 ⁸ ufc
Excipientes c.s.p.	1 dosis

Especie de destino:

Pollas de reemplazo (futuras ponedoras y reproductoras).

APROBADO
SAG
21-11-2023

Indicaciones de uso:

Inmunización activa, para reducir la colonización de los órganos internos (bazo, hígado, ciego y ovarios) y la excreción fecal de cepas de campo de *Salmonella Enteritidis*.

- Establecimiento de la inmunidad: a partir de los 14 días después de la primera dosis y a partir de las 4 semanas tras la 2ª y 3ª dosis.
- Duración de la inmunidad: hasta 80 semanas después de completar el programa de 3 dosis y hasta 40 semanas después de la cuarta vacunación.

Dosis, vía de administración y modo de empleo:

Dosis: Debe administrarse una dosis de vacuna por cada ave.

Vía de administración: Oral, en el agua de bebida.

Posología:

El esquema de vacunación considera 3 dosis:

Primera dosis: 1er día de edad (durante las 36 primeras horas de vida).

Segunda dosis: 6 – 8 semanas de edad.

Tercera dosis: 15 – 20 semanas de edad (al menos 3 semanas antes del inicio de la postura).

Se puede aplicar una cuarta dosis durante el periodo de la postura, a las 55 semanas para reducir la colonización del ciego y la excreción de las cepas de campo.

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Modo de empleo:

- Asegúrese que todas las conducciones, tuberías, comederos, bebederos, etc., están minuciosamente limpios y libres de restos de desinfectantes, detergentes, jabones, etc.
- Utilice sólo agua de bebida fresca, libre de cloro y de iones metálicos.
- Abrir el frasco de vacuna sumergido en agua y disolver completamente el contenido en un recipiente de 1 litro lleno hasta la mitad y mezclar bien antes de añadir más agua. La vacuna concentrada es ligeramente viscosa, por lo cual es necesario asegurarse de vaciar el frasco y su tapa completamente, enjuagándolos con agua.
- Después añadir agua hasta un 1 litro en el mismo recipiente y agitar bien antes de efectuar la mezcla con más agua. La vacuna debe agitarse intensamente durante varios minutos en cada fase. Los viales grandes no deben dividirse para vacunar a más de un corral o sistema de bebederos, ya que esto conlleva errores de mezcla.
- Como guía general, añadir la vacuna diluida en agua fresca y fría a razón de 1 litro de agua por cada 1000 aves por día de edad, para aves de 6-8 semanas: 25-35 litros para 1000 aves, para aves de 15-20 semanas: 35-40 litros para 1000 aves y para aves de 55 semanas de edad: al menos 60 litros de agua para 1000 aves.
- Utilizar sistemas de marcaje de los niveles de agua para el día anterior, a fin de determinar con exactitud la correcta cantidad de agua en cada caso.
- Todas las conducciones deben estar libres de agua normal para que los bebederos contengan exclusivamente suspensión de vacuna.
- El agua de los bebederos debe consumirse antes de la vacunación para que los niveles de agua en éstos sean mínimos antes de la aplicación de la vacuna. Si todavía queda agua, las conducciones deben vaciarse antes de la aplicación de la solución de vacuna. El agua con vacuna debe aplicarse en un plazo de hasta 3 horas. Debe garantizarse que todas las aves beban durante esta fase. Dado que el comportamiento de bebida de las aves varía, puede ser necesario retirar el agua de bebida en algunos sitios antes de la vacunación para garantizar que todas las aves beban durante la fase de vacunación. El objetivo es suministrar una dosis de vacuna a cada una de las aves. A tal efecto, puede ser necesario un periodo de privación de bebida de hasta 2-3 horas antes de la vacunación.

Contraindicaciones:

No usar en aves enfermas.

No utilizar dentro de 3 semanas previo al inicio de postura

Efectos adversos o reacciones adversas:

No se han descrito.

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-11-2023

Advertencias y precauciones especiales de uso:**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Vacunar solo animales clínicamente sanos con buena condición nutricional.

La diferenciación entre la cepa vacunal y las cepas de campo se realiza mediante un antibiograma.

A diferencia de las cepas de campo, la cepa de la vacuna es sensible a eritromicina (concentración recomendada 15-30 µg/mL) y resistente a estreptomicina y rifampicina (concentración recomendada 200 µg/mL)

Dependiendo del método analítico utilizado, la vacunación oral puede dar lugar a reacciones seropositivas de baja intensidad en aves individuales dentro de una bandada. Dado que la monitorización serológica de Salmonella es un análisis de la bandada, los hallazgos positivos deben confirmarse, por ejemplo, recurriendo a la bacteriología.


La cepa vacunal puede propagarse a aves susceptibles en contacto con las vacunadas. Las aves vacunadas pueden eliminar la cepa vacunal hasta 14 días después de la vacunación.

Deben adoptarse las medidas veterinarias y de manejo pertinentes para evitar la propagación de la cepa vacunal a especies susceptibles.

No se ha ensayado en aves ornamentales ni en las de pura raza.

Uso durante postura:

Puede utilizarse durante la postura.

**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

La cepa vacunal es sensible a las Quinolonas, Eritromicina y Doxiciclina, por lo cual deberá evitarse el uso simultáneo de estos antimicrobianos. Si esta situación es inevitable, el lote tratado debe re-inmunizarse. Esta vacuna puede administrarse 3 días antes o después del uso de los antimicrobianos antes señalados.

**Sobredosis:**

No se observaron reacciones adversas después de aplicar una dosis 10 veces mayor a la permitida.

Periodo de resguardo:

Carne: 21 días después de la 1ª, 2ª y 3ª vacunación. Carne: 14 días después de la 4ª vacunación.

Huevos: Cero días después de la 4ª vacunación.

Incompatibilidades:

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico. El agua utilizada para resuspender y diluir la vacuna debe estar libre de detergentes y desinfectantes

Precauciones especiales para el manipulador:

Usar un equipo de protección individual consistente en guantes al manipular el medicamento veterinario. El frasco debe abrirse sumergido en agua para evitar los aerosoles.

Después de manipular la vacuna deben desinfectarse y lavarse las manos.

No ingerir. En caso de ingestión accidental consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

La cepa de la vacuna es sensible a algunos antibióticos incluyendo quinolonas (ciprofloxacina). Se debe tener precaución y lavarse y desinfectarse las manos después de manipular las heces de las aves vacunadas, en particular durante los primeros 14 días después de la vacunación. Se aconseja a las personas inmunodeprimidas que eviten todo contacto con la vacuna y los animales vacunados durante la manipulación y 28 días después de la vacunación.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar:

Se recomienda utilizar todo el contenido del envase una vez abierto. No conservar frascos con remanente de producto no utilizado. Para eliminar los envases y desechos se recomienda la incineración.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: entre 2 y 8 °C. No congelar. Proteger de la luz. Una vez reconstituida, usar antes de 3 horas.

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Presentaciones:

Estuche de cartón con 1 vial de 1.000 dosis, 2.000 dosis ó 4.000 dosis. Caja de cartón con 10 viales x 1.000 dosis, 2.000 dosis ó 4.000 dosis. Cada presentación contiene un inserto.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Venta bajo Receta MédicVeterinaria.**USO VETERINARIO****REGISTRO SAG N°:**

APROBADO
SAG
21-11-2023

Fabricado por:

Laboratorios Calier S.A. c/o. Barcelonés 26, Pla del Ramassà. 08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA, España.

Importado y distribuido por:

AGROVET SpA, Lo Echevers 381, Quilicura. Santiago de Chile.

Bajo licencia de Laboratorios Calier S.A. – España.

PRIMUN SALMONELLA E®
(Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*)
Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral

Documentación Técnica

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre de fantasía:** Primun Salmonella E®
- b) **Nombre genérico:** Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*.
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo liofilizado para reconstituir Suspensión Oral.

2. Composición:

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Cada dosis reconstituida contiene:

Nombre del componente	Cantidad
<i>Salmonella enterica</i> , subsp. <i>enterica</i> , serovar Enteritidis, cepa CAL10 Sm+/RIF+/Ssq-	1-6 x 10 ⁸ ufc
Excipientes c.s.p.	1 dosis

3. Propiedades inmunológicas:

Para estimular la inmunidad activa contra *Salmonella Enteritidis*.

4. Particularidades clínicas:

a. Especie(s) de destino y subcategoría:

Pollos de reemplazo (futuras ponedoras y reproductoras).

APROBADO
SAG
21-11-2023

b. Indicación(es) de uso:

Inmunización activa, para reducir la colonización de los órganos internos (bazo, hígado, ciego y ovarios) y la excreción fecal de cepas de campo de *Salmonella Enteritidis*.

- Establecimiento de la inmunidad: A partir de los 14 días después de la primera dosis y a partir de las 4 semanas tras la 2ª y 3ª dosis.
- Duración de la inmunidad: Hasta 80 semanas después de completar el programa de 3 dosis y hasta 40 semanas después de la cuarta dosis.

PRIMUN SALMONELLA E[®]
(Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*)
Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral

Documentación Técnica

c. Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía(s) de administración y modo de empleo:

- **Dosis:** Debe administrarse una dosis de vacuna por cada ave.

- **Posología:**

El esquema de vacunación considera 3 dosis:

Primera dosis: 1er día de edad (durante las 36 primeras horas de vida).

Segunda dosis: 6 – 8 semanas de edad.

Tercera dosis: 15 – 20 semanas de edad (al menos 3 semanas antes del inicio de la postura).

Se puede aplicar una cuarta dosis durante el periodo de la postura, a las 55 semanas para reducir la colonización del ciego y la excreción de las cepas de campo.

- **Edad o peso:** A partir del primer día de edad.
- **Condición fisiológica:** Animales sanos.
- **Vía(s) de administración:** Oral, en el agua de bebida.
- **Modo de empleo:**

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-11-2023

Administración en agua de bebida:

Asegúrese de que todas las conducciones, tuberías, comederos, bebederos, etc., están minuciosamente limpios y libres de restos de desinfectantes, detergentes, jabones, etc.

Utilice sólo agua de bebida fresca, libre de cloro y de iones metálicos.

Abrir el frasco de vacuna sumergido en agua y disolver completamente el contenido en un recipiente de 1 litro lleno hasta la mitad y mezclar bien antes de añadir más agua. La vacuna concentrada es ligeramente viscosa, por lo cual es necesario asegurarse de vaciar el frasco y su tapa completamente, enjuagándolos con agua.

Después añadir agua hasta un 1 litro en el mismo recipiente y agitar bien antes de efectuar la mezcla con más agua. La vacuna debe agitarse intensamente durante varios minutos en cada fase. Los viales grandes no deben dividirse para vacunar a más de un corral o sistema de bebederos, ya que esto conlleva errores de mezcla.

Como guía general, añadir la vacuna diluida en agua fresca y fría a razón de 1 litro de agua por cada 1000 aves por día de edad, para aves de 6-8 semanas: 25-35 litros para 1000 aves,

PRIMUN SALMONELLA E[®]
(Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*)
Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral

Documentación Técnica

para aves de 15-20 semanas: 35-40 litros para 1000 aves y para aves de 55 semanas de edad: al menos 60 litros de agua para 1000 aves.

Utilizar sistemas de marcaje de los niveles de agua para el día anterior, a fin de determinar con exactitud la correcta cantidad de agua en cada caso.

Todas las conducciones deben estar libres de agua normal para que los bebederos contengan exclusivamente suspensión de vacuna.

El agua de los bebederos debe consumirse antes de la vacunación para que los niveles de agua en éstos sean mínimos antes de la aplicación de la vacuna. Si todavía queda agua, las conducciones deben vaciarse antes de la aplicación de la solución de vacuna. El agua con vacuna debe aplicarse en un plazo de hasta 3 horas. Debe garantizarse que todas las aves beban durante esta fase. Dado que el comportamiento de bebida de las aves varía, puede ser necesario retirar el agua de bebida en algunos sitios antes de la vacunación para garantizar que todas las aves beban durante la fase de vacunación. El objetivo es suministrar una dosis de vacuna a cada una de las aves. A tal efecto, puede ser necesario un periodo de privación de bebida de hasta 2-3 horas antes de la vacunación.

d. Contraindicaciones:

No usar en aves enfermas.

No utilizar dentro de 3 semanas previo al inicio de postura.

**APROBADO
SAG
21-11-2023**

e. Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:

No se han descrito.

**REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

f. Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Vacunar solo animales clínicamente sanos con buena condición nutricional.

PRIMUN SALMONELLA E[®]
(Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*)
Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral

Documentación Técnica

La diferenciación entre la cepa vacunal y las cepas de campo se realiza mediante un antibiograma. A diferencia de las cepas de campo, la cepa de la vacuna es sensible a eritromicina (concentración recomendada 15-30 µg/ml) y resistente a estreptomicina y rifampicina (concentración recomendada 200 µg/ml).

Dependiendo del método analítico utilizado, la vacunación oral puede dar lugar a reacciones seropositivas de baja intensidad en aves individuales dentro de una bandada. Dado que la monitorización serológica de *Salmonella* es un análisis de la bandada, los hallazgos positivos deben confirmarse, por ejemplo, recurriendo a la bacteriología.

La cepa vacunal puede propagarse a aves susceptibles en contacto con las vacunadas. Las aves vacunadas pueden eliminar la cepa vacunal hasta 14 días después de la vacunación.

Deben adoptarse las medidas veterinarias y de manejo pertinentes para evitar la propagación de la cepa vacunal a especies susceptibles.

No se ha ensayado en aves ornamentales ni en las de pura raza.

g. Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

Puede utilizarse durante la postura.

**APROBADO
SAG**
21-11-2023

h. Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

La cepa vacunal es sensible a las Quinolonas, Eritromicina y Doxiciclina, por lo cual deberá evitarse el uso simultáneo de estos antimicrobianos. Si esta situación es inevitable, el lote tratado debe re-inmunizarse.

Esta vacuna puede administrarse 3 días antes o después del uso de los antimicrobianos antes señalados.

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

PRIMUN SALMONELLA E®
(Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*)
Polvo liofilizado para reconstituir suspension oral

Documentación Técnica

i. Sobredosis:

No se observaron reacciones adversas después de aplicar una dosis 10 veces mayor a la permitida.

REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

j. Periodo de resguardo:

Carne: 21 días después de la 1ª, 2ª y 3ª vacunación.

Carne: 14 días después de la 4ª vacunación.

Huevos: Cero días después de la 4ª vacunación.

APROBADO
SAG
21-11-2023

k. Precauciones especiales para el manipulador:

Usar un equipo de protección individual consistente en guantes al manipular el medicamento veterinario.

El frasco debe abrirse sumergido en agua para evitar los aerosoles.

Después de manipular la vacuna deben desinfectarse y lavarse las manos.

No ingerir. En caso de ingestión accidental consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

La cepa de la vacuna es sensible a algunos antibióticos incluyendo quinolonas (ciprofloxacina).

Se debe tener precaución y lavarse y desinfectarse las manos después de manipular las heces de las aves vacunadas, en particular durante los primeros 14 días después de la vacunación. Se aconseja a las personas inmunodeprimidas que eviten todo contacto con la vacuna y los animales vacunados durante la manipulación y 28 días después de la vacunación.

5. Particularidades farmacéuticas:

a. Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado:

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico. El agua utilizada para resuspender y diluir la vacuna debe estar libre de detergentes y desinfectantes.

PRIMUN SALMONELLA E[®]
(Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*)
Polvo liofilizado para reconstituir suspension oral

Documentación Técnica

- b. Periodo de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda:**

24 meses.

Estabilidad después de su reconstitución: 3 horas.

**APROBADO
SAG
21-11-2023**

- c. Condiciones de almacenamiento:**

Mantener refrigerado: entre 2 y 8 °C. No congelar. Proteger de la luz.

- d. Descripción de los envases:**

Estuche de cartón impreso, con 1 frasco de vidrio tipo I, etiquetado, cerrado con tapón de goma de clorobutilo y precinto de aluminio, conteniendo 1.000, 2.000 o 4.000 dosis. Incluye prospecto interno.

Caja de cartón impreso, con 10 frascos de vidrio tipo I, etiquetados, cerrados con tapón de goma de clorobutilo y precinto de aluminio, conteniendo 1.000, 2.000 o 4.000 dosis. Incluye prospecto interno.

- e. Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere:**

Se recomienda utilizar todo el contenido del envase una vez abierto. No conservar frascos con remanente de producto no utilizado. Para eliminar los envases y desechos se recomienda la incineración.

**REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

- 6. Condición de venta:**

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRIMUN SALMONELLA E[®]
(Vacuna viva contra *Salmonella enteritidis*)
Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral

Documentación Técnica

7. **Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda:**

Fabricado por Laboratorios Calier S.A.

c/o. Barcelonés 26, Pla del Ramassà.

08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA, España.

Importado y distribuido por AGROVET SpA

Lo Echevers 381, Quilicura.

Santiago de Chile.

Bajo licencia de Laboratorios Calier S.A. – España.

**APROBADO
SAG
21-11-2023**

8. **Otra información:**

USO VETERINARIO

**REGISTRO SAG N° 2607-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

REGISTRO SAG N°: