

# CEVAC® MASS L

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa,  
Cepa Mass B48  
Para la inmunización activa de pollos

20x 1000 dosis

00000



**CEVAC® MASS L**  
**20 x 1000 dosis**

STD 730

**Producido por:** Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.5. Hungría.

**Importado y distribuido por:**

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia. Reg. SAG Nº: 299-B

**En Ecuador:** Representado por Rebexa S.A. El Calzado Calle S12 N°OE-495 y Calle: OE2L-Quito Reg. No: 4A-8514-AGROCALIDAD

Fecha de Fab.:

Serie n°:

Fecha de Exp.:

**APROBADO  
SAG**

**17-01-2026**

**En Perú:** Ceva Salud Animal S.A.C., Lima. Reg. SENASA No.: B.01.1.011.0609

**En Venezuela:** Ceva Salud Animal C.A. J-29606988-3 / Productos Swissagro C.A. J-30310874-1. Reg. B.I. 10-239.

Asesor Técnico M.V. Nerina Alliegro

**En Argentina:** Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N. Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Atención al Cliente 0800-333-7888 - info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente (en Argentina).



**SENASA** Certificado N°: 15-030

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48.....  $\geq 10^{2.8}$  EID<sub>50</sub>

Excipientes.....csp 1 dosis

Administración en el agua de consumo, por vía intraocular, o mediante aspersión.

#### ADVERTENCIA

Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después de la reconstitución. Rechazar el producto si el sello está deteriorado.

Ver información detallada en el prospecto.

**ALMACENAMIENTO:** Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

**PERÍODO DE RESGUARDO:** 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

En Argentina, Ecuador y Chile: Venta bajo receta médico veterinaria.

En Venezuela: Venta bajo prescripción del medico veterinario.

Venta exclusiva al profesional veterinario.

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

STD 510

# CEVAC® MASS L

**APROBADO  
SAG**

17-01-2026

Vacuna viva contra  
Bronquitis Infecciosa,  
Cepa Mass B48

**1000 dosis**



Polvo Liofilizado.

**Administración:** en gotas oftálmicas,  
mediante aspersión o en el agua de consumo.

**Almacenamiento:** entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

**Advertencia:** Utilizar todo el contenido del frasco de una  
sola vez. Ver instrucciones completas en el prospecto.

**USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

Reg. SAG N°: 299-B ; Reg. No.: 4A-8514-AGROCALIDAD

Reg. SENASA No.: B.01.1.01.1.0609 ; Reg. No.: B.I. 10.239

Importador y Distribuidor: En Argentina: Ceva Salud

Animal SRL - SENASA Certificado N°: 15-030

00000 - Producido por:  
Ceva-Phytaxia, Hungría

Fab.:

Serie No.:

Exp.:

# CEVAC® MASS L

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa,  
Cepa Mass B48  
Para la inmunización activa de pollos

20x 2500 dosis



A3289-01

CEVAC® MASS L  
20 x 2500 dosis

STD 730

Producido por: Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.5. Hungría.

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia. Reg. SAG N°: 299-B

En Ecuador: Representado por Rebexa S.A. El Calzado Calle S12 N°OE-495 y Calle: OE2L-Quito Reg.No: 4A-8514-AGROCALIDAD

Fecha de Fab.:

Serie n°:

Fecha de Exp.:

APROBADO  
SAG

17-01-2026

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Lima. Reg. SENASA No.: B.01.1.01.1.0609

En Venezuela: Ceva Salud Animal C.A. J-29606988-3 / Productos Swissagro C.A. J-30310874-I. Reg. B.I. 10-239.

Asesor Técnico M.V. Nerina Alliegro

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N. Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Atención al Cliente 0800-333-7888 - info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente (en Argentina).



SENASA Certificado N°: 15-030

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48 .....  $\geq 10^{2.8}$  EID<sub>50</sub>

Excipientes ..... csp 1 dosis

Administración en el agua de consumo, por vía intraocular, o mediante aspersión.

## ADVERTENCIA

Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después de la reconstitución.

Rechazar el producto si el sello está deteriorado.

Ver información detallada en el prospecto.

**ALMACENAMIENTO:** Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

**PERÍODO DE RESGUARDO:** 0 días.

**En Chile: prohibida la venta fraccionada.**

**En Argentina, Ecuador y Chile: Venta bajo receta médico veterinaria.**

**En Venezuela: Venta bajo prescripción del médico veterinario.**

**Venta exclusiva al profesional veterinario.**

## USO VETERINARIO

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

STD 510

# CEVAC® MASS L

APROBADO  
SAG

17-01-2026

Vacuna viva contra  
Bronquitis Infecciosa,  
Cepa Mass B48

**2500** dosis



Polvo Liofilizado.

**Administración:** en gotas oftálmicas,  
mediante aspersión o en el agua de consumo.

**Almacenamiento:** entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

**Advertencia:** Utilizar todo el contenido del frasco de  
una sola vez. Ver instrucciones completas en el prospecto.

**USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

Reg. SAG N°: 299-B ; Reg. No.: 4A-8514-AGROCALIDAD

Reg. SENASA No.: B.01.1.01.1.0609 ; Reg. No.: B.I. 10.239

Importador y Distribuidor: En Argentina: Ceva Salud

Animal SRL - SENASA Certificado N°: 15-030

A3288-01 - Producido por:  
Ceva-Phylaxia, Hungría

Fab.:

Serie No.:

Exp.:

# CEVAC<sup>®</sup> MASS L

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa,  
Cepa Mass B48  
Para la inmunización activa de pollos

20x 5000 dosis



AI057-02

CEVAC<sup>®</sup> MASS L  
20 x 5000 dosis

STD 730

Producido por: Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals Co. Ltd.  
1107 Budapest, Szállás u.5. Hungría.

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669 Of.  
801, Las Condes, Santiago. Bajo licencia de Ceva Santé Animale,  
Francia. Reg. SAG N°: 0299-B

En Ecuador: Representado por Rebexa S.A. El Calzado S12 No. OE2-  
495 y Calle OE2L - Quito - Reg. No.: 4A-8514-AGROCALIDAD.

Fecha de Fab.:

Serie n°:

Fecha de Exp.:

APROBADO  
SAG  
17-01-2026

En Peru: Ceva Salud Animal SAC. SENASA B.01.8.01.1.1151

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. - BOLIVIA SENASAG Reg. PUV-N° 006973/16

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N. Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) Buenos Aires. Centro  
Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Atención al Cliente 0800-333-7888 - info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente (en Argentina).



SENASA Certificado N°: 15-030

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48.....  $\geq 10^{2.8}$  EID<sub>50</sub>

Excipientes .....csp 1 dosis

Administración en el agua de consumo, por vía intraocular, o mediante aspersión.

**ADVERTENCIA:** Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después de la reconstitución. Rechazar el producto si el sello está deteriorado. Ver información detallada en el prospecto.

**ALMACENAMIENTO:** Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

**PERÍODO DE RESGUARDO:** 0 días.

**En Chile: prohibida la venta fraccionada.**

**En Ecuador, Argentina, Chile y Perú: Venta bajo receta médico veterinaria.**

**Venta exclusiva al profesional veterinario.**

**USO VETERINARIO**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

STD 510

# CEVAC® MASS L

**APROBADO  
SAG**

17-01-2026

Vacuna viva contra  
Bronquitis Infecciosa,  
Cepa Mass B48

**5000 dosis**



Polvo Liofilizado.

**Administración:** en gotas oftálmicas,  
mediante aspersión o en el agua de consumo.

**Almacenamiento:** entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

**Advertencia:** Utilizar todo el contenido del frasco de  
una sola vez. Ver instrucciones completas en el prospecto.

**USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

Reg. SAG N°: 0299-B ; Reg. No.: 4A-8514-AGROCALIDAD ;  
Reg. SENASA No.: - BOLIVIA SENASAG Reg. PUV-N  
006973/16

Importador y Distribuidor: En Argentina: Ceva Salud Animal  
SRL - SENASA Certificado N°: 15-030

Colombia 10056-BV - Perú SENASA B.01.B.01.L1151

A1066-03 - Producido por:  
Ceva-Phylaxia, Hungría  
Fab.:

Serie No.:

Exp.:



# CEVAC® MASS L

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa,  
Cepa Mass B48  
Para la inmunización activa de pollos

APROBADO  
SAG

17-01-2026

## COMPOSICIÓN

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48 .....  $\geq 10^{2.8}$  EID<sub>50</sub>  
Excipientes ..... csp 1 dosis

## INDICACIONES DE USO

Para la inmunización activa de pollos sanos para prevenir la Bronquitis Infecciosa, a partir del 1º día de edad. La vacuna puede ser utilizada para vacunación inicial o revacunación de pollos, pollas y gallinas.

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

La vacunación primaria debe llevarse a cabo con CEVAC® MASS L administrada en gotas intraoculares o mediante aspersión desde 1 a 4 días de edad. La vacunación de refuerzo se recomienda tres o cuatro semanas después mediante aspersión o en el agua de consumo. En las pollas se recomienda un segundo refuerzo, a las 10-12 semanas de edad.

### Método de administración en gotas intraoculares

Llenar el frasco de la vacuna con el diluyente hasta 3/4 del volumen total para disolver la vacuna liofilizada. Verter y diluir la suspensión en el diluyente restante contenido en el frasco plástico, utilizando el cuentagotas. Esta preparación de la vacuna debe hacerse con aguja y jeringa estériles. 30 ml de diluyente deben alcanzar para administrar 1.000 dosis (0.03 mL/dosis). Sostenga el ave por vacunar con la cabeza inclinada hacia un lado. Sostenga el frasco plástico con la punta del cuentagotas hacia abajo y presione suavemente los lados, aplicando 0,03 mL (una gota) de vacuna en el ojo del ave. Asegúrese que la vacuna se haya reabsorbido antes de liberar al ave.

### Método de aspersión

Utilizando agua destilada estéril, reconstituir la vacuna como se explicó en el método de gotas intraoculares. Es preferible utilizar una máquina aspersora que funcione bajo presión constante, colocando una boquilla que produzca partículas de tamaño adecuado (según las recomendaciones del fabricante), y graduando la presión para obtener una lluvia gruesa. El volumen utilizado varía de 0.2 a 0.3 litros/1.000 pollos de 1 día de edad encasetaados, o de 0.5 a 1 litro/1.000 pollos sobre cama. El volumen puede variar según las condiciones atmosféricas. Los pollos deben quedar ligeramente mojados después de la vacunación.

Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día, apagando la calefacción y la ventilación. Agrupar los pollos en el suelo o en cajas. Reduzca la iluminación y fúmguelos a una altura de 20 a 30 cm sobre sus cabezas. Repetir la aspersión por segunda vez. Después de vacunar, deje quietos los animales durante 15 minutos. Active la ventilación y encienda calefacción.

### Administración en el agua de consumo

Se recomienda no utilizar desinfectantes en el agua de consumo desde 48 horas antes hasta 24 horas después de la vacunación. Cuando se utilice una bomba de cloro, apagarla durante este mismo período de tiempo.

Los bebederos deben limpiarse completamente antes de utilizarlos para la vacunación. Para la limpieza no se deben utilizar desinfectantes. Cerrar el sistema de distribución de agua, levantar y desocupar las líneas dispensadoras o vaciar los bebederos. El período de retención del agua varía en concordancia con la edad de los pollos por vacunar y las condiciones climáticas (promedio 1.5 horas). Preparar únicamente la cantidad de vacuna que se va a utilizar inmediatamente. Utilizar únicamente materiales y utensilios de plástico para la preparación y administración de la vacuna. Preparar la cantidad requerida de agua que será



consumida por las aves en dos horas. Este volumen puede variar; dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales.

|                                         |              |                       |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Edad                                    | 3-4 semanas  | Después de 10 semanas |
| Cantidad mínima de agua para 1.000 aves | 25-30 litros | 40 litros             |

Como ayuda para preservar la actividad del virus, neutralizar el cloro con 2.5 g de leche descremada en polvo por litro de agua. No utilizar agua con altas concentraciones de iones metálicos. Mezclar la vacuna con agua limpia, fresca y no clorada, abriendo los viales bajo el agua y dejando estabilizar la mezcla durante 10 minutos. Abrir el sistema de hidratación cuando cambie el color del agua (azulada), bajar las líneas y verificar la distribución en todo el galpón. Cuando el tanque esté vacío, llenarlo con una solución de leche descremada en polvo, dejarlo reposar durante 10 minutos y abrir el sistema de irrigación para hidratar la solución de la vacuna remanente en las mangueras. La suspensión de vacuna también puede ser distribuida manualmente por los operarios, utilizando recipientes plásticos.

**PRECAUCIONES GENERALES**

Solamente en aves sanos puede obtenerse protección satisfactoria. Se debe redondear el número de dosis aproximándolo al millar más cercano (ej: 20.000 en vez de 19.450 aves); no trate de aumentar la dosis. Todas las aves de un lote deben ser vacunadas al mismo tiempo. Administrar la vacuna en la hora más fresca del día. Después de la vacunación, desechar todos los contenedores que hayan sido abiertos, siguiendo las recomendaciones de las regulaciones nacionales o locales. El almacenamiento o el manejo inadecuado de la vacuna puede resultar en pérdida de su potencia.

**EFFECTOS SECUNDARIOS**

Rara vez se observan síntomas respiratorios gripales 4 a 6 días después de la vacunación, pero desaparecen a los pocos días.

**ALMACENAMIENTO:** Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

**PRESENTACIÓN:** Viales de 1.000, 2.500 y 5.000 dosis

En Argentina y Chile: Venta bajo receta médico veterinaria  
Venta exclusiva al profesional veterinario

**USO VETERINARIO**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**  
**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**  
**VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN DEL MEDICO VETERINARIO**

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. | 107 Budapest, Hungría.

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago.  
Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 299-B

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. América - Quito  
Reg. No.: 4A-8514-AGROCALIDAD

Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Calle José Gonzales 681, Miraflores, Lima.  
Reg. SENASA No.: B.01.1.01.1.0609

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741  
Reg. MAT-SASA No.: B.I. 10.239

Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N. Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.  
Atención al Cliente 0800-333-7888 - info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

APROBADO  
SAG

17-01-2026

# DILUYENTE ESTÉRIL PARA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE GOTA EN OJO

Uso Veterinario



**30 ML**

## PARA USO EN LAS SIGUIENTES VACUNAS

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Cevac Ceva® Mass L     | Reg. SAG 299-B  |
| 2. Cevac Ceva® BI L       | Reg. SAG 405-B  |
| 3. Cevac Ceva® Bron 120 L | Reg. SAG 1662-B |

**APROBADO  
SAG**

**17-01-2026**

Usar el contenido completo de una vez

Almacenar entre 5 y 25° C

Contenido: 30 ml para 1000 dosis

Fabricado por Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Company Ltd.,  
Hungría.

Importado y distribuido por Ceva Salud Animal Chile SpA  
bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia

Serie:

Venc :



## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

### 1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** CEVAC CEVA® Mass L
- b) **Nombre Genérico:** Vacuna viva Bronquitis Infecciosa, Mass B48
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo Liofilizado

### 2. Composición

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48

$\geq 10^{2.8}$  EID<sub>50</sub>

Excipientes csp

1 dosis

### 3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la Bronquitis Infecciosa

### 4. Particularidades clínicas

- a) **Especies de destino y subcategoría:** Pollos Broilers, Pollos/Pollas de reemplazo de reproductores, Pollas de reemplazo y Reproductores
- b) **Indicaciones de uso:**  
Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Bronquitis Infecciosa producida por el virus tipo Mass
- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo:**  
**Posología:**  
Vacunación primaria entre 1-4 días de edad por vía intraocular.  
Aplicar un refuerzo 3-4 semanas después mediante aspersión o agua de bebida.  
En las pollas, se recomienda un segundo refuerzo a las 10-12 semanas de edad  
**Edad o peso:**  
A partir del 1-4 día de edad.  
**Condición fisiológica**  
Aves sanas  
**Vía de administración:**  
Intraocular, aspersión, oral (agua de bebida)  
**Modo de empleo**

APROBADO  
SAG  
17-01-2026

#### Vacunación intraocular:

- Llenar el frasco de la vacuna con el diluyente hasta  $\frac{3}{4}$  del volumen total para disolver la vacuna liofilizada.
- Verter y diluir la suspensión de la vacuna en el diluyente restante contenido en el frasco plástico, utilizando el cuentagotas.
- Esta preparación de la vacuna debe hacerse con aguja y jeringa estéril.
- 30 mL de diluyente deben alcanzar para administrar 1000 dosis (0.03 mL/dosis).



- Sostenga el ave por vacunar con la cabeza inclinada hacia un lado.
- Sostenga el frasco plástico con la punta del cuentagotas hacia abajo y presione suavemente los lados, aplicando 0.03 mL (una gota) de vacuna en el ojo del ave. Asegúrese que la vacuna se haya reabsorbido antes de liberar al ave.

#### **Vacunación mediante aspersión:**

- Utilizando agua destilada estéril, reconstituir la vacuna como se explicó en el método de administración en gotas intraoculares.
- Es preferible usar una maquina aspersora que funcione bajo presión constante, colocando una boquilla que produzca partículas de tamaño adecuado (según las recomendaciones del fabricante), y graduando la presión para obtener una lluvia gruesa. El volumen utilizado varía de 0.2 a 0.3 litros/1000 pollos de días de edad en una caja y de 0.5 a 1 litro por cada 1000 pollos en cama.
- El volumen puede variar según las condiciones atmosféricas.
- Las aves deben quedar ligeramente mojadas después de la vacunación.
- Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día, apagando la calefacción e interrumpiendo la ventilación.
- Agrupar las aves en el suelo o en cajas. Reduzca la iluminación y fumígueles a una altura de 20-30 cm sobre sus cabezas.
- Repetir la aspersión una vez más.
- Dejar las aves en reposo durante por lo menos 15 minutos después de la vacunación. Active la ventilación y encienda la calefacción.

#### **Vacunación oral (mediante agua de bebida)**

- Se recomienda no utilizar desinfectantes en el agua de consumo desde 48 horas antes hasta 24 horas después de la vacunación. Cuando se utilice una bomba de cloro, apagarla durante este mismo periodo de tiempo.
- Los bebederos deben limpiarse completamente antes de utilizarlos para la vacunación. Para la limpieza no deben utilizarse desinfectantes.
- Cerrar el sistema de distribución de agua, levantar y desocupar las líneas dispensadoras o vaciar los bebederos.
- El periodo de retención del agua varía en concordancia con la edad de los pollos por vacunar y las condiciones climáticas (promedio 1.5 horas).
- Preparar únicamente la cantidad de vacuna que se va a utilizar inmediatamente.
- Utilizar únicamente materiales y utensilios de plástico para la preparación y administración de la vacuna.
- Preparar la cantidad requerida de agua que será consumida por las aves en dos horas. Este volumen puede variar, dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales.

| Edad                                     | 3-4 semanas  | Después de 10 semanas |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Cantidad mínima de agua para 1000 pollos | 25-30 litros | 40 litros             |

- Como ayuda para preservar la actividad del virus, neutralizar el cloro con 2.5 g de leche descremada en polvo por litro de agua.

**APROBADO**  
**SAG**  
**17-01-2026**



- No utilizar agua con altas concentraciones de iones metálicos.
- Mezclar la vacuna con agua limpia, fresca y no clorada, abriendo los viales bajo el agua y dejando estabilizar la mezcla durante 10 minutos.
- Abrir el sistema de hidratación cuando cambie el color de agua (azulosa), bajar las líneas y verificar la distribución en todo el galpón.
- Cuando el tanque este vacío, llenarlo con una solución de leche descremada en polvo, dejarlo reposar 10 minutos y abrir el sistema de irrigación para hidratar la solución de la vacuna remanente en las mangueras.
- La suspensión de la vacuna también puede ser distribuida manualmente por los operarios, utilizando recipientes plásticos.

d) **Contraindicaciones:**

No administrar durante la postura

e) **Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:**

Ocasionalmente puede presentarse síntomas respiratorios leves 4 – 6 días después de la vacunación, los cuales desaparecen a los pocos días.

f) **Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

Todas las aves del lote deben ser vacunadas al mismo tiempo.

Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día.

g) **Uso durante la postura**

No aplica

h) **Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado:**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) **Sobredosis.**

La administración de 10 veces la dosis recomendada es bien tolerada, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) **Periodo de resguardo**

Cero días

k) **Precauciones especiales para el operador:**

Evitar el contacto de la vacuna con las mucosas. Utilizar gafas protectoras para la aplicación de la vacuna vía aspersion.

APROBADO  
SAG  
17-01-2026



## 5. Particularidades farmacéuticas

a) **Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado:**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente que forma parte de la vacuna.

b) **Período de eficacia:**

24 meses.

Utilizar inmediatamente una vez reconstituido.

APROBADO  
SAG  
17-01-2026

c) **Condiciones de almacenamiento:**

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar.

Diluyente: almacenar entre 5 – 25°C

d) **Descripción de los envases:**

Estuche de cartulina impresa, con 20 frascos de vidrio o polietileno, etiquetados, cerrados con tapón de goma butílica y sello de aluminio, conteniendo 1.000, 2.500 o 5.000 dosis. Incluye prospecto interno.

Frasco de polietileno, etiquetado, conteniendo 30 mL de diluyente. Incluye gotario dosificador

e) **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere:**

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados

## 6. Condición de venta.

Venta bajo receta medico veterinaria

## 7. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda

**Fabricado por:**

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.  
1107 Budapest, Szállás u.5, Hungría

**Importado y distribuido por:**

Ceva Salud Animal Chile SpA  
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

**Bajo licencia de CEVA Sante Animale, Francia**

**Registro SAG N° 299-B**

**USO VETERINARIO**