

CEVAC® ND IB EDS K

Vacuna inactivada contra Enfermedad de Newcastle (ND),
Bronquitis Infecciosa (IB)
y Síndrome de Caída de Postura (EDS)
Para la inmunización de aves

APROBADO
SAG
19-12-2024



CEVAC® ND IB EDS K

Vacuna inactivada contra Enfermedad de Newcastle (ND),
Bronquitis Infecciosa (IB)
y Síndrome de Caída de Postura (EDS)
Para la inmunización de aves



Emulsión Inyectable

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Virus Newcastle, Cepa NDV-"SZ", LaSota $\geq 50 \text{ PD}_{50}$
Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa M-41, Mass $\geq 6 \log_2 \text{ HI}$
Adenovirus Aviar (virus del EDS), Cepa B8/78 $\geq 7 \log_2 \text{ HI}$
Excipientes csp 0,5 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante oleoso

ESPECIE DE DESTINO

Gallinas ponedoras y reproductoras.

INDICACIÓN DE USO

CEVAC® ND IB EDS K se recomienda para la prevención de Bronquitis Infecciosa, producida por Cepa Mass, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de Caída de Postura en lotes de aves de postura y reproductoras previamente inmunizadas contra bronquitis infecciosa (IB) y enfermedad de Newcastle (ND), con vacunas de virus vivos atenuados.

La progenie de los animales vacunados tendrá anticuerpos maternos específicos contra IB y ND.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

La vacuna CEVAC® ND IB EDS K debe administrarse a lotes de pollas 3-4 semanas antes del inicio de postura, entre las 16 y 20 semanas de edad. La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del pescuezo) o por vía intramuscular (en la pechuga o el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

PRECAUCIONES GENERALES

Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria.

Se debe utilizar equipo de inyección estéril.

Justo antes de usar la vacuna, dejar que alcance la temperatura ambiente (entre 15° y 25°C).

Agitar suficientemente el frasco antes y durante la vacunación.

Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada.

Una vez abierto el frasco, su contenido debe utilizarse dentro de las 24 horas siguientes. El contenido que sobre después de 24 horas debe descartarse.

ADVERTENCIAS

NO USAR DURANTE LA POSTURA.

No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

ALMACENAMIENTO

Entre 2 y 8°C, protegido de la luz.

No permitir la congelación.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días.

Producido por:

Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals Co. Ltd. | 107 Budapest, Szállás u.5. Hungría

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroserve S.R.L., Santa Cruz.

SENASAG CR-PUV N° 000982/2005

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes,

Santiago - Chile. Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 352-B

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. América, Quito.

Reg. AGROCALIDAD No.: 4A-10253-SESA

Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741

Reg.INSAI No.: XXXXX - Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra

Venta bajo prescripción del médico veterinario

**USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

CEVAC® ND IB EDS K

Vacuna inactivada contra Enfermedad de Newcastle (ND),
Bronquitis Infecciosa (IB)
y Síndrome de Caída de Postura (EDS)
Para la inmunización de aves

APROBADO
SAG
19-12-2024

5x500 ml/
5x1000
dosis



CEVAC® ND IB EDS K

Vacuna inactivada contra Enfermedad de Newcastle (ND),
Bronquitis Infecciosa (IB)
y Síndrome de Caída de Postura (EDS)
Para la inmunización de aves

5x500 ml/
5x1000
dosis



58692-01

Emulsión Inyectable COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:
Virus Newcastle, Cepa NDV-"SZ", LaSota ≥ 50 PD₅₀
Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa M-41, Mass ≥ 6 log₂ HI
Adenovirus Aviar (virus del EDS), Cepa B8/78 ≥ 7 log₂ HI
Excipientes csp 0,5 mL
Preservante: Timerosal
Adyuvante oleoso

ESPECIE DE DESTINO

Gallinas ponedoras y reproductoras.

INDICACIÓN DE USO

CEVAC® ND IB EDS K se recomienda para la prevención de Bronquitis Infecciosa, producida por Cepa Mass, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de Caída de Postura en lotes de aves de postura y reproductoras previamente inmunizadas contra bronquitis infecciosa (IB) y enfermedad de Newcastle (ND), con vacunas de virus vivos atenuados.

La progenie de los animales vacunados tendrá anticuerpos maternos específicos contra IB y ND.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

La vacuna CEVAC® ND IB EDS K debe administrarse a lotes de pollas 3-4 semanas antes del inicio de postura, entre las 16 y 20 semanas de edad. La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del pescuezo) o por vía intramuscular (en la pechuga o el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

PRECAUCIONES GENERALES

Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria.

Se debe utilizar equipo de inyección estéril.
Justo antes de usar la vacuna, dejar que alcance la temperatura ambiente (entre 15° y 25°C).

Agitar suficientemente el frasco antes y durante la vacunación.

Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada.

Una vez abierto el frasco, su contenido debe utilizarse dentro de las 24 horas siguientes. El contenido que sobre después de 24 horas debe descartarse.

ADVERTENCIAS

NO USAR DURANTE LA POSTURA.

No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

ALMACENAMIENTO

Entre 2 y 8°C, protegido de la luz.

No permitir la congelación.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días.

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801 Las Condes, Santiago.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 352-B

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. América, Quito.

Reg. AGROCALIDAD No.: 4A-10253-SESA

Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741

Reg.INSAL No.: XXXXX - Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. - 1107 Budapest - Hungría

Venta bajo prescripción del médico veterinario

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Fecha de Fab.:
Nº de Serie:
Fecha de Exp.:

CEVAC® ND IB EDS K

Vacuna inactivada contra Enfermedad de Newcastle (ND),
Bronquitis Infecciosa (IB)
y Síndrome de Caída de Postura (EDS)
Para la inmunización de aves

**APROBADO
SAG**

58691-02

19-12-2024

500 ml/
1 000
dosis



Emulsión Inyectable

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Virus Newcastle, Cepa NDV-"SZ", LaSota $\geq 50 \text{ PD}_{50}$
Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa M-41, Mass $\geq 6 \log_2 \text{ HI}$
Adenovirus Aviar (virus del EDS), Cepa B8/78 $\geq 7 \log_2 \text{ HI}$
Excipientes csp 0,5 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante oleoso

ESPECIE DE DESTINO

Gallinas ponedoras y reproductoras.

INDICACIÓN DE USO

CEVAC® ND IB EDS K se recomienda para la prevención de Bronquitis Infecciosa, producida por Cepa Mass, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de Caída de Postura en lotes de aves de postura y reproductoras previamente inmunizadas contra bronquitis infecciosa (IB) y enfermedad de Newcastle (ND), con vacunas de virus vivos atenuados.

La progenie de los animales vacunados tendrá anticuerpos maternos específicos contra IB y ND.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

La vacuna CEVAC® ND IB EDS K debe administrarse a lotes de pollas 3-4 semanas antes del inicio de postura, entre las 16 y 20 semanas de edad. La vacuna debe ser inyectada por vía subcutánea (bajo la piel del pescuezo) o por vía intramuscular (en la pechuga o el muslo) en dosis de 0.5 ml por ave.

PRECAUCIONES GENERALES

Solamente en aves sanas y bien desarrolladas puede obtenerse protección satisfactoria.

Se debe utilizar equipo de inyección estéril.

Justo antes de usar la vacuna, dejar que alcance la temperatura ambiente (entre 15° y 25°C).

Agitar suficientemente el frasco antes y durante la vacunación.

Verificar la exactitud de la jeringa para garantizar la administración de la dosis indicada.

Una vez abierto el frasco, su contenido debe utilizarse dentro de las 24 horas siguientes. El contenido que sobre después de 24 horas debe descartarse.

ADVERTENCIAS

NO USAR DURANTE LA POSTURA.

No mezclar la vacuna con otras vacunas u otros medicamentos.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

ALMACENAMIENTO

Entre 2 y 8°C, protegido de la luz.

No permitir la congelación.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días.

Importado y distribuido por:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801 Las Condes, Santiago.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°.: 352-B

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. América, Quito.

Reg. AGROCALIDAD No.: 4A-10253-SESA

Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF

J-303108741 - Reg.INSAL No.: XXXXXX - Asesor técnico:

M.V. Ana Rosa Guerra

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co.

Ltd. - 1107 Budapest - Hungría

Venta bajo prescripción del médico veterinario

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Fecha
de Fab.:
Serie
No.:
Fecha
de Exp.:



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasia:** CEVAC CEVA® ND IB EDS K
b) **Nombre Genérico:** Vacuna inactivada contra Enfermedad de Newcastle (ND), Bronquitis Infecciosa (IB) y Síndrome de Caída de Postura (EDS).
c) **Forma farmacéutica:** Emulsión Inyectable

2.- Composición

Cada dosis contiene:

Virus Newcastle, Cepa NDV-"SZ", La Sota	$\geq 50 \text{ PD}_{50}$
Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa M-41, Mass	$\geq 6 \log_2 \text{ HI}$
Adenovirus Aviar, Cepa B8/78	$\geq 7 \log_2 \text{ HI}$
Excipientes csp	0,5 mL
-Inactivante: Formaldehído	
-Preservante: Timerosal	
-Adyuvante oleoso	

3.- Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa con el objeto de proveer inmunidad pasiva a la progenie contra el virus Newcastle, virus Bronquitis Infecciosa y Adenovirus Aviar.

4.-Particularidades clínicas:

- a) **Especies de destino:** Gallinas de postura y reproductoras.
- b) **Indicaciones de uso**
Como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Síndrome de Caída de Postura, en la progenie de las aves vacunadas
- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.**
Dosis:
0.5 ml como dosis única.
Edad o peso:
Vacunar 3-4 semanas antes del inicio de la postura.
Condición fisiológica
Animales sanos
Vía de administración:
Subcutánea (bajo la piel del cuello) o intramuscular (en la pechuga o en el muslo)
Modo de empleo:
Agitar antes y durante la aplicación
Previo al uso, mantenga la vacuna a temperatura ambiente por 1-2 horas
Administrar en forma aséptica

APROBADO
SAG
19-12-2024



d) Contraindicaciones

No tiene

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la (s) especie (s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:

Ocasionalmente, puede observar una reacción local en el sitio de inyección, pero desaparece a los pocos días

f) Advertencia y Precauciones especiales de uso.

Las aves deben haber sido previamente vacunadas con vacunas vivas modificadas contra Bronquitis Infecciosa, Cepa Mass y Enfermedad de Newcastle.

Mantener fuera del alcance de los niños.

9) Uso durante postura

No administrar durante la postura

h) Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis.

La administración del doble es bien tolerada, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) Periodo de resguardo

Cero días

APROBADO
SAG
19-12-2024

k) Precauciones especiales para el operador.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

5.- Particularidades farmacéuticas.

a) Principales incompatibilidad físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

b) Período de eficacia.

24 meses.

Una vez abierto el frasco, su contenido debe utilizarse dentro de las 24 horas siguientes.

c) Condiciones de almacenamiento.

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.



d) Descripción de los envases.

Estuche de cartón o caja de aluminio etiquetada, conteniendo 1 o 5 frascos de polietileno, etiquetado, cerrados con tapones de goma, sellados con cápsulas de aluminio y tapas de plástico, conteniendo 500 mL, equivalente a 1.000 dosis.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración.

Se recomienda disponer los desechos mediante incineración.

Producto sin utilizar deben ser devueltos a la empresa importadora.

6.- Condición de venta.

Venta bajo receta medico veterinaria

7.- Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante

Fabricado por:

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5, Hungría

**APROBADO
SAG
19-12-2024**

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de CEVA Sante Animale, Francia

Registro SAG N° 352-B

USO VETERINARIO