

CEVAC® IBD L

Vacuna viva contra Enfermedad de Gumboro,
Cepa Winterfield 2512, G61
Para la inmunización activa de pollos

20x 1000 dosis



48025-11

CEVAC® IBD L
20 x 1000 dosis

Producido por: Ceva-Phylaxia, Veterinary
Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.5,
Hungria

STD 712

APROBADO
SAG

Fecha de Fab.:

Serie No:

16-04-2024

Fecha de Exp.:

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L., BOLIVIA SENASAG Reg. PUV N° 000858/05 - En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile. Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia. Reg. SAG N°: 376-B

En Colombia: Ceva Salud Animal SAS, Bogotá. - Reg. ICA No: 7186 BV

En Ecuador: REBEXA Representaciones SA El calzado Calle S12 N° OE2-495 y Calle OE2L-Quito
Reg. No: 4A-8546-AGROCALIDAD -

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Lima. - Reg. SENASA No: B.01.1.01.1.467 - En Venezuela: Ceva Salud Animal, C.A., J-29606988-3 / Productos Swissagro, C.A., J-30310874-1 - Reg. INSAI2041P34N0710595 - Asesor técnico: M.V. Nerina Alliegro

Polvo Liofilizado

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa Winterfield 2512, G61 $\geq 10^{2.0}$ EID₅₀
Excipientes csp 1 dosis

Aplicación en el agua de consumo.

ADVERTENCIA: Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después de mezclar.
Rechazar el producto si el sello está deteriorado. Ver información detallada en el inserto.

ALMACENAMIENTO: Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Venta exclusiva al profesional veterinario

USO VETERINARIO - MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

STD-422

CEVAC® IBD L

Vacuna viva contra
Enfermedad de Gumboro,
Cepa Winterfield 2512, G61

1000 dosis



Polvo Liofilizado.

Almacenar entre 2°C y 8°C.

Ver detalles en el inserto.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA

**MANTÉNGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

BOLIVIA SENASAG Reg. PUV

N° 000858/05 - SAG N°: 376-B ;

Reg No.: 4A-8546-AGROCALIDAD,

SENASA No.: B.01.1.01.1.467

INSAI2041PI34N0710595

**APROBADO
SAG**

16-04-2024

48024-08 - Ceva-Phylaxia,

Budapest, Hungría

Fab.:

Serie No.:

Exp.:

CEVAC® IBD L

Vacuna viva contra Enfermedad de Gumboro,
Cepa Winterfield 2512, G61
Para la inmunización activa de pollos

20x 5000 dosis

00000



CEVAC® IBD L
20 x 5000 dosis

STD 713

Producido por: Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals Co.Ltd. 1107
Budapest, Szállás u.5. Hungría.

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz.

Reg. SENASAG No.: 000858/05

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801,
Las Condes, Santiago - Chile Bajo licencia de Ceva Santé Animale,
Francia - Reg. SAG N°: 376-B

Fecha de Fab.:

Serie n°

Fecha de Exp.:

APROBADO
SAG

16-04-2024

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. América Quito

Reg N° : 4A-8546-AGROCALIDAD

Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Lima.

Reg. SENASA No.: B.01.1.01.1.467

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741

Reg. MAT-SASA No.: B.I. 8.642

Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra - CPE 0711226737

En Colombia: Vetiplus S.A., Bogotá. - Reg. ICA No.: 7186 BV

Polvo Liofilizado

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa Winterfield 2512, G61 $\geq 10^{3.0}$ EID₅₀

Excipientes csp 1 dosis

Aplicación en el agua de consumo.

ADVERTENCIA: Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después de mezclar. Rechazar el producto si el sello está deteriorado. Ver información detallada en el inserto.

ALMACENAMIENTO: Entre 2° y 8° C, protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinaria
Venta exclusiva al profesional veterinario
Venta bajo prescripción del médico veterinario

USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® IBD L

Vacuna viva contra
Enfermedad de Gumboro,
Cepa Winterfield 2512, G61

5000 dosis



Polvo Liofilizado.

Administración

Aplicación en el agua de consumo.

Almacenamiento: entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

Advertencia: utilizar todo el contenido de una sola vez.

Ver instrucciones completas en el inserto.

USO VETERINARIO

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

Reg. SENASAG No: 000858/05

SAG No: 0376-B; ICA No: 7186 BV

Reg No: 4A-8546-AGROCALIDAD

SENASA No: B.01.1.01.1.467

MAT-SASA No: B.I. B.642

**APROBADO
SAG**

18-04-2024

50538-06 - Producido por:

Ceva-Phylaxia, Hungría

Fab:

Serie No:

Exp:

CEVAC® IBD L

Vacuna viva contra Enfermedad de Gumboro,
Cepa Winterfield 2512, G61
Para la inmunización activa de pollos



APROBADO
SAG

16-04-2024

COMPOSICION

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa Winterfield 2512, G61 $\geq 10^{2.0}$ EID₅₀
Excipientes csp l dosis

INDICACION DE USO

Para la inmunización activa de pollos sanos para prevenir la Enfermedad de Gumboro, a partir de los 10 días de edad. La vacuna puede utilizarse para vacunación inicial o revacunación de pollos, pollas y gallinas.

ADMINISTRACION Y DOSIFICACION

CEVAC® IBD L debe administrarse en el agua de consumo.

Los pollos deben ser vacunados con CEVAC® IBD L entre 10 y 18 días de edad, dependiendo del nivel de anticuerpos maternos.

Las pollas o gallinas jóvenes deben ser vacunadas dos veces entre los 16 y 26 días de edad dejando un intervalo de 6 días entre una y otra administración.

La fecha exacta de la vacunación puede determinarse verificando el nivel de anticuerpos maternos.
Método de administración en el agua de consumo:

Se recomienda no utilizar desinfectantes en el agua de consumo desde 48 horas antes hasta 24 horas después de la vacunación.

Cuando se utilice una bomba de cloro, apagarla durante este mismo período de tiempo.

Los bebederos deben limpiarse completamente antes de utilizarlos para la vacunación. Para la limpieza no se deben utilizar desinfectantes.

Cerrar el sistema de distribución de agua, levantar y desocupar las líneas dispensadoras o vaciar los bebederos.

El período de retención del agua varía en concordancia con la edad de los pollos por vacunar y las condiciones climáticas (promedio 1.5 horas).

Preparar únicamente la cantidad de vacuna dependiendo de la cantidad de dosis por presentación que se va a utilizar inmediatamente.

Utilizar únicamente materiales y utensilios de plástico para la preparación y administración de la vacuna.

Preparar la cantidad requerida de agua que será consumida por las aves en dos horas. Este volumen puede variar, dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales.

Edad	10-12 días	13-18 días	19-26 días
Cantidad mínima de agua para 1.000 pollos	10 litros	15 litros	25-30 litros

Como ayuda para preservar la actividad del virus, se puede neutralizar el cloro con 2.5 g de leche descremada en polvo por litro de agua. No utilizar agua con altas concentraciones de iones metálicos.

48026-09



Mezclar la vacuna con agua limpia, fresca y no clorada, abriendo los viales bajo el agua y dejando estabilizar la mezcla durante 10 minutos. Abrir el sistema de hidratación cuando cambie el color del agua (azulosa), bajar las líneas y verificar la distribución en todo el galpón. Cuando el tanque esté vacío, llenarlo con una solución de leche descremada en polvo, dejarlo reposar durante 10 minutos y abrir el sistema de irrigación para hidratar la solución de la vacuna remanente en las mangueras. La suspensión de vacuna también puede ser distribuida manualmente por los operarios, utilizando recipientes plásticos.

PRECAUCIONES GENERALES

Solamente en pollos sanos puede obtenerse protección satisfactoria. Aproximar siempre el número de dosis al millar superior siguiente (por ejemplo a 20.000 si son 19.450), no trate de aumentar la cantidad requerida. Todas las aves del lote deben ser vacunadas al mismo tiempo. Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día. Desechar todos los frascos de vacuna abiertos que sobren después de la vacunación, ciñéndose a las respectivas regulaciones locales o nacionales. El almacenamiento o el manejo inadecuado de las vacunas puede resultar en pérdida de la potencia.

ADVERTENCIA: CEVAC® IBD L no debe mezclarse con otras vacunas.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Entre 2°C y 8°C, protegido de la luz.

PRESENTACIÓN: Viales de 1000, 2500, 5000 y 10.000 dosis.

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Venta exclusiva al profesional veterinario

USO VETERINARIO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Importado y distribuido por:

En **Bolivia:** Agroservet S.R.L.,

BOLIVIA SENASAG Reg. PUV N° 000858/05

En **Chile:** Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes,

Santiago - Chile. Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.- Reg. SAG N°: 376-B

En **Ecuador:** REBEXA Representaciones S.A El calzado Calle S12 N° OE2-495 y Calle OE2L-Quito

Reg. No: 4A-8546-AGROCALIDAD

En **Perú:** Ceva Salud Animal S.A.C., Av. República de Panamá 3461 - San Isidro, Lima.

Reg. SENASA No.: B.01.1.01.1467

En **Venezuela:** Ceva Salud Animal, C.A., J-29606988-3 / Productos Swissagro, C.A., J-30310874-1

Reg. INSAI2041PI34N0710595

Asesor técnico: M.V. Nerina Alliegro

Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Hungría

APROBADO
SAG
16-04-2024



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** CEVAC CEVA® IBD L
- b) **Nombre Genérico:** Vacuna viva contra Enfermedad de Gumboro
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo Liofilizado

2. Composición

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa Winterfield 2512, G61
Excipientes csp

$\geq 10^{2.0}$ EID₅₀
1 dosis

3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la Enfermedad de Gumboro

4. Particularidades clínicas

- a) **Especies de destino y subcategoría:** Pollos Broilers, reproductoras broiler y gallinas de postura
- b) **Indicaciones de uso:**
Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Gumboro
- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo:**
Dosis:
1 dosis/ave
Frecuencia e intervalo:
Primovacuna: entre 10 y 18 días de edad, dependiendo el nivel de anticuerpos maternos.
Repetir entre los 15 y 26 días de edad dejando un intervalo de 6 días entre una y otra administración.
La fecha exacta de vacunación puede determinarse verificando el nivel de anticuerpos maternos.
Edad o peso:
A partir de los 10 días de edad
Condición fisiológica
Aves sanas
Vía de administración:
Oral, mediante el agua de bebida

APROBADO
SAG
16-04-2024



Modo de empleo

Vacunación oral (mediante agua de bebida)

- Se recomienda no utilizar desinfectantes en el agua de consumo desde 48 horas antes hasta 24 horas después de la vacunación. Cuando se utilice una bomba de cloro, apagarla durante este mismo periodo de tiempo.
- Los bebederos deben limpiarse completamente antes de utilizarlos para la vacunación. Para la limpieza no deben utilizarse desinfectantes.
- Cerrar el sistema de distribución de agua, levantar y desocupar las líneas dispensadoras o vaciar los bebederos.
- El periodo de retención del agua varía en concordancia con la edad de los pollos por vacunar y las condiciones climáticas (promedio 1.5 horas).
- Preparar únicamente la cantidad de vacuna que se va a utilizar inmediatamente.
- Utilizar únicamente materiales y utensilios de plástico para la preparación y administración de la vacuna.
- Preparar la cantidad requerida de agua que será consumida por las aves en dos horas. Este volumen puede variar, dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales.

Edad	10-12 días	19-26 días
Cantidad mínima de agua para 1000 pollos	10 litros	25 - 30 litros

- Como ayuda para preservar la actividad del virus, neutralizar el cloro con 2.5 g de leche descremada en polvo por litro de agua.
- No utilizar agua con altas concentraciones de iones metálicos.
- Mezclar la vacuna con agua limpia, fresca y no clorada, abriendo los viales bajo el agua y dejando estabilizar la mezcla durante 10 minutos.
- Abrir el sistema de hidratación cuando cambie el color de agua (azulosa), bajar las líneas y verificar la distribución en todo el galpón.
- Cuando el tanque este vacío, llenarlo con una solución de leche descremada en polvo, dejarlo reposar 10 minutos y abrir el sistema de irrigación para hidratar la solución de la vacuna remanente en las mangueras.
- La suspensión de la vacuna también puede ser distribuida manualmente por los operarios, utilizando recipientes plásticos.

d) **Contraindicaciones:**

No tiene

e) **Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:**

No se han descrito

APROBADO
SAG
16-04-2024



- f) **Advertencias y precauciones especiales de uso:**
Vacunar todas las aves del lote al mismo tiempo.
Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día.
No vacunar cuando existen altos niveles de anticuerpos maternos, por cuanto se neutraliza la vacuna.
Mantener fuera del alcance de los niños.
- g) **Uso durante la postura**
No aplica
- h) **Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado:**
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.
- i) **Sobredosis.**
La administración de 10 veces la dosis recomendada es bien tolerada, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.
- j) **Periodo de resguardo**
Cero días
- k) **Precauciones especiales para el operador:**
Evitar ingerir alimentos o fumar durante la manipulación de la vacuna.

APROBADO
SAG
16-04-2024

5. Particularidades farmacéuticas

- a) **Principal incompatibilidad físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado:**
No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente que forma parte de la vacuna.
- b) **Período de eficacia:**
24 meses.
Utilizar inmediatamente una vez reconstituido.
- c) **Condiciones de almacenamiento:**
Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar.



d) **Descripción de los envases:**

Estuche de cartulina impreso, con 20 frascos de vidrio, etiquetados, cerrados con tapón de goma butílica, sellado con tapa de aluminio y tapa de plástico, conteniendo 1.000, 2.500, 5.000 ó 10.000 dosis. Incluye prospecto interno.

e) **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere:**

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados

6. **Condición de venta.**

Venta bajo receta medico veterinaria

7. **Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda**

Fabricado por:

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5, Hungría



16-04-2024

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de CEVA Sante Animale, Francia

Registro SAG N° 376-B

USO VETERINARIO