

Vacuna viva, enfermedad de Newcastle cepa La Sota

COMPOSICIÓN:

Cada dosis contiene:
Virus Enfermedad de Newcastle, cepa La Sota: $10^{6.5}$ - $10^{8.5}$ D_{IE₅₀}
Excipientes c.s.p 1 dosis.

INDICACIONES DE USO:

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Newcastle.

FORMA FARMACÉUTICA:

Polv. Liofilizado.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar durante la postura.

EFFECTOS O REACCIONES ADVERSAS:

En los animales vacunados pueden aparecer síntomas respiratorios leves a los 5-7 días post vacunación.

ESPECIE DE DESTINO Y SUBCATEGORÍAS:

Pollos Broilers, Pollos/Pollas de reemplazo de reproductores y Pollas de reemplazo.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN:

Dosis: 1 dosis/ave.

Edad o peso: a partir de 1er día de edad.

Condición fisiológica: animales sanos.

Vías de administración: oral (agua de bebida) o nebulización (aspersión).

Modo de empleo:

Vía oral (agua de bebida): para pollos a partir de 1 semana de edad.

Cerrar los bebederos automáticos de manera que la única agua que quede disponible sea el agua que contiene la vacuna.

Suspender el suministro de agua durante 2 horas antes de la vacunación.

No suspender el consumo de agua en casos de calor extremo.

Reconstituir el polvo liofilizado, llenando el frasco que lo contiene hasta la mitad con agua fresca potable (sin cloro, detergentes, desinfectantes ni iones metálicos).

Agitar suavemente el frasco antes y durante su administración.

Agitar y verterlo en un recipiente adecuado hasta un volumen tal de agua de bebida que pueda ingerirse en ½ ó 1 hora como máximo teniendo en cuenta que:

Edad del ave

1 a 3 semanas
4 a 9 semanas
10 a 16 semanas

Cantidad aprox. de agua para 1.000 aves

5 a 10 litros
12 a 23 litros
27 a 37 litros

Reiniciar la administración normal de agua sólo después de consumirse toda la vacuna.

Nebulización: para pollos a partir del 1er día de edad.

Validar el aparato a utilizar para comprobar la cantidad de agua necesaria puesto que es totalmente dependiente del tipo de aparato y del tamaño de gota que produce.

Para esto, el día anterior a la vacunación llenar el aparato con agua fresca potable (sin cloro, detergentes, desinfectantes ni iones metálicos) y rociar a las aves de manera que la cabeza de todas ellas quede cubierta de gotas de agua. Comprobar la cantidad de agua utilizada, y esta será la que habrá que utilizar para mezclar con las dosis necesarias, según las aves a vacunar.

Se pueden utilizar los siguientes volúmenes a título orientativo:

Nº de dosis

1000

Aves de 1 día de edad (gota gruesa)

200-250 ml

Aves mayores (gota fina)

500-1000 ml

PERÍODO DE RESGUARDO:

Cero días.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener refrigerado: entre 2 - 8 °C.

No congelar.

ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES):

Advertencias y precauciones especiales de uso

Mantener fuera del alcance de los niños.

Precauciones especiales para el operador

La administración vía nebulización requiere el uso de mascarilla y gafas protectoras.

Lavar y desinfectar las manos del operador después de la vacunación.

La vacuna no debe tomar contacto con los ojos del operador, ya que el virus de la Enfermedad de Newcastle puede causar una inflamación grave de la mucosa ocular y de los párpados. Debe consultar al médico ante cualquier sintomatología ocular.

Uso durante la postura

No usar en aves durante la postura.

Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

Incompatibilidades

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO:

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Formatos:

Caja con 10 viales de 1.000 dosis.

Caja con 10 viales de 2.500 dosis.

Caja con 10 viales de 5.000 dosis.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Fabricado por:

LABORATORIOS HIPRA S.A., España

Importado y distribuido por:

VETERQUÍMICA S.A.

Camino a Lonquén, 10387 - Maipú - Chile

Fono (56-2) 23844000 - Fax (56-2) 23844030

Bajo licencia de:

LABORATORIOS HIPRA, S.A., España

Reg. SAG. N° 0018-B
Venta bajo receta médico veterinaria

PARA USO VETERINARIO



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com