



10 x 1000 dosis



Nobilis®
ND CLONE 30

VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, CEPA CLONE 30

Polvo liofilizado



10 x 1000 dosis

VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, CEPA CLONE 30

Polvo liofilizado

Nobilis®
ND CLONE 30

Nobilis®
ND CLONE 30

VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, CEPA CLONE 30
Polvo liofilizado

10 x 1000 dosis

Composición: cada dosis reconstituida contiene:
Virus Newcastle, cepa Clone 30 $\geq 10^{6,0}$ EID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis
Preservante: Gentamicina

USO VETERINARIO
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta Médico Veterinario

Indicación de uso e instrucciones completas: ver inserto interno.

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Período de Resguardo: Cero días.

Reg. SAG N° 1119-B

036082.01
167/0561
K M Y C

Nobilis®
IB H 120

Nobilis®
ND CLONE 30

10 x 1000 dosis

Serie:

Vence:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar oscuro entre +2 y +8 °C.
No congelar.

036082.01.0561.500



E-644

10 x 1000 dosis

Nobilis®
ND CLONE 30

APROBADO
SAG

22-03-2021



Fabricado por:
Intervet International B.V., Wim de
Koningstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.
Importado y distribuido por
Intervet Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5,
Los Condes - Santiago, Chile
Bajo licencia de
Intervet International, B.V., Holanda

Nobilis®
ND CLONE 30

10 x 1000 dosis



10 x 2500 dosis

Polvo liofilizado

VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, CEPA CLONE 30



Nobilis®
ND CLONE 30



10 x 2500 dosis

Polvo liofilizado

VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, CEPA CLONE 30

Nobilis®
ND CLONE 30

Nobilis®
ND CLONE 30

VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, CEPA CLONE 30
Polvo liofilizado

10 x 2500 dosis

Composición: cada dosis reconstituida contiene:
Virus Newcastle, cepa Clone 30 $\geq 10^{6,0}$ EID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis
Preservante: Gentamicina

USO VETERINARIO

Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta Médico Veterinaria

Indicación de uso e instrucciones completas: ver inserto interno.

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Período de Resguardo: Cero días.

Reg. SAG N° 1119-B

036082.01
167/0561
K M Y C

Nobilis®
IB H 120

Nobilis®
ND CLONE 30

10 x 2500 dosis

Serie:

Vence:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar oscuro entre +2 y +8 °C.
No congelar.

036082.01.0561.500



E-644

10 x 2500 dosis

Nobilis®
ND CLONE 30

APROBADO
SAG

22-03-2021



Fabricado por:
Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.
Importado y distribuido por
Intervet Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5
Los Condes - Santiago, Chile
Bajo licencia de
Intervet International, B.V., Holanda

Nobilis®
ND CLONE 30

10 x 2500 dosis



10 x 5000 dosis

Polvo liofilizado

VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, CEPA CLONE 30



Nobilis®
ND CLONE 30



10 x 5000 dosis

Polvo liofilizado

VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, CEPA CLONE 30

Nobilis®
ND CLONE 30

Nobilis®
ND CLONE 30

VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, CEPA CLONE 30
Polvo liofilizado

10 x 5000 dosis

Composición: cada dosis reconstituida contiene:
Virus Newcastle, cepa Clone 30 $\geq 10^{6,0}$ EID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis
Preservante: Gentamicina

USO VETERINARIO

Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta Médico Veterinaria

Indicación de uso e instrucciones completas: ver inserto interno.

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Período de Resguardo: Cero días.

Reg. SAG N° 1119-B

036082.01
167/0561
C M Y K

Nobilis®
IB H 120

Nobilis®
ND CLONE 30

10 x 5000 dosis

Serie:

Vence:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar oscuro entre +2 y +8 °C.
No congelar.

036082.01.0561.500



E-644



Fabricado por:
Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.
Importado y distribuido por
Intervet Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5
Los Condes - Santiago, Chile
Bajo licencia de
Intervet International, B.V., Holanda

Nobilis®
ND CLONE 30

10 x 5000 dosis

APROBADO
SAG

22-03-2021

Nobilis®
ND CLONE 30

10 x 5000 dosis

■ 1000 dosis

1000

■ Administración óculo/nasal, spray o agua de bebida.
Conservar en lugar oscuro entre 2° y 8°C. No congelar.
Mantener fuera del alcance de los niños

USO VETERINARIO

Registro SAG N° 1119-B

Nobilis®
ND CLONE 30



VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE,
CEPA CLONE 30
Polvo liofilizado

Fabricado por:

Intervet International B.V. Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5

Las Condes, Santiago - Chile

Bajo licencia de:

Intervet International B.V. Holanda

**APROBADO
SAG**

22-03-2021



Serie:

Vence:

■ **2500 dosis**

■ **2500**

Administración óculo/nasal, spray o agua de bebida.
Conservar en lugar oscuro entre 2° y 8°C. No congelar.
Mantener fuera del alcance de los niños

USO VETERINARIO

Registro SAG N° 1119-B

Nobilis®
ND CLONE 30



VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE,
CEPA CLONE 30
Polvo liofilizado

Fabricado por:

Intervet International B.V. Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5

Las Condes, Santiago - Chile

Bajo licencia de:

Intervet International B.V. Holanda

APROBADO
SAG

22-03-2021



Serie:

Vence:

5000 dosis

5000

Administración óculo/nasal, spray o agua de bebida.
Conservar en lugar oscuro entre 2° y 8°C. No congelar.
Mantener fuera del alcance de los niños

USO VETERINARIO

Registro SAG N° 1119-B

Nobilis®
ND CLONE 30



VACUNA VIVA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE,
CEPA CLONE 30
Polvo liofilizado

Fabricado por:

Intervet International B.V. Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5,
Las Condes, Santiago - Chile

Bajo licencia de:

Intervet International B.V. Holanda

APROBADO
SAG

22-03-2021



Serie:

Vence:



Nobilis®
ND Clone 30

Vacuna viva Newcastle, Cepa Clone 30
Polvo liofilizado
Pollos

5 000

12x5 000 dosis



sphereon®

**APROBADO
SAG**
22-03-2021

Ver prospecto adjunto.
Mantener refrigerado entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Reg. SAG N°1119-B

USO VETERINARIO
Venta bajo receta Médico Veterinaria

Fabricado por:
Intervet International B.V., Holanda.

Importado y distribuido por:
Intervet Chile Limitada - Chile
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda



MSD
Animal Health



sphereon®

GUIA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN OCULAR

1

2

3

4

APLICACIÓN AGUA DE BEBIDA/ASPERSIÓN

1

2

3

4

31 9797 R3

Nobilis® ND Clone 30



Vacuna viva Newcastle, Cepa Clone 30
Polvo liofilizado
12x5 000 dosis
Pollos

Composición
Cada dosis reconstituida contiene:
Virus Newcastle, Cepa Clone 30 ≥ 10^{6.0} ELD₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis
Preservante: Gentamicina

Especies de destino
Pollos.

Indicaciones de uso
Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Newcastle, en pollos sanos a partir del 1er día de edad.

Posología
Al menos 6,0 log₁₀ ELD₅₀ por animal.

Edad o peso
Desde el 1er día de edad.

Condición fisiológica
Animales sanos.

Vía de administración
Vía oral, ocular o nasal.

Modo de empleo
La vacuna puede ser presentada como liofilizado en frasco de vidrio o como esferas liofilizadas en capsulas. En caso de que el producto este presentado en capsulas, no usar el producto si el contenido esta cafesoso y pegado al envase ya que esto indica que la integridad del envase ha sido violada. Cada envase debe ser utilizado de forma inmediata y completa después de su apertura.

o **Administración por spray:**
Reconstituir la vacuna con agua limpia y fresca, a la cual se le puede añadir 2% de leche descremada. No se debe utilizar agua clorada. Los frascos deben ser abiertos bajo agua o el contenido de la capsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar el agua conteniendo la vacuna bien antes de usar. Después de la reconstitución la suspensión debe ser transparente. El agua y el aparato de aspersión deben estar libres de sedimentos, corrosión y trazas de desinfectantes o antisépticos. Idealmente el aparato debe ser solamente para propósitos de vacunación. El volumen de diluyente para la reconstitución debe ser suficiente para asegurar una distribución homogénea cuando sea aplicado como spray a las aves. Esto varía según la edad de las aves a ser vacunadas y el sistema de manejo, pero se sugiere 250 a 500 mL de agua por 1.000. La suspensión de vacuna debe ser administrada como spray de forma homogénea sobre las aves a una distancia de 30 a 40 cm, preferiblemente cuando las aves estén sentadas juntas a luz tenue. Si es aplicable, reducir o detener la ventilación para prevenir la pérdida de spray.

o **Administración vía instilación intranasal/intraocular:** Reconstituir la vacuna con la cantidad apropiada de Diluyente Oculo-Nasal (36 ml para 1000 dosis y 90 ml para 2500 dosis) y administrar por medio de un gotario estandarizado (donde el tamaño de la gota sea conocido y consistente). Puede ser utilizada agua destilada estéril o solución salina tamponada. La cantidad de diluyente requerida para la administración por gota en ojo o nariz depende del número de dosis y del tamaño de gota, pero se utiliza aproximadamente 35 mL por 1000 dosis. Una gota debe ser aplicada en un ollar o en un ojo. Asegurar de que la gota nasal sea inhalada antes de liberar al ave.
o **Administración por el agua de bebida:** Los frascos deben ser abiertos bajo agua o el contenido de la capsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, antes de usar, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna. Después de la reconstitución la suspensión debe ser transparente. La vacuna debe ser disuelta en agua limpia y fresca, libre de hiera y clara. Al añadir 2 g o 20 mL de leche descremada por litro de agua el virus retiene su actividad por más tiempo. Asegurar el consumo de toda el agua medicada con vacuna en 2 horas. Dependiendo de las condiciones climáticas, puede ser aconsejable restringir a las aves de agua previa a la vacunación. Es esencial un número suficiente de bebederos deben ser provistos para entregar un espacio adecuado para beber. Estos deben estar limpio de trazas de detergentes y desinfectantes. Disolver 1000 dosis en la cantidad de litros de agua según la edad de las aves en días, a un máximo de 40 litros.

La vacuna debe ser entregada a primera hora de la mañana, ya que este es el principal periodo de bebida o el periodo fresco en un día caluroso. Cuando se vacunan planteles grandes, es aconsejable empezar por disolviendo solo una parte de la vacuna. Si la vacuna es administrada a través de un suministro central de agua o un proporcionador, se debe tener gran cuidado. Para un numero de aves entre dosis estandar, se debe elegir la dosis próxima más alta.



Programa de vacunación
El tiempo y el método óptimos para la primera administración y revacunación dependen en gran medida de la situación local, por lo que conviene consultar a un Médico Veterinario.

Contraindicaciones
Ninguna.

Efectos adversos o reacciones adversas
Ocasionalmente, puede presentarse una reacción respiratoria muy leve.

Advertencias y precauciones especiales de uso
Vacunar solo pollos sanos.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Uso durante postura y en animales reproductores
No usar durante la postura.

Interacción con otros productos farmacéuticos
No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con: Nobilis® Gumboro D78, Reg. SAG N° 1124-B y Nobilis® IB Ma5, Reg. SAG N° 1155-B.

Sobredosis
La administración de 10 veces la dosis ha demostrado ser segura, sin embargo no se recomienda sobre dosificar.

Período de resguardo
Cero días.

Precauciones especiales para el operador
El operador debe utilizar mascarilla y lentes protectores al administrar la vacuna, ya que el virus Newcastle puede producir inflamación en los párpados del ser humano. Debe consultar al médico ante cualquier sintomatología ocular.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado
No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente recomendado por el fabricante.

Condiciones de almacenamiento
Almacenar refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho
Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
USO VETERINARIO

Fabricado por:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxtmeer,
Holanda.

Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

Reg. SAG N°1119-B



sphereon®

Nobilis **ND Clone 30**

5 000

12 x 5 000 doses/dosis

LOT/LOTE:

Mfg.date/Prod:

EXP/CAD:

**APROBADO
SAG**

22-03-2021

Nobilis **ND Clone 30**

5 000

12 x
5 000 doses/dosis

Indonesia: KEMANTAN RI No. I. 1505234 VTS.4

Pakistan: PK Reg. No.: 009626

Peru: Intervet S.A-RUC 20372399687 Reg SENASA B.01.1.01.1.375

Philippines: VBPR NO.: R-2024



MSD
Animal Health

351560 R3



PSB010S01_03_R1

86 x 73mm

Moved to repository by AMSTELD 104 Nov:2020 07:36

sphereon®
Nobilis® **NC Clone 30**

5 000
12x5 000 dosis

Serie:

F.Fab.:

Vence:

**APROBADO
SAG**

22-03-2021

Nobilis® **NC Clone 30**

5 000 12x
5 000 dosis



sphereon®



MSD
Animal Health

387061 R1



APROBADO
SAG

22-03-2021



PSB020S10_02_R1

37 x 37 mm

C M Y K

DILUYENTE OCULO NASAL

**DILUYENTE ESTERIL PARA LA APLICACIÓN
OCULO / NASAL DE LAS VACUNAS VIVAS
LIOFILIZADAS PARA AVES
USO VETERINARIO**

1000 dosis



MSD
Animal Health

**APROBADO
SAG**

22-03-2021

Disolvente tapón coloreado estéril para la vacunación de aves por método óculo / nasal. Compatible como diluyente de las siguientes vacunas Nobilis®:

Registros SAG N° 1114-B, 1119-B, 1120-B, 1124-B, 1155-B, 1158-B, 1356-B, 2008-B.

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Almacenar a temperatura ambiente (15° - 30°C).

Fabricado por: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.

Mariano Sánchez Fontecilla No 310, Piso 8,
Las Condes. Santiago-Chile

Bajo licencia de: Intervet International B.V.
Holanda.

Serie: / Elab.: / Vence:

DILUYENTE OCULO NASAL

**DILUYENTE ESTERIL PARA LA APLICACIÓN
OCULO / NASAL DE LAS VACUNAS VIVAS
LIOFILIZADAS PARA AVES
USO VETERINARIO**

2500 dosis



MSD
Animal Health

**APROBADO
SAG**

22-03-2021

Disolvente tapón coloreado estéril para la vacunación de aves por método óculo / nasal. Compatible como diluyente de las siguientes vacunas Nobilis®:

Registros SAG N° 1114-B, 1119-B, 1120-B, 1124-B, 1155-B, 1158-B, 1356-B, 2008-B.

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Almacenar a temperatura ambiente (15° - 30°C).

Fabricado por: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxtmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Mariano Sánchez Fontecilla No 310, Piso 5,
Las Condes. Santiago-Chile

Bajo licencia de: Intervet International B.V.
Holanda.

Serie: / Elab.: / Vence:

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

a) Nombre de fantasía

Nobilis® ND Clone 30

b) Nombre genérico

Vacuna viva Newcastle, Cepa Clone 30.

c) Forma farmacéutica

Polvo Liofilizado

APROBADO
SAG

23-09-2020

2. COMPOSICIÓN

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Newcastle, Cepa Clone 30

Excipientes c.s.p.

Preservante: Gentamicina.

$\geq 10^{6,0}$ EID₅₀

1 dosis

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa de pollos contra el virus de la Enfermedad de Newcastle. La vacuna brinda una protección por 6 semanas.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

a) Especies de destino

Pollos.

b) Indicaciones de uso

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Newcastle, en pollos sanos a partir del 1er día de edad.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo

Posología:

Al menos 6,0 log₁₀ ELD₅₀ por animal.

Edad o peso:

Desde el primer día de edad.

Condición fisiológica:

Aves sanas.

Vía administración:

Vía oral, ocular o nasal.

Modo de empleo:

La vacuna puede ser presentada como liofilizado en frasco de vidrio o como esferas liofilizadas en capsulas. En caso de que el producto este presentado en capsulas, no usar el producto si el contenido esta cafesoso y pegados al envase ya que esto indica que la integridad del envase ha sido violada. Cada envase debe ser utilizado de forma inmediata y completa después de su apertura.

○ Administración por spray:

Reconstituir la vacuna con agua limpia y fresca, a la cual se le puede añadir 2% de leche descremada. No se debe utilizar agua clorada. Los frascos deben ser abiertos bajo agua o el contenido de la capsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar el agua conteniendo la vacuna bien antes de usar. Después de la reconstitución la suspensión debe ser transparente. El agua y el aparato de aspersión deben estar libres de sedimentos, corrosión y trazas de desinfectantes o antisépticos. Idealmente el aparato debe ser solamente para propósitos de vacunación. El volumen de diluyente para la reconstitución debe ser suficiente para asegurar una distribución homogénea cuando sea aplicado como spray a las aves. Esto varía según la edad de las aves a ser vacunadas y el sistema de manejo, pero se sugiere 250 a 500 mL de agua por 1.000. La suspensión de vacuna debe ser administrada como spray de forma homogénea sobre las aves a una distancia de 30 a 40 cm, preferiblemente cuando las aves estén sentadas juntas a luz tenue. Si es aplicable, reducir o detener la ventilación para prevenir la pérdida de spray.

**APROBADO
SAG**
23-09-2020

- Administración vía instilación intranasal/intraocular:
Reconstituir la vacuna con la cantidad apropiada de Diluyente Óculo-Nasal (36 ml para 1000 dosis y 90 ml para 2500 dosis) y administrar por medio de un gotario estandarizado (donde el tamaño de la gota sea conocido y consistente). Puede ser utilizada agua destilada estéril o solución salina tamponada. La cantidad de diluyente requerida para la administración por gota en ojo o nariz depende del número de dosis y del tamaño de gota, pero se utiliza aproximadamente 35 mL por 1000 dosis. Una gota debe ser aplicada en un ollar o en un ojo. Asegurar de que la gota nasal sea inhalada antes de liberar al ave.
- Administración por el agua de bebida:
Los frascos deben ser abiertos bajo agua o el contenido de la capsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, antes de usar, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna. Después de la reconstitución la suspensión debe ser transparente. La vacuna debe ser disuelta en agua limpia y fresca, libre de hierro y cloro. AL añadir 2 g o 20 mL de leche descremada por litro de agua el virus retiene su actividad por más tiempo. Asegurar el consumo de toda el agua medicada con vacuna en 2 horas. Dependiendo de las condiciones climáticas, puede ser aconsejable restringir a las aves de agua previo a la vacunación. Es esencial un número suficiente de bebederos deben ser provistos para entregar un espacio adecuado para beber. Estos deben estar limpio de trazas de detergentes y desinfectantes. Disolver 1000 dosis en la cantidad de litros de agua según la edad de las aves en días, a un máximo de 40 litros.
La vacuna debe ser entregada a primera hora de la mañana, ya que este es el principal periodo de bebida o el periodo fresco en un día caluroso. Cuando se vacunan planteles grandes, es aconsejable empezar por disolviendo solo una parte de la vacuna. Si la vacuna es administrada a través de un suministro central de agua o un proporcionado, se debe tener gran cuidado. Para un numero de aves entre dosis estandar, se debe elegir la dosis próxima más alta.

Programa de vacunación:

El tiempo y el método óptimos para la primera administración y revacunación dependen en gran medida de la situación local, por lo que conviene consultar a un Médico Veterinario.

APROBADO
SAG
23-09-2020

d) Contraindicaciones

Ninguna.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino derivados del uso del producto inmunológico

Ocasionalmente, puede presentarse una reacción respiratoria muy leve

f) Advertencia y precauciones especiales de uso

Vacunar sólo pollos sanos

Mantener fuera del alcance de los niños

g) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores

No usar durante la postura.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con: Nobilis® Gumboro D78, Reg. SAG N° 1124-B y Nobilis® IB Ma5, Reg. SAG N° 1155-B.

i) Sobredosis

La administración de 10 veces la dosis ha demostrado ser segura, sin embargo no se recomienda sobre dosificar.

j) Período de resguardo

Cero días.

APROBADO
SAG

23-09-2020

k) Precauciones especiales para el operador

El operador debe utilizar mascarilla y lentes protectores al administrar la vacuna, ya que el virus Newcastle puede producir inflamación de los párpados en el ser humano. Debe consultar al médico ante cualquier sintomatología ocular

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente recomendado por el fabricante.

b) Período de eficacia

24 meses

Utilizar inmediatamente una vez reconstituido.

c) Condiciones de almacenamiento

Almacenar refrigerado entre 2° C y 8° C. No congelar. Proteger de la luz.

Diluyente: almacenar a temperatura ambiente (15 – 30°C)

d) Descripción de los envases

Estuche de cartulina impresa, con 10 frascos de vidrio, etiquetados, cerrados con tapón de halógeno butilo y sellados con una cápsula de aluminio codificada, conteniendo 1.000, 2.500 ó 5.000 dosis. Incluye prospecto interno.

Estuche de cartulina impresa, con 12 capsulas de aluminio laminado con una capa de contacto plástica de polipropileno selladas con tapa etiquetada de papel aluminio laminado con capa de contacto de polipropileno-polietileno, cerrada con tapa etiquetada de papel aluminio laminado con capa de contacto de polipropileno-polietileno, conteniendo 1.000, 2.500, 5.000 o 10.000 dosis. Incluye prospecto interno.

Frasco de polietileno, etiquetado, cerrado con tapón de halógeno butilo y sellado con una cápsula de aluminio codificada, conteniendo 36 o 90 ml de diluyente, para reconstituir 1.000 o 2.500 dosis respectivamente.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

**APROBADO
SAG**

23-09-2020

7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DEL LABORATORIO FABRICANTE, DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA EMPRESA LICENCIANTE

Fabricado por:

Intervet International B.V.,

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.

Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago-Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

Registro SAG N°1119-B

APROBADO
SAG
23-09-2020