

ESTUCHE 10 FRASCOS 1000 DOSIS



ESTUCHE 10 FRASCOS 2.500 DOSIS



ETIQUETA FRASCO 1.000 DOSIS

APROBADO
SAG

28-10-2020

Nobilis®

GUMBORO D78™



VACUNA VIVA GUMBORO, Cepa D78

Polvo liofilizado

1000 dosis

Fabricado por: Intervet International B.V. Holanda

Importado y distribuido por: Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 7,

Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de: Intervet
International B.V. Holanda



Administración óculo/nasal, spray ó agua
de bebida.

Conservar entre +2 y +8 °C, en la oscuridad

Manténgase fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Registro SAG N° 1124-B

105521 R1

Verificar
Serie:

fc 926.02.1 60x28mm PMS 328C Black

ETIQUETA FRASCO 2.500 DOSIS

APROBADO
SAG

28-10-2020

Nobilis®

GUMBORO D78™



VACUNA VIVA GUMBORO, Cepa D78

Polvo liofilizado

2500 dosis

Fabricado por: Intervet International B.V. Holanda

Importado y distribuido por: **Intervet Chile Ltda.**

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 7, Las
Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de: Intervet
International B.V. Holanda



Administración óculo/nasal, spray ó agua
de bebida.

Conservar entre +2 y +8 °C, en la oscuridad

Manténgase fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Registro SAG N° 1124-B

105521 R1

Verificar
Serie:

fc 926.02.1 60x28mm **PMS 328C** Black

Nobilis®

GUMBORO D78



VACUNA VIVA GUMBORO, CEPA D78
POLVO LIOFILIZADO



Descripción

Nobilis® Gumboro D78 es una vacuna viva liofilizada contra la Bursitis Infecciosa o Enfermedad de Gumboro de las aves. Cada dosis contiene como mínimo 4,0 log₁₀ TCID₅₀ de la cepa D78. El liofilizado contiene estabilizantes y sulfato de gentamicina.

Composición

Cada dosis de 1 mL contiene:
Virus Gumboro, Cepa D78 $\geq 4.0 \log_{10}$ TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 mL

**APROBADO
SAG**

28-10-2020

Especies de destino

Pollos.

Indicaciones de uso

Como ayuda en la prevención de Enfermedad de Gumboro.

Posología

Al menos 4,0 log₁₀ TCID₅₀ por animal.

Edad o Peso

A partir del día 7 a 28 por vía oral.

A partir del día 1 de edad por vía óculo-nasal o spray.

Condición fisiológica

Animales sanos.

Vía de administración

Vía oral por el agua de bebida o spray. Vía óculo-nasal por instilación.

Modo de empleo

La vacuna puede ser entregada como polvo liofilizado en frasco de vidrio o como esferas liofilizadas en capsulas. En el caso del producto presentado en capsulas, no utilizar el producto si el contenido está pegado al envase ya que esto indica que la integridad del envase ha sido violada. Cada envase debe ser utilizado inmediatamente y de forma completa después de abierto.

o Administración por spray:

La vacuna debe ser disuelta en agua en una cantidad de 1.000 dosis por litro de agua. Los frascos deben ser abiertos bajo el agua o el contenido de la cápsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna antes de utilizar. Debe ser vertida como aspersión gruesa de manera uniforme sobre el número correcto de aves a una distancia de 30 a 40 cm, preferentemente cuando las aves están todas juntas en ambiente oscuro (atardecer).

El agua a utilizar debe ser fría, limpia y libre de cloro o hierro, se puede utilizar agua destilada o purificada de uso casero. El equipo a utilizar debe estar libre de sedimentos, corrosión y trazas de desinfectantes (preferentemente de uso exclusivo para vacunas).

o Administración vía instilación intranasal/intraocular:

La vacuna debe ser disuelta en el Diluyente Óculo Nasal (usualmente 30 mL por 1.000 dosis) y administrada por medio de un gotario estandarizado. Una gota debe ser aplicada desde una altura de un par de centímetros en un ollar o un ojo. El aplicador debe asegurarse que la gota nasal sea inhalada por el ave.

o Administración por el agua de bebida:

Los frascos deben ser abiertos bajo agua o el contenido de la capsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna antes de utilizar. La vacuna debe ser disuelta en una cantidad de agua que será consumida por los animales en aproximadamente 2 horas, dependiendo de éstas y el clima, con un máximo de 40 litros. Usar agua fría, limpia, libre de cloro, hierro de trazas de detergentes y desinfectantes. Dependiendo de las condiciones climáticas, puede ser recomendable privar a las aves de agua antes de la vacunación. Es esencial contar con un número suficiente de bebederos para proveer de espacio adecuado a las aves. La vacuna debe ser administrada temprano en la mañana, ya que este es el momento más fresco de un día caluroso. Cuando se está vacunando grandes grupos de aves, es recomendable comenzar disolviendo sólo parte de la vacuna.

Programa de vacunación:

La vacuna puede administrarse a aves a partir de los 7-28 días de edad. La cepa D78 es efectiva ante el nivel de anticuerpos maternos que normalmente existe en

crías de 7-28 días de edad. El momento óptimo para la primera administración depende del nivel alcanzado por los anticuerpos maternos. En caso que el nivel de anticuerpos varíe mucho se aconseja vacunar a los pollos dos veces, con un intervalo de una semana.

Contraindicaciones

Cuando el producto se utiliza de acuerdo a las instrucciones: ninguna.

Efectos adversos o reacciones adversas

No se han descrito efectos adversos.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Vacunar sólo aves sanas.

Uso durante postura y en animales reproductores

No aplica.

Interacción con otros productos farmacéuticos

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Sobredosis

No se recomienda sobre dosificar.

Período de resguardo

Cero días.

Precauciones especiales para el operador

Lavar y desinfectar las manos y el material después de la vacunación. Evitar la exposición al virus de la vacuna lo máximo posible.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, excepto con el diluyente recomendado por el fabricante.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar refrigerado, entre 2° y 8°C. No congelar.

El diluyente se debe almacenar a temperatura ambiente (15 - 30°C).

Una vez abierto el frasco debe ser usado inmediatamente.

En caso de existir remanente, este debe ser descartado.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

**APROBADO
SAG**

28-10-2020

**Venta bajo receta Médico Veterinaria
PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA
USO VETERINARIO**

Fabricado por:

Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxtmeer,
Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes,
Santiago, Chile.

**Bajo licencia de Intervet International B.V.,
Holanda.**

Registro SAG N° 1124-B



MSD

Animal Health



Nobilis®
Gumboro D78

Vacuna viva Gumboro, cepa D78
Polvo liofilizado
Spherion®
Pollos

1 000
12x1 000 dosis



sphereon®

Ver prospecto adjunto.
Mantener refrigerado entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz. En caso de existir remanente, este debe ser descartado.

Reg. SAG N°1124-B

USO VETERINARIO
Venta bajo receta Médico Veterinaria

Fabricado por:
Intervet International B.V., Holanda.

Importado y distribuido por:
Intervet Chile Limitada - Chile
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda

**APROBADO
SAG**

28-10-2020



MSD
Animal Health



sphereon® GUÍA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN OCULAR

1

2

3

4

APLICACIÓN EN AGUA DE BEBIDA / SPRAY

1

2

3

4

356348 R3

Nobilis® GUMBORO D78

Vacuna viva Gumboro, cepa D78
Polvo liofilizado
USO VETERINARIO

Descripción
Nobilis® Gumboro D78 es una vacuna viva liofilizada contra la Bursitis Infecciosa o Enfermedad de Gumboro de las aves. Cada dosis contiene como mínimo 4,0 log₁₀ TCID₅₀ de la cepa D78. El liofilizado contiene estabilizantes y sulfato de gentamicina.

Composición
Cada dosis de 1 mL contiene:
Virus Gumboro, Cepa D78 ≥ 4,0 log₁₀ TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 mL

Especies de destino
Pollos.

Indicaciones de uso
Como ayuda en la prevención de Enfermedad de Gumboro.

Posología
Al menos 4,0 log₁₀ TCID₅₀ por animal.

Edad o Peso
A partir del día 7 a 28 por vía oral.
A partir del día 1 de edad por vía óculo-nasal o spray.

Condición fisiológica
Animales sanos.

Vía de administración
Vía oral por el agua de bebida o spray. Vía óculo-nasal por instilación.

Modo de empleo
La vacuna puede ser entregada como polvo liofilizado en frasco de vidrio o como esferas liofilizadas en capsulas. En el caso del producto presentado en capsulas, no utilizar el producto si el contenido está pegado al envase ya que esto indica que la integridad del envase ha sido violada. Cada envase debe ser utilizado inmediatamente y de forma completa después de abierto.

o Administración por spray:
La vacuna debe ser disuelta en agua en una cantidad de 1.000 dosis por litro de agua. Los frascos deben ser abiertos bajo el agua o el contenido de la cápsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna antes de utilizar. Debe ser vertida como aspersión gruesa de manera uniforme sobre el número correcto de aves a una distancia de 30 a 40 cm, preferentemente cuando las aves están todas juntas en ambiente oscuro (atardecer).
El agua a utilizar de ser fría, limpia y libre de cloro o hierro, se puede utilizar agua destilada o purificada de uso casero. El equipo a utilizar debe estar libre de sedimentos, corrosión y trazas de desinfectantes (preferentemente de uso exclusivo para vacunas).
o Administración vía instilación intranasal/intraocular:
La vacuna debe ser disuelta en el Diluyente Óculo Nasal (usualmente 30 mL por 1.000 dosis) y administrada por medio de un gotario estandarizado. Una gota debe ser aplicada desde una altura de un par de centímetros en un ollar o un ojo. El aplicador debe asegurarse que la gota nasal sea inhalada por el ave.

o Administración por el agua de bebida:
Los frascos deben ser abiertos bajo agua o el contenido de la capsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna antes de utilizar. La vacuna debe ser disuelta en una cantidad de agua que será consumida por los animales en aproximadamente 2 horas, dependiendo de éstas y el clima, con un máximo de 40 litros. Usar agua fría, limpia, libre de cloro, hierro de trazas de detergentes y desinfectantes. Dependiendo de las condiciones climáticas, puede ser recomendable privar a las aves de agua antes de la vacunación. Es esencial contar con un número suficiente de bebederos para proveer de espacio adecuado a las aves. La vacuna debe ser administrada temprano en la mañana, ya que este es el momento más fresco de un día caluroso. Cuando se está vacunando grandes grupos de aves, es recomendable comenzar disolviendo sólo parte de la vacuna.

Programa de vacunación:
La vacuna puede administrarse a aves a partir de los 7-28 días de edad. La cepa D78 es efectiva ante el nivel de anticuerpos maternos que normalmente existe en crías de 7-28 días de edad. El momento óptimo para la primera administración depende del nivel alcanzado por los anticuerpos maternos. En caso que el nivel de anticuerpos varíe mucho se aconseja vacunar a los pollos dos veces, con un intervalo de una semana.

Contraindicaciones
Cuando el producto se utiliza de acuerdo a las instrucciones: ninguna.

Efectos adversos o reacciones adversas
No se han descrito efectos adversos.

Advertencias y precauciones especiales de uso
Vacunar sólo aves sanas.

Uso durante postura y en animales reproductores
No aplica.

Interacción con otros productos farmacéuticos
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Sobredosis
No se recomienda sobre dosificar.

Período de resguardo
Cero días.

Precauciones especiales para el operador
Lavar y desinfectar las manos y el material después de la vacunación. Evitar la exposición al virus de la vacuna lo máximo posible.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos
No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, excepto con el diluyente recomendado por el fabricante.

Condiciones de almacenamiento
Almacenar refrigerado, entre 2° y 8°C. No congelar.
El diluyente se debe almacenar a temperatura ambiente (15 - 30°C).
Una vez abierto el frasco debe ser usado inmediatamente.

En caso de existir remanente, este debe ser descartado.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración
Para eliminar los envases de vacuna no utilizados o vencidos y los remanentes, se recomienda la incineración.

Venta bajo receta Médico Veterinaria
PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA
USO VETERINARIO

Fabricado por:
Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer,
Holanda.
Importado y distribuido por:
Intervet Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

Registro SAG N° 1124-B

APROBADO

SAG

28-10-2020



sphereon®

Nobilis® **Gumboro D78**

1 000

12x1 000 dosis

Serie:

F.Fab.:

Vence:

Nobilis® **Gumboro D78**

1 000

12x
1 000 dosis

Ver prospecto adjunto.

Mantener refrigerado entre 2-8°C.

No congelar. Proteger de la luz. En caso de existir
remanente, este debe ser descartado.

Reg. SAG N°1124-B



USO VETERINARIO

Venta bajo receta Médico Veterinaria

APROBADO
SAG

28-10-2020



MSD
Animal Health

397474 R2



sphereon®

Nobilis® **Gumboro D78**

1 000

12x1 000 dosis

Serie:

F.Fab.:

Vence:

APROBADO
SAG

28-10-2020

Nobilis® **Gumboro D78**

1 000

12x
1 000 dosis



sphereon®



MSD

Animal Health

379219 R1



PSB010S02 02 R1

86 x 73mm

CMYK



Nobilis®
Gumboro D78

Vacuna viva Gumboro, cepa D78
Polvo liofilizado
Pollos

2 500
12x2 500 dosis



sphereon®

Ver prospecto adjunto.
Mantener refrigerado entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz. En caso de existir remanente, este debe ser descartado.

Reg. SAG N°1124-B

USO VETERINARIO

Venta bajo receta Médico Veterinaria

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Fabricado por:

Intervet International B.V., Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada - Chile

Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda

**APROBADO
SAG**

28-10-2020



MSD

Animal Health



sphereon® **GUIA DE APLICACIÓN**

APLICACIÓN OCULAR

1

2

3

4

APLICACIÓN AGUA DE BEBIDA / SPRAY

1

2

3

4

381702 R2



MSD

Animal Health

Nobilis® Gumboro D78

Vacuna viva Gumboro, cepa D78
Polvo liofilizado
USO VETERINARIO

Descripción
Nobilis® Gumboro D78 es una vacuna viva liofilizada contra la Bursitis Infecciosa o Enfermedad de Gumboro de las aves. Cada dosis contiene como mínimo 4,0 log₁₀ TCID₅₀ de la cepa D78. El liofilizado contiene estabilizantes y sulfato de gentamicina.

Composición
Cada dosis de 1 mL contiene:
Virus Gumboro, Cepa D78 ≥ 4.0 log₁₀ TCID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 mL

Especies de destino
Pollos.

Indicaciones de uso
Como ayuda en la prevención de Enfermedad de Gumboro.

Posología
Al menos 4,0 log₁₀ TCID₅₀ por animal.

Edad o Peso
A partir del día 7 a 28 por vía oral.
A partir del día 1 de edad por vía óculo-nasal o spray.

Condición fisiológica
Animales sanos.

Vía de administración
Vía oral por el agua de bebida o spray. Vía óculo-nasal por instilación.

Modo de empleo
La vacuna puede ser entregada como polvo liofilizado en frasco de vidrio o como esferas liofilizadas en capsulas. En el caso del producto presentado en capsulas, no utilizar el producto si el contenido está pegado al envase ya que esto indica que la integridad del envase ha sido violada. Cada envase debe ser utilizado inmediatamente y de forma completa después de abierto.

◦ **Administración por spray:**
La vacuna debe ser disuelta en agua en una cantidad de 1.000 dosis por litro de agua. Los frascos deben ser abiertos bajo el agua o el contenido de la cápsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna antes de utilizar. Debe ser vertida como aspersión gruesa de manera uniforme sobre el número correcto de aves a una distancia de 30 a 40 cm, preferentemente cuando las aves están todas juntas en ambiente oscuro (atardecer).
El agua a utilizar de ser fría, limpia y libre de cloro o hierro, se puede utilizar agua destilada o purificada de uso casero. El equipo a utilizar debe estar libre de sedimentos, corrosión y trazas de desinfectantes (preferentemente de uso exclusivo para vacunas).

◦ **Administración vía instilación intranasal/intraocular:**
La vacuna debe ser disuelta en el Diluyente Óculo Nasal (usualmente 30 mL por 1.000 dosis) y administrada por medio de un gotario estandarizado. Una gota debe ser aplicada desde una altura de un par de centímetros en un ollar o un ojo. El aplicador debe asegurarse que la gota nasal sea inhalada por el ave.

◦ **Administración por el agua de bebida:**
Los frascos deben ser abiertos bajo agua o el contenido de la capsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna antes de utilizar. La vacuna debe ser disuelta en una cantidad de agua que será consumida por los animales en aproximadamente 2 horas, dependiendo de éstas y el clima, con un máximo de 40 litros. Usar agua fría, limpia, libre de cloro, hierro de trazas de detergentes y desinfectantes. Dependiendo de las condiciones climáticas, puede ser recomendable privar a las aves de agua antes de la vacunación. Es esencial contar con un número suficiente de bebederos para proveer de espacio adecuado a las aves. La vacuna debe ser administrada temprano en la mañana, ya que este es el momento más fresco de un día caluroso. Cuando se está vacunando grandes grupos de aves, es recomendable comenzar disolviendo sólo parte de la vacuna.

Programa de vacunación:
La vacuna puede administrarse a aves a partir de los 7-28 días de edad. La cepa D78 es efectiva ante el nivel de anticuerpos maternos que normalmente existe en crías de 7-28 días de edad. El momento óptimo para la primera administración depende del nivel alcanzado por los anticuerpos maternos. En caso que el nivel de anticuerpos varíe mucho se aconseja vacunar a los pollos das veces, con un intervalo de una semana.

Contraindicaciones
Cuando el producto se utiliza de acuerdo a las instrucciones: ninguna.

Efectos adversos o reacciones adversas
No se han descrito efectos adversos.

Advertencias y precauciones especiales de uso
Vacunar sólo aves sanas.

Uso durante postura y en animales reproductores
No aplica.

Interacción con otros productos farmacéuticos
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Sobredosis
No se recomienda sobre dosificar.

Período de resguardo
Cero días.

Precauciones especiales para el operador
Lavar y desinfectar las manos y el material después de la vacunación. Evitar la exposición al virus de la vacuna lo máximo posible.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos
No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, excepto con el diluyente recomendado por el fabricante.

Condiciones de almacenamiento
Almacenar refrigerado, entre 2° y 8°C. No congelar.
El diluyente se debe almacenar a temperatura ambiente (15 - 30°C).
Una vez abierto el frasco debe ser usado inmediatamente.

En caso de existir remanente, este debe ser descartado.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración
Para eliminar los envases de vacuna no utilizados o vencidos y los remanentes, se recomienda la incineración.

Venta bajo receta Médico Veterinaria
PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA
USO VETERINARIO

Fabricado por:
Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxtmeer,
Holanda.
Importado y distribuido por:
Intervet Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.
Registro SAG N° 1124-B



sphereon®
Nobilis® **Gumboro D78**

2 500
12x2 500 dosis

Serie:

F.Fab.:

Vence:

APROBADO
SAG

28-10-2020

Nobilis® **Gumboro D78**

2 500 12x
2 500 dosis



sphereon®



MSD

Animal Health

336176 R1



PSB010S02_02_R1

86 x 73mm

C M Y K

sphereon®

Nobilis® **Gumboro D78**

2 500

12x2 500 dosis

Serie:

F.Fab.:

Vence:

Nobilis® **Gumboro D78**

2 500

12x
2 500 dosis

Ver prospecto adjunto.

Mantener refrigerado entre 2-8°C. No congelar. Proteger de la luz.

En caso de existir remanente, este debe ser descartado.

Reg. SAG N°1124-B

USO VETERINARIO

Venta bajo receta Médico Veterinaria

**APROBADO
SAG**

28-10-2020



MSD
Animal Health

328550 R2




PSB010S01_03_R1

86 x 73mm

C M Y K

APROBADO
SAG

28-10-2020




PSB020S10 02 R1

37 x 37 mm

CMLK

APROBADO
SAG

28-10-2020



PSB020S10_02_R1
37 x 37 mm
CMYK

ETIQUETA DILUYENTE OCULO NASAL 1.000 DOSIS

DILUYENTE OCULO NASAL

**DILUYENTE ESTERIL PARA LA APLICACIÓN
OCULO / NASAL DE LAS VACUNAS VIVAS
LIOFILIZADAS PARA AVES
USO VETERINARIO**

1000 dosis



Disolvente tapón coloreado estéril para la vacunación de aves por método óculo / nasal. Compatible como diluyente de las siguientes vacunas Nobilis®:

Registros SAG N° 1114-B, 1119-B, 1120-B, 1124-B, 1155-B, 1158-B, 1356-B, 2008-B.

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Almacenar a temperatura ambiente (15° - 30°C).

Fabricado por: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.

Mariano Sánchez Fontecilla No 310, Piso 8,
Las Condes. Santiago-Chile

Bajo licencia de: Intervet International B.V.
Holanda.

**APROBADO
SAG**

28-10-2020

Serie: / Elab.: / Vence:

ETIQUETA DILUYENTE OCULO NASAL 2.500 DOSIS

DILUYENTE OCULO NASAL

**DILUYENTE ESTERIL PARA LA APLICACIÓN
OCULO / NASAL DE LAS VACUNAS VIVAS
LIOFILIZADAS PARA AVES
USO VETERINARIO**

2500 dosis



Disolvente tapón coloreado estéril para la vacunación de aves por método óculo / nasal. Compatible como diluyente de las siguientes vacunas Nobilis®:

Registros SAG N° 1114-B, 1119-B, 1120-B, 1124-B, 1155-B, 1158-B, 1356-B, 2008-B.

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Almacenar a temperatura ambiente (15° - 30°C).

Fabricado por: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.

Mariano Sánchez Fontecilla No 310, Piso 8,
Las Condes. Santiago-Chile

Bajo licencia de: Intervet International B.V.
Holanda.

Serie: / Elab.: / Vence:

**APROBADO
SAG**

28-10-2020

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

a) Nombre de fantasía

Nobilis® Gumboro D78

b) Nombre genérico

Vacuna viva Gumboro, cepa D78

c) Forma farmacéutica

Polvo liofilizado

2. COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1 mL contiene:

Virus Gumboro, Cepa D78	$\geq 4.0 \log_{10} \text{TCID}_{50}$
Excipientes c.s.p.	1 mL

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la enfermedad de Gumboro.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

a) Especies de destino

Pollos.

APROBADO
SAG
28-10-2020

b) Indicaciones de uso

Como ayuda en la prevención de Enfermedad de Gumboro.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo

Posología:

Al menos $4,0 \log_{10} \text{TCID}_{50}$ por animal.

Edad o Peso:

A partir del día 7 a 28 por vía oral.

A partir del día 1 de edad por vía oculo-nasal o spray.

Condición fisiológica:
Animales sanos.

**APROBADO
SAG**

Vía de administración:

28-10-2020

Vía oral por el agua de bebida o spray. Vía óculo-nasal por instilación.

Modo de empleo:

La vacuna puede ser entregada como polvo liofilizado en frasco de vidrio o como esferas liofilizadas en capsulas. En el caso del producto presentado en capsulas, no utilizar el producto si el contenido esta pegado al envase ya que esto indica que la integridad del envase ha sido violada. Cada envase debe ser utilizado inmediatamente y de forma completa después de abierto.

○ Administración por spray:

La vacuna debe ser disuelta en agua en una cantidad de 1.000 dosis por litro de agua. Los frascos deben ser abiertos bajo el agua o el contenido de la cápsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna antes de utilizar. Debe ser vertida como aspersión gruesa de manera uniforme sobre el número correcto de aves a una distancia de 30 a 40 cm, preferentemente cuando las aves están todas juntas en ambiente oscuro (atardecer).

El agua a utilizar de ser fría, limpia y libre de cloro o hierro, se puede utilizar agua destilada o purificada de uso casero. El equipo a utilizar debe estar libre de sedimentos, corrosión y trazas de desinfectantes (preferentemente de uso exclusivo para vacunas).

○ Administración vía instilación intranasal/intraocular:

La vacuna debe ser disuelta en el Diluyente Óculo Nasal (usualmente 30 mL por 1.000 dosis) y administrada por medio de un gotario estandarizado. Una gota debe ser aplicada desde una altura de un par de centímetros en un ollar o un ojo.

El aplicador debe asegurarse que la gota nasal sea inhalada por el ave.

○ Administración por el agua de bebida:

Los frascos deben ser abiertos bajo agua o el contenido de la capsula debe ser vertido en agua. En ambos casos, mezclar bien el agua conteniendo la vacuna antes de utilizar.

La vacuna debe ser disuelta en una cantidad de agua que será consumida por los animales en aproximadamente 2 horas, dependiendo de éstas y el clima, con un máximo de 40 litros.

Usar agua fría, limpia, libre de cloro, hierro de trazas de detergentes y desinfectantes. Dependiendo de las condiciones climáticas, puede ser recomendable privar a las aves de agua antes de la vacunación. Es esencial contar con un número suficiente de bebederos para proveer de espacio adecuado a las aves.

La vacuna debe ser administrada temprano en la mañana, ya que este es el momento más fresco de un día caluroso. Cuando se está vacunando grandes grupos de aves, es recomendable comenzar disolviendo sólo parte de la vacuna.

Programa de vacunación:

La vacuna puede administrarse a aves a partir de los 7-28 días de edad.

La cepa D78 es efectiva ante el nivel de anticuerpos maternos que normalmente existe en crías de 7-28 días de edad. El momento óptimo para la primera administración depende del nivel alcanzado por los anticuerpos maternos. En caso de que el nivel de anticuerpos varíe mucho se aconseja vacunar a los pollos dos veces, con un intervalo de una semana.

d) Contraindicaciones

Cuando el producto se utiliza de acuerdo a las instrucciones: ninguna.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino derivados del uso del producto inmunológico

No se han descrito efectos adversos.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso

Vacunar sólo aves sanas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

APROBADO
SAG
28-10-2020

g) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores

No aplica.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis

No se recomienda sobre dosificar.

APROBADO
SAG
28-10-2020

j) Período de resguardo

Cero días.

k) Precauciones especiales para el operador

Lavar y desinfectar las manos y el material después de la vacunación.
Evitar la exposición al virus de la vacuna lo máximo posible.

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS**a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, excepto con el diluyente recomendado por el fabricante.

b) Período de eficacia

24 meses.

Una vez abierto el frasco debe ser usado inmediatamente.

En caso de existir remanente, este debe ser descartado.

c) Condiciones de almacenamiento

Almacenar refrigerado, entre 2° y 8°C. No congelar.

El diluyente se debe almacenar a temperatura ambiente (15 – 30°C)

d) Descripción de los envases

Estuche de cartulina impresa, con 10 frascos de vidrio tipo I (Ph. Eur.), etiquetados, cerrados con tapón de goma halógenobutilo y sellados con una cápsula de aluminio codificada, conteniendo 1.000, 2.500, 3.000, 5.000 ó 10.000 dosis de vacuna. Incluye prospecto interno.

Estuche de cartulina impresa, con 12 capsulas de papel aluminio laminado con una capa de contacto de polipropileno, cerrada con tapa etiquetada de papel aluminio laminado con capa de contacto de polipropileno-polietileno conteniendo 1.000, 2.500, 5.000 y 10.000 dosis. Incluye prospecto interno. Frascos de diluyente óculo nasal para la presentación de 1000 y 2500 dosis.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DEL LABORATORIO FABRICANTE Y DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA EMPRESA LICENCIANTE

FABRICADO POR:

Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer,
Holanda.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

Registro SAG N° 1124-B