

Nobilis®
AE+POX
1000 dosis+diluyente

MSD
Animal Health

**APROBADO
SAG**

24 NOV 2019

179542 R1

Nobilis®
AE+POX

1000 dosis+diluyente

Vacuna viva Encefalomielitis Aviar y Difterioviruela Aviar

Composición:

Cada dosis reconstituida contiene:
Virus Encefalomielitis aviar, cepa Calnek 1143 $\geq 10^{4.8}$ EID₅₀
Virus Pox aviar, cepa Gibbs $\geq 10^{1.8}$ EID₅₀
Excipientes c.s.p. 1 dosis

USO VETERINARIO

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta bajo receta Médico Veterinario

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar en la oscuridad entre
2° y 8°C. No congelar.

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Koevstraat 35,
5831 AN Boxtmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:
Intervet Chile Limitada.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310
piso 5, Los Cordes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de
Intervet International B.V., Holanda.



PSA020031 01 R1
59x37x82mm
C M Y K

Nobilis®
AE+POX

VACUNA VIVA ENCEFALOMIELITIS AVIAR Y DIFTERIOVIRUELA AVIAR

Pólvo liofilizado

INCLUYE AGUIA APLICADORA Y CONECTOR

1000 dosis+diluyente



Nobilis®
AE+POX

1000 dosis+diluyente

Periodo de resguardo: Cero días.
**Indicaciones de uso, posología,
vía y método de administración:**
ver prospecto interno.

Registro SAG N°: 11483



Imprint area
Varnish Free

Serie / Ebb. / Vence:

**APROBADO
SAG**

24 NOV 2019

Nobilis®

AE+POX

**VACUNA VIVA ENCEFALOMIELITIS AVIAR Y
DIFTEROVIRUELA AVIAR**

Polvo liofilizado

1000 dosis

Fabricado por: Intervet International B.V., Holanda
Importado y Distribuido por: Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5 Las
Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de:

Intervet International B.V., Holanda



Vacuna viva Encefalomielitis
Aviar y Difteroviruela Aviar en
pollos y pavos

Método membrana de ala

Conservar en lugar oscuro entre
2° y 8°C. No congelar.

USO VETERINARIO

Registro SAG N°: 1148-B



Animal Health

Imprint
Area

Vence:

Elab.:

Serie:

196001 R1

PSB120926_01_R1
60 x 28 mm

APROBADO

SAG

24 NOV 2019

13 ml (1000 dosis)

DILUYENTE UNISOLVE

DILUYENTE ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR VACUNAS

USO VETERINARIO

**USO: VER INSTRUCCIONES DE LA VACUNA EN
PROSPECTO INTERNO**

**Mantener refrigerado entre 2° y 8°C.
No congelar.**

**VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Registro SAG N° 1148-B.

Fabricado por:
Intervet International B.V. Holanda
Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5,
Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de:
Intervet International B.V.
Holanda



Animal Health

Imprint
Area

Serie: / Elab.: / Vence:

198063 R1

PSB120916_01_R1
76 x 30 mm

190539 R1

Nobilis®

AE+POX



VACUNA VIVA ENCEFALOMIELITIS AVIAR
Y DIFTEROVIRUELA AVIAR



Polvo liofilizado

USO VETERINARIO

**APROBADO
SAG**

24 NOV 2019

Composición:

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Encefalomiélitis aviar, cepa Calnek 1143..... $\geq 10^{1,8}$ EID₅₀
Virus Pox aviar, cepa Gibbs..... $\geq 10^{1,8}$ EID₅₀
Excipientes c.s.p..... 1 dosis

Indicaciones de uso:

Como ayuda en la prevención de la Difteroviruela Aviar en las aves vacunadas y de la Encefalomiélitis Aviar en la progenie de las aves vacunadas.

Posología, vía y método de administración:

Al menos 2,5 log₁₀ EID₅₀ de virus AE y al menos 2,8 log₁₀ EID₅₀ de virus Pox aviar.
Aplicar la vacuna por punción en el pliegue del ala (método membrana del ala) utilizando el aplicador suministrado.
No vacunar durante los 28 días previos al comienzo de la postura ni durante ésta.

Preparación de la vacuna:

Un frasco de vacuna (500 ó 1000 dosis) debe ser reconstituido con el contenido de 1 frasco (5 ó 13 ml) de diluyente inmediatamente antes del uso. El aplicador debe ser sumergido dentro de la vacuna y luego aplicado por punción en el pliegue del ala desde abajo. Se deben evitar las zonas del ala con plumas.

Alrededor de 7-10 días después de la vacunación, se deben examinar algunas aves para verificar la "respuesta" a la vacunación. Una respuesta satisfactoria incluye inflamación de la piel y formación de una costra en el punto de la vacunación. Las costras normalmente se caen 2-3 semanas después de la vacunación.

La protección total se establece tres semanas después de la vacunación.

Vacunación combinada con Nobilis® CAV P4, Reg. SAG N° 007-B:

Reconstituir la vacuna Nobilis AE+POX usando el diluyente Dilavia, 10 ml por 1000 dosis. Luego inyectar asépticamente este contenido en un frasco de Nobilis CAV P4 de 1000 dosis. La vacuna está lista para ser usada.

El aplicador debe ser sumergido dentro de la vacuna y luego aplicado por punción en el pliegue del ala desde abajo. Se deben evitar las zonas del ala con plumas.

Programas de vacunación:

Los pollos deben ser vacunados entre 8 y 16 semanas de edad.

Los pavos deben ser vacunados entre 18 y 26 semanas de edad.

La vacunación con Nobilis® AE+POX puede combinarse con la vacuna viva modificada contra la Anemia Aviar Nobilis® CAV P4 (Reg. SAG N° 007-B).

Período de resguardo:

Cero días.

**APROBADO
SAG**

24 NOV 2019

Contraindicaciones:

No usar durante la postura.

Precauciones especiales para el operador:

Para el usuario:

Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación a un dedo, y en casos raros, puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato.

Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted. Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez.

Para el médico:

Este producto contiene aceite mineral. Aunque se hayan inyectado pequeñas cantidades, una inyección accidental con este producto puede causar una inflamación intensa, que puede resultar, por ejemplo, en necrosis isquémica e incluso la pérdida de un dedo. Se requiere atención quirúrgica experta de inmediato y se podría necesitar de una incisión temprana e irrigación del área inyectada, especialmente donde se involucra la pulpa o tendón de los dedos.

Condiciones de almacenamiento:

Conservar en la oscuridad entre 2 y 8°C. No congelar.

Interacciones:

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Nobilis® CAV P4, Reg. SAG N°007-B.

Incompatibilidades:

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, excepto con el diluyente que forma parte de este producto.

Uso durante postura:

No usar durante la postura.

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Mantener fuera del alcance de los niños.

Reg. SAG N° 1148-B

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5,
Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

a) Nombre de fantasía

Nobilis® AE+POX

b) Nombre genérico

Vacuna viva Encefalomiелitis Aviar y Difteroviruela Aviar.

c) Forma farmacéutica

Polvo Liofilizado



24 NOV 2019

2. COMPOSICIÓN

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Encefalomiелitis Aviar, Cepa Calnek 1143

≥ 10^{1,8} EID₅₀

Virus Pox Aviar, Cepa Gibbs

≥ 10^{1,8} EID₅₀

Excipientes c.s.p.

1 dosis

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra Virus Pox y para otorgar inmunidad pasiva a la progenie contra Virus Encefalomiелitis Aviar.

La inmunidad protectora contra virus Pox se establece 3 semanas después de la vacunación.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

a) Especies de destino

Pollas de reemplazo, Pavos

b) Indicaciones de uso

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Difteroviruela Aviar en las aves vacunadas y para otorgar inmunidad pasiva a la progenie contra el virus de la Encefalomiелitis Aviar.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo

Dosis:

0,01 mL

**APROBADO
SAG**

24 NOV 2019

Vía de administración:

Punción en el pliegue del ala, utilizando el aplicador suministrado.

Programas de vacunación:

Dosis única.

Los pollos deben ser vacunados entre las 8 y 16 semanas de edad.

Los pavos deben ser vacunados entre las 18 y 26 semanas de edad.

Modo de empleo:

Preparación de la vacuna:

- Un frasco de vacuna conteniendo 500 ó 1000 dosis debe ser reconstituido con el 5 ó 13 ml de diluyente, respectivamente, utilizando el conector proporcionado, inmediatamente antes del uso.
- El aplicador debe ser sumergido dentro de la vacuna y luego aplicado por punción en el pliegue del ala desde abajo. Se deben evitar las zonas del ala con plumas.
- Alrededor de 7-10 días después de la vacunación, se deben examinar algunas aves para verificar "respuesta" a la vacunación.
- Una respuesta satisfactoria incluye inflamación de la piel y formación de una costra en el sitio de inoculación.
- Las costras normalmente se caen 2-3 semanas después de la vacunación.

Vacunación combinada con Nobilis® CAV P4, Reg. SAG N° 007-B

- Reconstituir la vacuna Nobilis® AE+POX usando el diluyente Dilavia, 10 ml por 1000 dosis. Luego inyectar asépticamente este contenido en un frasco de Nobilis CAV P4 de 1000 dosis. La vacuna está lista para ser usada.
- El aplicador debe ser sumergido dentro de la vacuna y luego aplicado por punción en el pliegue del ala desde abajo. Se deben evitar las zonas del ala con plumas.

d) Contraindicaciones

No usar durante la postura.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino derivados del uso del producto inmunológico

No se han descrito.

f) Advertencia y precauciones especiales de uso

No vacunar durante los 28 días previos al inicio de la postura.

Mantener fuera del alcance de los niños

g) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores

No usar durante la postura.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Nobilis® CAV P4, Registro SAG N° 007-B.

i) Sobredosis

La administración de 10 veces la dosis ha demostrado ser segura, sin embargo no se recomienda sobre dosificar.

j) Período de resguardo

Cero días.

k) Precauciones especiales para el operador

Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación a un dedo, y en casos raros, puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato.

Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato, aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el prospecto interno del producto con usted.

Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica nuevamente.

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS

**APROBADO
SAG**

24 NOV 2019

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, excepto con el diluyente que forma parte de este producto y con la vacuna Nobilis® CAV P4 Reg. SAG N°007-B, con la cual puede ser administrada en forma combinada.

b) Período de eficacia

24 meses

Utilizar inmediatamente una vez reconstituido.

c) Condiciones de almacenamiento

Almacenar refrigerado entre 2° C y 8° C. No congelar. Proteger de la luz.

d) Descripción de los envases:

Estuche de cartulina impresa, con 1 frasco de vidrio tipo I (Ph. Eur), etiquetado, cerrado con tapón de halógeno butilo y sellado con una cápsula de aluminio de color y codificada, conteniendo 500 ó 1.000 dosis y 1 frasco de vidrio o de polietileno de baja densidad, etiquetado, cerrado con tapón de halógeno butilo y sello de aluminio, conteniendo 5 ó 13 ml de diluyente.

Incluye prospecto interno, conector y aplicador.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

**7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DEL LABORATORIO FABRICANTE,
DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA
EMPRESA LICENCIANTE**

Fabricado por

Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.

**APROBADO
SAG**

24 NOV 2019

Importado y distribuido por

Intervet Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago-Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

Registro SAG N°1148-B