

Nobilis®

IB+ND+EDS



VACUNA INACTIVADA CONTRA BRONQUITIS INFECCIOSA,
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y SÍNDROME DE CAÍDA DE POSTURA.
Emulsión inyectable
Pollos
USO VETERINARIO

CONTENIDO: 12 frascos de 500 mL (1000 dosis)

APROBADO
SAG

03-12-2024



Composición: cada dosis de 0,5 mL contiene: Virus Bronquitis Infecciosa, cepa M41 Massachusetts $\geq 6 \log_2$ unidades HI; Virus Newcastle, cepa Clone 30 $\geq 50 \text{ PD}_{50}$ y Adenovirus Aviar (EDS'76), cepa BC14 $\geq 6,5 \log_2$ unidades HI. Excipientes c.s.p. 0,5 mL
Condiciones de almacenamiento: Almacenar entre 2° - 8°C. No congelar. Mantener fuera del alcance de los niños.
Contraindicaciones: No vacunar durante la postura.

LEER INSERTO ANTES DE USAR
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIO
PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Fabricado por: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda. **Importado y distribuido por:** Intervet Chile Ltda., Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. Reg. SAG N°1149-B



Serie: / Elab.: / Vence:

Imprint
Area

PSB020S05 01 R1 148x48 mm PMS328+black


ESTUCHE
1x500 mL (1000 dosis)**Nobilis® IB+ND+EDS**

Vacuna inactivada contra Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de Caída de Postura.

Emulsión inyectable

CONTENIDO: 500 mL (1000 dosis)

USO VETERINARIO
Reg. SAG N°1149-B

**Composición:**

Cada dosis de 0,5 mL contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, cepa M41 Massachusetts..... $\geq 6 \log_2$ unidades HI

Virus Newcastle, cepa Clone 30..... $\geq 50 \text{ PD}_{50}$

Adenovirus Aviar (EDS'76), cepa BC14..... $\geq 6,5 \log_2$ unidades HI

Excipientes c.s.p. 0,5 mL

Inactivante: Formaldehído.

Adyuvante: Parafina líquida.

Indicaciones de uso:

Como ayuda en la prevención de Bronquitis Infecciosa Massachusetts, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de caída de Postura en ponedoras y reproductoras.

Especies de destino:

Pollos

Dosis:

Cada ave debe recibir 0,5 mL de vacuna.

Edad o peso:

Aves a las 16-20 semanas de edad, pero no menos de 4 semanas antes de la fecha probable del comienzo de la postura.

Condición fisiológica:

Aves sanas.

Vía de administración:

Vía intramuscular en los músculos de la pierna o pecho o por vía subcutánea en la parte inferior del cuello.

Modo de empleo:

Antes de usar la vacuna, permita que esta vacuna alcance la temperatura ambiente (15°C - 25°C).

Agite bien antes de usar. Administrar de forma aséptica, utilizando equipo de inyección estéril.



Uso durante postura y en animales reproductores:

No usar durante la postura.

Período de resguardo:

Cero días.

Condiciones de almacenamiento:


Almacenar entre 2° - 8°C. No congelar.

Los frascos abiertos deben ser usados dentro de 3 horas.

LEER INSERTO ANTES DE USAR

Mantener fue del alcance de los niños.

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIO



Fabricado por:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes,
Santiago – Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

Serie:

F. Fab.:

Vence:

Nobilis®

IB+ND+EDS



VACUNA INACTIVADA CONTRA BRONQUITIS INFECCIOSA, ENFERMEDAD DE
NEWCASTLE Y SÍNDROME DE CAÍDA DE POSTURA.
Emulsión inyectable

500 mL (1000 dosis)

Fabricado por: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda.

Importado y distribuido por: Intervet Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de: Intervet International B.V., Holanda.



Especie destino: Pollos.

Composición: cada dosis de 0,5 mL contiene: Virus Bronquitis Infecciosa, cepa M41 Massachusetts $\geq 6 \log_2$ unidades HI; Virus Newcastle, cepa Clone 30 $\geq 50 \text{ PD}_{50}$ y Adenovirus Aviar (EDS'76), cepa BC14 $\geq 6,5 \log_2$ unidades HI. Excipientes c.s.p. 0,5 mL. Inactivante: Formaldehído.

Adyuvante: Parafina líquida.

Dosis, vía de administración y modo de empleo: ver inserto o prospecto interno.

Indicaciones, Contraindicaciones, Efectos adversos, Interacciones con otros productos, Precauciones para el operador, Precauciones para la disposición: ver inserto o prospecto interno.

Período de resguardo: Cero días.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar entre 2° - 8°C. No congelar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Reg. SAG N°1149-B

USO VETERINARIO

Venta bajo receta Médico Veterinaria

Serie: / Elob.: / Vence:

Imprint
Area

**APROBADO
SAG**

03-12-2024

PSB020S05 01 R1 148x48 mm **PMS328+black**

INSERTO

Nobilis®

IB+ND+EDS

218081 R4



VACUNA INACTIVADA CONTRA BRONQUITIS INFECCIOSA, ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y SÍNDROME DE CAÍDA DE POSTURA.



EMULSIÓN INYECTABLE

Composición:

Cada dosis de 0,5 mL contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa M41 Massachusetts	≥6 log ₂ unid. HI
Virus Newcastle, Cepa Clone 30	≥50 PD ₅₀
Adenovirus aviar (EDS´76), Cepa BC14	≥6,5 log ₂ unid. HI
Excipientes c.s.p	0,5 mL
Inactivante: Formaldehído	
Adyuvante: Parafina líquida	

APROBADO
SAG

03-12-2024

Especie de destino:

Pollos.

Indicaciones de uso:

Como ayuda en la prevención de Bronquitis Infecciosa Massachusetts, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de Caída de Postura en ponedoras y reproductoras.

Dosis:

Cada ave debe recibir 0,5 mL de vacuna.

Edad o peso:

Aves a las 16-20 semanas de edad, pero no menos de 4 semanas antes de la fecha probable del comienzo de la postura.

Condición fisiológica:

Aves sanas

Vías de administración:

Vía intramuscular en los músculos de la pierna o pecho o por vía subcutánea en la parte inferior del cuello.

Modo de empleo:

Antes de usar la vacuna, permita que esta vacuna alcance la temperatura ambiente (15° C - 25°C).

Agite bien antes de usar.

Administrar de forma aséptica, utilizando equipo de inyección estéril.

Programa de vacunación:

Nobilis® IB+ND+EDS debe ser aplicada a las aves a las 16-20 semanas de edad pero no menos de 4 semanas antes de la fecha probable del comienzo de la postura.

Para un efecto booster óptimo, las aves deben ser primovacunadas con vacunas vivas contra Bronquitis Infecciosa y la Enfermedad de Newcastle.

Los mejores resultados serán obtenidos si la vacunación con vacunas inactivadas se realiza 6 o más semanas después de la administración de la primovacunación viva.

Contraindicaciones

No vacunar durante la postura.

Efectos o reacciones adversas

Puede observarse una ligera inflamación en el lugar de la inyección o una reacción tisular local durante las semanas siguientes a la vacunación.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Mantener fuera del alcance de los niños.

Uso durante postura y en animales reproductores

No usar durante la postura.

Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Sobredosis

La administración del doble de la dosis ha demostrado ser segura, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

Período de resguardo

Cero días.

Precauciones especiales para el operador

Para el operador:

Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar dolor intenso e hinchazón, especialmente si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos raros podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se brinda atención médica inmediata. Si accidentalmente se inyecta este producto, busque atención médica inmediata, incluso si solo se inyecta una cantidad muy pequeña, y lleve el inserto con usted. Si el dolor persiste durante más de 12 horas después del examen médico, busque atención médica nuevamente.

Información para el médico:

Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede provocar una hinchazón intensa que puede provocar, por ejemplo, necrosis isquémica e incluso la pérdida de un dedo. Se requiere atención quirúrgica experta, INMEDIATA, y puede requerir una incisión temprana e irrigación del área inyectada, especialmente cuando hay afectación de la pulpa del dedo o del tendón.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar entre 2° - 8°C. No congelar.

Los frascos abiertos deben ser usados dentro de 3 horas.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Fabricado por:

Intervet International B.V.,

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,

Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

Mantener fuera del alcance de los niños

USO VETERINARIO

Reg. SAG N°1149-B



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

a) Nombre de fantasía

Nobilis® IB+ND+EDS

b) Nombre genérico

Vacuna inactivada Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de Caída de Postura.

c) Forma farmacéutica

Emulsión inyectable.

APROBADO
SAG
24-10-2025

2. COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0,5 mL contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa M41 Massachusetts	≥6 log ₂ unid. HI
Virus Newcastle, Cepa Clone 30	≥50 PD ₅₀
Adenovirus aviar (EDS´76), Cepa BC14	≥6,5 log ₂ unid. HI
Excipientes c.s.p	0,5 mL

Inactivante: Formaldehído

Adyuvante: Parafina líquida

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra Virus Bronquitis Infecciosa, Virus Newcastle y Adenovirus aviar.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

a) Especies de destino

Pollos.

b) Indicaciones de uso

Como ayuda en la prevención de Bronquitis Infecciosa Massachusetts, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de Caída de Postura en ponedoras y reproductoras.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo

Programa de vacunación recomendado:

Nobilis® IB+ND+EDS debe ser aplicada a las aves a las 16-20 semanas de edad pero no menos de 4 semanas antes de la fecha probable del comienzo de la postura.

Para un efecto booster óptimo, las aves deben ser primovacunadas con vacunas vivas contra Bronquitis Infecciosa y la Enfermedad de Newcastle.

Los mejores resultados serán obtenidos si la vacunación con vacunas inactivadas se realiza 6 o más semanas después de la administración de la primovacuna viva.

Dosis y administración:

Cada ave debe recibir 0,5 mL de vacuna vía intramuscular en los músculos de la pierna o pecho o por vía subcutánea en la parte inferior del cuello.

Modo de empleo:

Antes de usar la vacuna, permita que esta vacuna alcance la temperatura ambiente (15° C – 25°C).

Agite bien antes de usar.

Administrar de forma aséptica, utilizando equipo de inyección estéril.

d) Contraindicaciones

No vacunar durante la postura.

e) Efectos adversos y reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino derivados del uso del producto inmunológico

Puede observarse una ligera inflamación en el lugar de la inyección o una reacción tisular local durante las semanas siguientes a la vacunación.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso

Mantener fuera del alcance de los niños.

g) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores

No usar durante la postura.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis

La administración del doble de la dosis ha demostrado ser segura, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) Período de resguardo

Cero días.

APROBADO
SAG
24-10-2025

k) Precauciones especiales para el operadorPara el operador:

Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar dolor intenso e hinchazón, especialmente si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos raros podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se brinda atención médica inmediata. Si accidentalmente se inyecta este producto, busque atención médica inmediata, incluso si solo se inyecta una cantidad muy pequeña, y lleve el inserto con usted. Si el dolor persiste durante más de 12 horas después del examen médico, busque atención médica nuevamente.

Información para el médico:

Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede provocar una hinchazón intensa que puede provocar, por ejemplo, necrosis isquémica e incluso la pérdida de un dedo. Se requiere atención quirúrgica experta, INMEDIATA, y puede requerir una incisión temprana e irrigación del área inyectada, especialmente cuando hay afectación de la pulpa del dedo o del tendón.

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS**a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

b) Período de eficacia

24 meses.

Los frascos abiertos deben ser usados dentro de 3 horas.


c) Condiciones de almacenamiento

Mantener refrigerado, entre 2° C y 8° C. No congelar.

d) Descripción de los envases

Caja etiquetada, con 12 frascos de vidrio hidrolítico Tipo II o de polietileno tereftalato (PET), etiquetados, cerrados con un tapón de goma nitrilo y sellados con tapa de aluminio, conteniendo 500 mL, equivalente a 1.000 dosis. Incluye inserto.

Estuche de cartulina impreso, con 1 frasco de vidrio hidrolítico Tipo II o de polietileno tereftalato (PET), etiquetado, cerrado con un tapón de goma nitrilo y sellado con tapa de aluminio, conteniendo 500 mL, equivalente a 1.000 dosis. Incluye inserto.



e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.


6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DEL LABORATORIO FABRICANTE Y DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA EMPRESA LICENCIANTE

Fabricado por:

Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda.



Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

Mantener fuera del alcance de los niños

Registro SAG N° 1149-B