

ETQ COF. C. BROILER ND K 5x100ML CL CEVAC BROILER ND K 100 ML CHILI
100X210/2C
CODE ARTICLE : 00000 ID : 51050
P. BLACK
P. 299 Texte : 6 pts

OLIVIER 27/03/17 - 28/03/17

CEVAC® BROILER ND K

Vacuna inactivada contra
Enfermedad de Newcastle (ND)
Para la inmunización de pollos

CEVAC® BROILER ND K

Vacuna inactivada contra
Enfermedad de Newcastle (ND)
Para la inmunización de pollos

APROBADO
SAG
17-04-2024

5x100 ml/
**5x1000
dosis**



5x100 ml/
**5x1000
dosis**



Emulsión Inyectable

COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene: Virus Newcastle, Cepa NDV-"SZ", LaSota $\geq 50 \text{ PD}_{50}$
Excipientes csp 0,1 mL
Preservante: Timerosal

Ayudante oleoso

INDICACIÓN DE USO

Como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Newcastle, en pollos a partir del 1er día de edad y en la progenie de las aves vacunadas.

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosis: 0,1 mL/ave

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: dosis única. Las gallinas de postura y reproductoras pueden ser revacunadas entre la 6ª y 8ª semanas de edad.

Edad o peso: a partir del primer día de edad.

Condición fisiológica: aves sanas.

Vía de administración: subcutánea (bajo la piel del cuello) o intramuscular (pechuga o muslo).

Modo de empleo: permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de aplicar. Agitar antes y durante la administración. Administrar en forma aséptica.

ESPECIE DE DESTINO

Pollos broilers, gallinas de postura y reproductoras.

EFFECTOS NO DESEADOS O REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente se puede presentar una reacción local inflamatoria en el punto de inoculación, la cual desaparece esporádicamente, sin necesidad de tratamiento. Precauciones para la disposición del producto.

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados. Precauciones para el operador.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

Interacción con otros productos farmacéuticos.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No administrar durante la postura.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días.

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz.

Reg. SENASAG PUV-B No.: 001335/2006

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG No.: 1933-B

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y

AV. America - Quito

Reg. AGROCALIDAD N° : 4A-10254-SESA

Médico Veterinario Responsable : Vladimir Egas

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta exclusiva al profesional veterinario

Utilizar el contenido completo una vez abierto el envase.

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. -

1107 Budapest - Hungría

**USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

Fecha
de fab.
Serie No.:
Fecha
del env.

ETQ OUTRE CEVAC BROILER ND K
500ML CL
80x170/2C
CODE ARTICLE : 00000
BLACK
299

CEVAC BROILER ND K 500ML CHILI
ID : 51049
CORPS : 6 pts

OLIVIER 27/03/17 - 28/03/17

APROBADO
SAG
17-04-2024

**CEVAC®
BROILER ND K**

Vacuna inactivada contra
Enfermedad de Newcastle (ND)
Para la inmunización de pollos

00000

100 ml/
1000
dosis



Emulsión Inyectable

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Virus Newcastle, Cepa NDV-"SZ", LaSota ≥ 50 PD₅₀

Excipientes csp 0,1 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante oleoso

INDICACIÓN DE USO

Como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Newcastle, en pollos a partir del 1er día de edad y en la progenie de las aves vacunadas.

ESPECIE DE DESTINO

Pollos broilers, gallinas de postura y reproductoras.

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO.

Dosis: 0,1 ml/ave. Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: dosis única. Las gallinas de postura y reproductoras pueden ser revacunadas entre la 6ª y 8ª semanas de edad. Edad o peso: a partir del primer día de edad.

Condición fisiológica: aves sanas. Vía de administración: subcutánea (bajo la piel del cuello) o intramuscular (pechuga o muslo). Modo de empleo: permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de aplicar. Agitar antes y durante la administración. Administrar en forma aséptica.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO.

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS NO DESEADOS O REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente se puede presentar una reacción local inflamatoria en el punto de inoculación, la cual desaparece esporádicamente, sin necesidad de tratamiento.

Precauciones para la disposición del producto.

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Precauciones para el operador.

**USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

Interacción con otros productos farmacéuticos.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

CONTRAINDICACIONES

No administrar durante la postura.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L, Santa Cruz.

Reg. SENASAG PUV-B No.: 001335/2006

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG No.: 1933-B

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y AV. America - Quito

Reg. AGROCALIDAD N° : 4A-10254-SESA

Médico Veterinario Responsable : Vladimir Egas

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta exclusiva al profesional veterinario

Utilizar el contenido completo una vez abierto el envase.

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. -

1107 Budapest - Hungría

Fecha
de Exp.:
Serie No.:
Fecha
de Exp.:

CEVAC® BROILER ND K

Vacuna inactivada contra
Enfermedad de Newcastle (ND)
Para la inmunización de pollos

5x500 ml/
**5x5000
dosis**



CEVAC® BROILER ND K

Vacuna inactivada contra
Enfermedad de Newcastle (ND)
Para la inmunización de pollos

5x500 ml/
**5x5000
dosis**



58675-04

Emulsión Inyectable

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Virus Newcastle, Cepa NDV-"SZ", LaSota $\geq 50 \text{ PD}_{50}$

Excipientes csp 0,1 mL

Preservante: Timerosal

Adyuvante oleoso

INDICACIÓN DE USO

Como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Newcastle, en pollos a partir del 1er día de edad y en la progenie de las aves vacunadas.

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosis: 0,1 ml/ave

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: dosis única. Las gallinas de postura y reproductoras pueden ser revacunadas entre la 6ª y 8ª semanas de edad.

Edad o peso: a partir del primer día de edad.

Condición fisiológica: aves sanas.

Vía de administración: subcutánea (bajo la piel del cuello) o intramuscular (pechuga o muslo).

Modo de empleo: permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de aplicar. Agitar antes y durante la administración. Administrar en forma aséptica.

ESPECIE DE DESTINO

Pollos broilers, gallinas de postura y reproductoras.

EFFECTOS NO DESEADOS O REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente se puede presentar una reacción local inflamatoria en el punto de inoculación, la cual desaparece esporádicamente, sin necesidad de tratamiento.

Precauciones para la disposición del producto.

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Precauciones para el operador.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

USO VETERINARIO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacción con otros productos farmacéuticos.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

CONTRAINDICACIONES

No administrar durante la postura.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L. Santa Cruz.

BOLIVIA SENASAG Reg. PUV-N° 001335/06

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801,

Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 1933-B

En Ecuador: REBEXA Representaciones S.A. El Calzado Calle S12 No. OE2-495 y

Calle OE2L, Quito

Reg No: 4A-18345-AGROCALIDAD

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta exclusiva al profesional veterinario

Utilizar el contenido completo una vez abierto el envase.

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. -

1107 Budapest - Hungría

**APROBADO
SAG**

17-04-2024

CEVAC® BROILER ND K

Vacuna inactivada contra
Enfermedad de Newcastle (ND)
Para la inmunización de pollos

APROBADO
SAG

5674-04

17-04-2024

500 ml/
5000
dosis



Emulsión Inyectable

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Virus Newcastle, Cepa NDV-"SZ", LaSota $\geq 50 \text{ PD}_{50}$

Excipientes csp 0,1 ml

Preservante: Timerosal

Adyuvante oleoso

INDICACIÓN DE USO

Como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Newcastle, en pollos a partir del 1er día de edad y en la progenie de las aves vacunadas.

ESPECIE DE DESTINO

Pollos broilers, gallinas de postura y reproductoras.

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO.

Dosis: 0,1 ml/ave. Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: dosis única. Las gallinas de postura y reproductoras pueden ser revacunadas entre la 6ª y 8ª semanas de edad. Edad o peso: a partir del primer día de edad.

Condición fisiológica: aves sanas. Vía de administración: subcutánea (bajo la piel del cuello) o intramuscular (pechuga o muslo). Modo de empleo:

permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de aplicar. Agitar antes y durante la administración. Administrar en forma aséptica.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO.

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS NO DESEADOS O REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente se puede presentar una reacción local inflamatoria en el punto de inoculación, la cual desaparece esporádicamente, sin necesidad de tratamiento.

Precauciones para la disposición del producto.

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Precauciones para el operador.

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

STD 436

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

Interacción con otros productos farmacéuticos.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

CONTRAINDICACIONES

No administrar durante la postura.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero días.

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agrosvet S.R.L, Santa Cruz.

BOLIVIA SENASAG Reg. PUV-N° 001335/06

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669,

of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 1933-B

En Ecuador: REBEXA Representaciones S.A. El Calzado Calle S12

No. OE2-495 y Calle OE2L, Quito

Reg No: 4A-18345-AGROCALIDAD

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta exclusiva al profesional veterinario

Utilizar el contenido completo una vez abierto el envase.

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. -

1107 Budapest - Hungria

Fecha
de Fab.:

Serie No.:

Fecha
de Exp.:



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre de fantasía:** CEVAC CEVA® BROILER ND K
- b) **Nombre genérico:** Vacuna inactivada contra Enfermedad de Newcastle
- c) **Forma farmacéutica:** Emulsión inyectable

2. Composición

Cada dosis contiene:

Virus Newcastle, Cepa NDV-"SZ", La Sota

Excipientes csp

-Inactivante: Formaldehído

-Preservante: Timerosal

-Adyuvante oleoso

≥ 50 PD₅₀

0,1 mL

APROBADO
SAG

17-04-2024

3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular de inmunidad activa con el objeto de proveer inmunidad activa y proveer pasiva a la progenie contra el Virus Newcastle.

4. Particularidades clínicas:

- a) **Especies de destino y subcategoría:** Pollos broilers, gallinas de postura y reproductoras

- b) **Indicaciones de uso:**

Como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Newcastle, en pollos a partir del 1er día de edad y en la progenie de las aves vacunadas

- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo:**

Dosis: 0,1 mL

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento: Pollos broilers: dosis única. Gallinas de postura y reproductoras: pueden ser revacunadas entre las 6 a 8 semanas de edad.

Edad o peso: al primer día de edad

Condición fisiológica: aves sanas

Vía de administración: subcutánea (bajo la piel del cuello) o intramuscular (en la pechuga o en el muslo)

Modo de empleo: agitar vigorosamente antes y durante su uso. Aclimatar a temperatura ambiente antes de usar. Administrar en forma aséptica. Se recomienda utilizar jeringas con dispositivo de seguridad.



d) *Contraindicaciones*

No administrar en aves enfermas.

e) *Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:*

Puede observarse una reacción local inflamatoria luego de la administración.

f) *Advertencia y precauciones especiales de uso.*

Las gallinas de postura y reproductoras deben haber sido previamente vacunadas con vacunas vivas modificadas contra Enfermedad de Newcastle.

g) *Uso durante postura*

No administrar durante la postura

h) *Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado:*

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) *Sobredosis:*

La administración del doble es bien tolerada, sin embargo no se recomienda sobre dosificar.

j) *Periodo de resguardo:*

Cero días

APROBADO
SAG

17-04-2024

k) *Precauciones especiales para el operador:*

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

5. Particularidades farmacéuticas.

a) *Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado:*

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

b) *Período de eficacia:*

24 meses.

Una vez abierto el frasco debe utilizarse dentro de 24 horas. El contenido que sobre, debe ser descartado.

c) *Condiciones de almacenamiento:*

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8 °C. No congelar.



d) Descripción de los envases:

Estuche de cartón o caja de aluminio etiquetada, conteniendo 1 o 5 frascos de polietileno, etiquetado, cerrados con tapones de goma, sellados con cápsulas de aluminio y tapas de plástico, conteniendo 100 o 500 mL, equivalente a 1.000 o 5000 dosis.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere:

Se recomienda disponer los desechos mediante incineración.

Producto sin utilizar deben ser devueltos a la empresa importadora.

6. Condición de venta:

Venta bajo receta medico veterinaria

7. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda

Fabricado por:

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5, Hungría



Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de CEVA Sante Animale, Francia

Registro SAG N° 1933-B

Mantener fuera del alcance de los niños

USO VETERINARIO