

CEVAC® GUMBO L

Vacuna viva contra Enfermedad de Gumboro,
Cepa LIBDV
Para la inmunización activa de pollos

20x **1000** dosis

47950-12



CEVAC® GUMBO L
20 x 1000 dosis

STD 701

Producido por: Ceva-Phylaxia,
Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5.
Hungria

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L.,
Santa Cruz. Reg. SENASAG
CR-PUV No. 001305/2006

Fecha de Fab.:

Serie No:

Fecha de Exp.:

APROBADO
SAG

17-04-2024

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of.801, Las Condes,
Santiago - Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia. - Reg. SAG No.: 1942-B

En Colombia: Vetiplus S.A., Bogotá. Reg. ICA No.: 6180 BV

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. America, Quito.

Reg. No.: 4A-8596-AGROCALIDAD. Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas.

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Lima. Reg. SENASA No.: B.01.1.01.1.0683

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741 Reg. MAT-SASA
No.: B.I.8.644 Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra

Polvo Liofilizado

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa LIBDV..... $\geq 10^{3.0}$ TCID₅₀

Excipientes..... csp 1 dosis

Aplicación en el agua de consumo.

ADVERTENCIA: Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después
de mezclar. Rechazar el producto si el sello está deteriorado.

Ver información detallada en el inserto.

ALMACENAMIENTO: Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta bajo prescripción del médico veterinario

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® GUMBO L

Vacuna viva contra Enfermedad de Gumboro,
Cepa LIBDV

Para la inmunización activa de pollos

20x2500 dosis

47953-12



CEVAC® GUMBO L
20 x 2500 dosis

STD 701

Producido por: Ceva-Phylaxia,
Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5.
Hungria

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L.,
Santa Cruz. Reg. SENASAG
CR-PUV No. 001305/2006

Fecha de Fab.:

APROBADO
SAG

Serie No:

17-04-2024

Fecha de Exp.:

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes,
Santiago - Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia. - Reg. SAG No.: 1942-B

En Colombia: Vetiplus S.A., Bogotá. Reg. ICA No.: 6180 BV

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. America, Quito.

Reg. No.: 4A-8596-AGROCALIDAD. Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas.

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Lima. Reg. SENASA No.: B.01.1.01.1.0683

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741 Reg. MAT-SASA
No.: B.I.8.644 Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra - CPE 0711226735

Polverio Liofilizado

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa LIBDV..... $\geq 10^{3.0}$ TCID₅₀

Excipientes..... csp l dosis

Aplicación en el agua de consumo.

ADVERTENCIA: Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después
de mezclar. Rechazar el producto si el sello está deteriorado.

Ver información detallada en el inserto.

ALMACENAMIENTO: Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta bajo prescripción del médico veterinario

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CEVAC® GUMBO L

Vacuna viva contra Enfermedad de Gumboro,

Cepa LIBDV

Para la inmunización activa de pollos

20x5000 dosis

50430-11



**CEVAC® GUMBO L
20 x 5000 dosis**

STD 701

Producido por: Ceva-Phylaxia,
Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5.
Hungria

Fecha de Fab.:

Serie No:

Fecha de Exp.:

**APROBADO
SAG**

17-04-2024

STD 424

CEVAC® GUMBO L

Vacuna viva contra
Enfermedad de Gumboro,
Cepa LIBDV

1000dosis



47949-09

Polvo Liofilizado. Almacenar entre
2° y 8°C. Ver detalles en el inserto.
**MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO VETERINARIO**

Reg. SENASAG CR-PUV No.
001305/2006

ICA No.: 6180 BV
4A-8596-AGROCALIDAD
SENASA No.: B.01.1.01.1.0683
MAT-SASA No.: B.I. 8.644
SAG No.: 1942-B

**APROBADO
SAG**

17-04-2024

Ceva-Phylaxia, Budapest, Hungría

Fab:

Serie No.:

Exp:

APROBADO
SAG

17-04-2024

STD 424

CEVAC® GUMBO L

Vacuna viva contra
Enfermedad de Gumboro,
Cepa LIBDV



47952-09

Polvo Liofilizado. Almacenar entre
2° y 8°C. Ver detalles en el inserto.

**MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO VETERINARIO**

Reg. SENASAG CR-PUV No.
001305/2006

ICA No.: 6180 BV
4A-8596-AGROCALIDAD
SENASA No.: B.01.1.01.1.0683
MAT-SASA No.: B.I. 8.644
SAG No.: 1942-B

Ceva-Phytaxia, Budapest, Hungría

Fab.:

Serie No.:

Exp.:

APROBADO
SAG

17-04-2024

STD 434

CEVAC® GUMBO L

Vacuna viva contra
Enfermedad de Gumboro,
Cepa LIBDV

5000 dosis



50429-08

Polvo Liofilizado. Almacenar entre
2° y 8°C. Ver detalles en el inserto.
**MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO VETERINARIO**

Reg. SENASAG CR-PUV No.
001305/2006

ICA No.: 6180 BV
4A-8596-AGROCALIDAD
SENASA No.: B.01.1.01.1.0683
MAT-SASA No.: B.I. 8.644
SAG No.: 1942-B

Ceva-Phylaxia, Budapest, Hungría

Fab.:

Serie No.:

Exp.:

APROBADO
SAG

17-04-2024

CEVAC® GUMBO L

Vacuna viva contra Enfermedad de Gumboro, Cepa LIBDV
Para la inmunización activa de pollos



COMPOSICION

Polvo Liofilizado

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, Cepa LIBDV $\geq 10^{3.0}$ TCID₅₀

Excipientes..... csp 1 dosis

INDICACIÓN DE USO

Para la inmunización activa de pollos sanos para prevenir la Enfermedad de Gumboro, a partir de los 14 días de edad.

La vacuna puede utilizarse para vacunación inicial o revacunación de pollos, pollas y gallinas.

ADMINISTRACION Y DOSIFICACION

CEVAC® GUMBO L debe administrarse en el agua de consumo.

Los pollos deben ser vacunados con CEVAC® GUMBO L entre 14 y 21 días de edad, dependiendo del nivel de anticuerpos maternos. En el caso de heterogeneidad de este nivel entre los pollos, o cuando se trate de pollos descendientes de lotes no vacunados, se recomienda una primera vacunación entre 7 y 10 días de edad.

Las pollas o gallinas jóvenes deben ser vacunadas dos veces entre los 20 y 28 días de edad dejando un intervalo de 6 días entre una y otra administración. En caso de heterogeneidad del nivel de anticuerpos maternos, o en descendientes de lotes no vacunados se recomienda una primera vacunación entre 14 y 16 días de edad.

La fecha exacta de la vacunación puede determinarse verificando el nivel de anticuerpos maternos.

Método de administración en el agua de consumo

Se recomienda no utilizar desinfectantes en el agua de consumo desde 48 horas antes hasta 24 horas después de la vacunación.

Cuando se utilice una bomba de cloro, apagarla durante este mismo período de tiempo.

Los bebederos deben limpiarse completamente antes de utilizarlos para la vacunación. Para la limpieza no se deben utilizar desinfectantes.

Cerrar el sistema de distribución de agua, levantar y desocupar las líneas dispensadoras o vaciar los bebederos.

El período de retención del agua varía en concordancia con la edad de los pollos por vacunar y las condiciones climáticas (promedio 1.5 horas).

Preparar únicamente la cantidad de vacuna dependiendo de la cantidad de dosis por presentación que se va a utilizar inmediatamente.

Utilizar únicamente materiales y utensilios de plástico para la preparación y administración de la vacuna. Preparar la cantidad requerida de agua que será consumida por las aves en dos horas. Este volumen puede variar, dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales.

Edad	7-12 días	13-18 días	19-28 días
Cantidad mínima de agua para 1.000 pollos	10 litros	15-20 litros	25-30 litros

Como ayuda para preservar la actividad del virus, se puede neutralizar el cloro con 2.5 g de leche descremada en polvo por litro de agua. No utilizar agua con altas concentraciones de iones metálicos.

Mezclar la vacuna con agua limpia, fresca y no clorada, abriendo los viales bajo el agua y dejando estabilizar la mezcla durante 10 minutos.

Abrir el sistema de hidratación cuando cambie el color del agua (azulosa), bajar las líneas y verificar la distribución en todo el galpón. Cuando el tanque esté vacío, llenarlo con una solución de leche descremada en polvo, dejarlo reposar durante 10 minutos y abrir el sistema de irrigación para hidratar la solución de la vacuna remanente en las mangueras.

La suspensión de vacuna también puede ser distribuida manualmente por los operarios, utilizando recipientes plásticos.

PRECAUCIONES GENERALES

Solamente en pollos sanos puede obtenerse protección satisfactoria.

Aproximar siempre el número de dosis al millar superior siguiente (por ejemplo a 20.000 si son 19.450), no trate de aumentar la cantidad requerida.

Todas las aves del lote deben ser vacunadas al mismo tiempo.

Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día.

Desechar todos los frascos de vacuna abiertos que sobren después de la vacunación, ciñéndose a las respectivas regulaciones locales o nacionales.

El almacenamiento o el manejo inadecuado de las vacunas puede resultar en pérdida de la potencia.

ADVERTENCIA

CEVAC® GUMBO L no debe mezclarse con otras vacunas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ninguno.

ALMACENAMIENTO

Entre 2° y 8°C, protegido de la luz.

PRESENTACIÓN

Viales de 1000, 2500 y 5000 dosis.



17-04-2024

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta bajo prescripción del médico veterinario

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz.

Reg. SENASAG CR-PUV No. 001305/2006

En Colombia: Vetiplus S.A., Bogotá.

Reg. ICA No.: 6180 BV

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG No.: 1942-B

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. America, Quito.

Reg. No.: 4A-8596-AGROCALIDAD

Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Calle José Gonzales 681, Miraflores, Lima.

Reg. SENASA No.: B. 01.1.01.1.0683

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741

Reg. MAT-SASA No.: B.I. 8.644

Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra

Producido por : Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5. Hungría



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) Nombre Fantasia: CEVAC CEVA® GUMBO L
- b) Nombre Genérico: Vacuna viva contra Enfermedad de Gumboro
- c) Forma farmacéutica: Polvo liofilizado

APROBADO
SAG
17-04-2024

2.- Composición

Cada dosis contiene:

Virus Gumboro, cepa LIBDV $\geq 10^{3.0}$ TCID₅₀

Excipientes..... csp 1dosis

3.- Propiedades inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa de pollos sanos contra el virus de la Enfermedad de Gumboro

4.-Particularidades clínicas:

a) **Especies de destino:** Aves (pollos, pollas y gallinas)

b) Indicaciones de uso

Como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Gumboro, en pollos sanos a partir de los 14 días de edad.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.

Administrar vía oral mediante agua de bebida. 1 dosis por ave.

Se recomienda para la vacunación de pollos entre 14 y 21 días de edad, dependiendo del nivel de anticuerpos maternos.



En el caso de heterogeneidad de este nivel entre los pollos, o cuando se trate de pollos descendientes de lotes no vacunados, se recomienda una primera vacunación entre 7 y 10 días de edad.

Las pollas o gallinas jóvenes deben ser vacunadas dos veces entre los 20 y 28 días de edad dejando un intervalo de 6 días entre una y otra administración. En caso de heterogeneidad del nivel de anticuerpos maternos, o en descendientes de lotes no vacunados, se recomienda una primera vacunación entre 14 y 16 días de edad.

La fecha exacta de la vacunación puede determinarse verificando el nivel de anticuerpos maternos.

Método de administración en el agua de consumo

- Se recomienda no utilizar desinfectantes en el agua de consumo desde 48 horas antes hasta 24 horas después de la vacunación. Cuando se utilice una bomba de cloro, apagarla durante este mismo periodo de tiempo.
- Los bebederos deben limpiarse completamente antes de utilizarlos para la vacunación. Para la limpieza no deben utilizarse desinfectantes.
- Cerrar el sistema de distribución de agua, levantar y desocupar las líneas dispensadoras o vaciar los bebederos.
- El periodo de retención del agua varía en concordancia con la edad de los pollos por vacunar y las condiciones climáticas (promedio 1.5 horas).
- Preparar únicamente la cantidad de vacuna que se va a utilizar inmediatamente.
- Utilizar únicamente materiales y utensilios de plástico para la preparación y administración de la vacuna.
- Preparar la cantidad requerida de agua que será consumida por las aves en dos horas. Este volumen puede variar, dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales.

Edad	7-12 días	13-18 días	19-28 días
Cantidad mínima de agua para 1000 pollos	10 litros	15-20 litros	25-30 litros

- Como ayuda para preservar la actividad del virus, neutralizar el cloro con 2.5 g de leche descremada en polvo por litro de agua.
- No utilizar agua con altas concentraciones de iones metálicos.
- Mezclar la vacuna con agua limpia, fresca y no clorada, abriendo los viales bajo el agua y dejando estabilizar la mezcla durante 10 minutos.
- Abrir el sistema de hidratación cuando cambie el color de agua (azulosa), bajar las líneas y verificar la distribución en todo el galpón.
- Cuando el tanque este vacío, llenarlo con una solución de leche descremada en polvo, dejarlo reposar 10 minutos y abrir el sistema de irrigación para hidratar la solución de la vacuna remanente en las mangueras.

APROBADO
SAG
17-04-2024



- La suspensión de la vacuna también puede ser distribuida manualmente por los operarios, utilizando recipientes plásticos.

d) Contraindicaciones

No administrar en aves enfermas.



e) Efectos no deseados o reacciones adversas. SAG

No reportados.

f) Precauciones especiales de uso.

Todas las aves del lote deben ser vacunadas al mismo tiempo.
Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día.

g) Uso durante postura y reproducción

No aplica.

i) Sobredosis.

La administración de diez veces la dosis recomendada es bien tolerada, sin embargo, no se recomienda sobredosificar.

j) Periodo de resguardo

Cero días

k) Precauciones especiales para el operador.

Evitar el contacto de la vacuna con las mucosas.



5.- Particularidades farmacéuticas.

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente que forma parte de la vacuna.



b) Periodo de eficacia.

24 meses.

Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad

c) Condiciones de almacenamiento.

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.

d) Descripción de los envases.

Frasco de vidrio, etiquetado, cerrado con tapón de goma butílica, sellado con cápsula de aluminio y tapa de plástico, conteniendo 1000, 2500 o 5000 dosis.

Estuche de cartulina conteniendo 20 frascos de 1000, 2500 o 5000 dosis. Incluye prospecto interno.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración.

Se recomienda disponer los desechos mediante incineración.

Productos sin utilizar deben ser devueltos a la empresa importadora.

6.- Condición de venta.

Venta bajo receta médica veterinaria



7.- Nombre y dirección del fabricante, importador y licenciante

Fabricado por:

CEVA—PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Széllás u.5, Hungría

**APROBADO
SAG**

17-04-2024

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de CEVA Sante Animale, Francia

8.- Otra Información

Uso Veterinario

Mantener fuera del alcance de los niños

Registro SAG N° 1942-B