



SALENVACT
Nobilis®

155715 R1

APROBADO
SAG
19-06-2025

Nobilis®
SALENVAC T

Contenido 500 ml

Composición:

Cada dosis de 0,5 ml
contiene:

Salmonella enteritidis, Ceba 109, Fagotito 4 ≥ 1 RP
Salmonella typhimurium, Ceba DT104 ≥ 1 RP
Excipientes c.s.p. 0.5 ml
Inactivante: Formaldehído; Adyuvante: Hidróxido de aluminio;
Preservante: Tiomersal

Indicaciones de uso:

Para la inmunización activa de gallinas y para la inmunización pasiva de la progenie para reducir la colonización del ciego y la excreción fecal de *S. enteritidis* y *S. typhimurium*.

Dosis, vía y método de administración:

Vacunar desde las 6 semanas de edad con 0,5 ml vía intramuscular y revacunar en un intervalo de 4 semanas, con la misma dosis, pero nunca después de las 16 semanas de edad. Adicionalmente y de acuerdo al riesgo de infección en la etapa de crianza, se puede vacunar pollitos de 1 día de edad con dosis reducida de 0,1 ml vía intramuscular y repetir a las 4 semanas de edad con una dosis de 0,5 ml.

Período de resguardo: Cero días.

No vacunar durante la postura

Almacenar entre 2° y 8°C, protegido de la luz. No congelar.

Mantener fuera del alcance de los niños

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Registro SAG N° 2177-B

Nobilis®
SALENVAC T

Contenido 500 ml

Serie N°:
Fecha de fabricación:
Vence:



Nobilis®
SALENVAC T

Vacuna inactivada *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium*

USO VETERINARIO

Suspensión inyectable

Pollas de reemplazo, Reproductoras y Ponedoras comerciales

Contenido 500 ml

PSA020S02 02
82,5x82,5x156mm
CMYK

Nobilis®
SALENVAC T

Contenido 500 ml

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN,
Boxmeer, Países Bajos

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310,
Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International BV,
Holanda.



8 713184 123602 >

Nobilis® SALENVAC T



Vacuna inactivada *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium*
SUSPENSIÓN INYECTABLE

USO VETERINARIO

500 ml

Fabricado por:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN, Boxmeer, Países Bajos

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile. Bajo
licencia de Intervet International BV, Holanda.



MSD

Animal Health

Composición:

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Salmonella enteritidis, Cepa109, Fagotito 4 ≥ 1 PR

Salmonella typhimurium, Cepa DT104 ≥ 1 PR

Excipientes c.s.p. 0,5 ml

Inactivante: Formaldehído

Adyuvante: Hidróxido de aluminio

Preservante: Tiomersal

Especie de destino: Pollas de reemplazo, Reproductoras y Ponedoras
comerciales.

Indicación de uso, dosis, vía y método de administración:
ver el prospecto interno adjunto.

Mantener fuera del alcance de los niños

Almacenar entre 2°C – 8°C. No congelar.

Período de resguardo: Cero días. **Venta**
bajo receta Médico Veterinaria Registro
SAG N° 2177-B

Serie / Fecha de fabricación: / Vence:

Imprint
Area

APROBADO
153691 R1
SAG

19-06-2025

INSERTO

154177 R1

Nobilis® SALENVAC™



VACUNA INACTIVADA *SALMONELLA ENTERITIDIS* Y *S. TYPHIMURIUM*

USO VETERINARIO

SUSPENSIÓN INECTABLE



APROBADO
SAG

19-06-2025

Composición:

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Salmonella enteritidis, Cepa 109, Fagotito 4 ≥ 1 RP

Salmonella typhimurium, Cepa DT104 ≥ 1 RP

Excipientes c.s.p. 0,5 ml

Inactivante: Formaldehído Aduvante:

Hidróxido de aluminio Preservante:

Tiomersal

Especie de destino:

Pollas de reemplazo, Reproductoras y Ponedoras comerciales

Indicaciones de uso:

Para la inmunización activa de gallinas y para la inmunización pasiva de la progenie para reducir la colonización del ciego y la excreción fecal de *S. enteritidis* y *S. typhimurium*.

Dosis, vía y método de administración

Vacunar desde las 6 semanas de edad con 0,5 ml vía intramuscular y revacunar en un intervalo de 4 semanas, con la misma dosis, pero nunca después de las 16 semanas de edad.

Adicionalmente y de acuerdo al riesgo de infección en la etapa de crianza, se puede vacunar pollitos de 1 día de edad, con dosis reducida de 0,1 ml vía intramuscular y repetir a las 4 semanas de edad con una dosis de 0,5 ml.

Efectos no deseados:

La aplicación de la vacuna puede producir inflamación pasajera en el sitio de inyección, letargia, cojeras y disminución de la ganancia diaria de peso, en forma transitoria y pasajera por un período de aproximadamente 2 días.

Las reacciones adversas son más marcadas en pollitos de 1 día de edad. Excepcionalmente la inflamación puede permanecer hasta por 15 días post vacunación.

Período de resguardo:

Cero días.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2°C y 8°C. No congelar.

Precauciones y contraindicaciones:

No usar durante la postura.

En caso de vacunación de pollitos de 1 día de edad, solamente deben ser vacunados pollitos de lotes de madres no vacunadas y no infectadas.

Interacciones con otros productos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Presentaciones:

Estuche de cartón impreso, con 1 frasco PET etiquetado, sellado con tapón de goma y precinto de aluminio, conteniendo 250 ml o 500 ml. Incluye prospecto interno.

Fabricado por:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN, Boxmeer, Países Bajos

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Intervet International BV, Holanda.

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Registro SAG N° 2177-B



RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

- a) **Nombre de fantasía**
Nobilis® Salenvac T
- b) **Nombre genérico**
Vacuna inactivada *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium*.
- c) **Forma farmacéutica**
Suspensión inyectable

APROBADO
SAG

19-06-2025

2. COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Salmonella enteritidis, Cepa 109, Fagotito 4 ≥ 1 RP

Salmonella typhimurium, Cepa DT104 ≥ 1 RP

Excipientes c.s.p. Inactivante: 0,5 mL

Formaldehído Adyuvante:

Hidróxido de aluminio

Preservante: Tiomersal

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa en las aves vacunadas y la inmunidad pasiva en la progenie, contra *S. enteritidis* y *S. typhimurium*.

Inmunización activa

- Establecimiento de la inmunidad: 4 semanas posteriores a la segunda administración
- Duración de la inmunidad: hasta las 57 - 60 semanas de edad.

Inmunización pasiva

- Establecimiento de la inmunidad: 1 día después del nacimiento.
- Duración de la inmunidad: hasta 14 días después del nacimiento.
- La inmunidad pasiva se transfiere desde 4 semanas después de la segunda vacunación hasta las 59 semanas de edad del ave progenitora.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

- a) **Especies de destino**
Pollas de reemplazo, Reproductoras y Ponedoras comerciales.

b) Indicación de uso

Para la inmunización activa de gallinas y para la inmunización pasiva de la progenie para reducir la colonización del ciego y la excreción fecal de *S. enteritidis* y *S. typhimurium*.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleoPosología:

- 1° dosis: a partir de las 6 semanas de edad.
- 2° dosis: a lo menos 4 semanas después de la primera dosis pero no después de las 16 semanas de edad.

Adicionalmente y de acuerdo al riesgo de infección en la etapa de crianza, se puede vacunar pollitos de 1 día de edad, con una dosis reducida de 0,1 ml vía IM y repetir a las 4 semanas de edad con una dosis de 0,5 ml.

d) Contraindicaciones

No usar durante la postura.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico

La aplicación de la vacuna puede producir inflamación pasajera en el sitio de inyección, letargia, cojeras y disminución de la ganancia diaria de peso, en forma transitoria y pasajera por un período de aproximadamente 2 días.

Las reacciones adversas son más marcadas en pollitos de 1 día de edad.

Excepcionalmente la inflamación puede permanecer hasta por 15 días post vacunación.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso

Agitar la vacuna antes de usar.

No se han desarrollado estudios para evaluar el efecto en los anticuerpos maternos en respuesta a la vacunación. Por lo tanto, en caso de vacunación de pollitos de 1 día de edad, solamente deben ser vacunados pollitos de lotes de madres no vacunadas y no infectadas.

g) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores

No usar durante la postura.

APROBADO
SAG
19-06-2025

- h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado**
No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.
- i) Sobredosis**
Pueden ocurrir reacciones similares a las descritas en los efectos adversos, pero más pronunciadas. No se recomienda sobre dosificar.
- j) Período de resguardo**
Cero días.
- k) Precauciones especiales para el operador**
En caso de una auto-inyección accidental, ir inmediatamente por asistencia médica y mostrar el prospecto inserto o la etiqueta al médico.

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS

- a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**
No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.
- b) Período de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda**
36 meses.
Usar el contenido completo una vez abierto el envase.
- c) Condiciones de almacenamiento**
Mantener refrigerado, entre 2° y 8° C. No congelar.
- d) Descripción de los envases**
Estuche de cartón impreso, con 1 frasco PET etiquetado, sellado con tapón de goma y precinto de aluminio, conteniendo 250 mL o 500 mL. Incluye prospecto interno.
- e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración**
Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

APROBADO
SAG
19-06-2025

6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA FABRICANTE Y DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA EMPRESA LICENCIANTE

FABRICADO POR:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN,
Boxmeer, Países Bajos



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

Registro SAG N° 2177-B

USO VETERINARIO