

Estuche cara anterior

APROBADO
SAG
09-01-2026

Reg. SAG N°: 2402-B

AviPro™
SALMONELLA DUO
Vacuna viva modificada *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium.
10 x 2000 dosis
Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral.

USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA
PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA

Elanco™

DUMMY

Estuche cara posterior

APROBADO
SAG
09-01-2026

AviPro™ SALMONELLA DUO

Vacuna viva modificada *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium. Polvo Liofilizado para reconstituir suspensión oral.

Cada dosis contiene: *Salmonella* Enteritidis cepa Sm24/Rif12/Ssq, 1 x 10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC. *Salmonella* Typhimurium cepa Nal2/Rif 9/Rtt, 1 x 10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC. Excipientes csp 1 dosis. **Especie de destino:** Pollas de reemplazo (futuras reproductoras y futuras ponedoras), pavos (engorda y reproductores). **Período de resguardo:** Pollos: 21 días (carne y huevos). Pavos: 70 días después de la primera vacunación, 49 días después de la repetición de la vacunación. Mantener refrigerado: entre 2 - 8°C. No congelar. Proteger de la luz solar directa. **Indicación de uso, dosis, vía de administración y modo de empleo, contraindicaciones, efectos adversos, interacciones, advertencias y precauciones especiales de uso, precauciones para el operador, precauciones para la disposición:** ver inserto.

Importado y distribuido por:

Elanco Chile SpA.
Rosario Norte 615 of. 1502, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de:

Elanco Animal Health Inc., USA.
Reg. SAG N°: 2402-B

DUMMY

Estuche cara lateral

SERIE: XXXXXXXX

FABR: MM.YYYY

VENC: MM.YYYY

APROBADO
SAG

09-01-2026

Vial 2000 dosis

Cada dosis contiene:

Salmonella Enteritidis cepa Sm24/Rif12/Ssq,
1 x 10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC
Salmonella Typhimurium cepa NaI2/Rif 9/Rtt,
1 x 10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC.
Excipientes csp 1 dosis.

Especie de destino: Pollas de reemplazo
(futuras reproductoras y futuras ponedoras),
Pavos (engorda y reproductores).

Mantener refrigerado: entre 2 - 8°C.
No congelar. Proteger de la luz solar directa.
Para mayor información: ver inserto.

Fabricado por:

Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Alemania
Reg. SAG N°: 2402-B

*AviPro*TM

SALMONELLA DUO

Vacuna viva modificada *Salmonella* Enteritidis y
Salmonella Typhimurium

2000 dosis

Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral.

USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

N° Serie:

F: Fab.:

F: Venc.:

**APROBADO
SAG**

09-01-2026

Estuche cara anterior

APROBADO
SAG
09-01-2026

Reg. SAG N°: 2402-B

Avipro™
SALMONELLA DUO
Vacuna viva modificada *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium.
10 x 4000 dosis
Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral.

USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA
PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA

Elanco™

DUMMY

Estuche cara posterior

APROBADO
SAG
09-01-2026

AviPro™ SALMONELLA DUO

Vacuna viva modificada *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium. Polvo Liofilizado para reconstituir suspensión oral.

Cada dosis contiene: *Salmonella* Enteritidis cepa Sm24/Rif12/Ssq, 1 x 10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC. *Salmonella* Typhimurium cepa Nal2/Rif 9/Rtt, 1 x 10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC. Excipientes csp 1 dosis. **Especie de destino:** Pollas de reemplazo (futuras reproductoras y futuras ponedoras), pavos (engorda y reproductores). **Período de resguardo:** Pollos: 21 días (carne y huevos). Pavos: 70 días después de la primera vacunación, 49 días después de la repetición de la vacunación. Mantener refrigerado: entre 2 - 8°C. No congelar. Proteger de la luz solar directa. **Indicación de uso, dosis, vía de administración y modo de empleo, contraindicaciones, efectos adversos, interacciones, advertencias y precauciones especiales de uso, precauciones para el operador, precauciones para la disposición:** ver inserto.

Importado y distribuido por:

Elanco Chile SpA.
Rosario Norte 615 of. 1502, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de:

Elanco Animal Health Inc., USA.
Reg. SAG N°: 2402-B

DUMMY

Estuche cara lateral

SERIE: XXXXXXXX

FABR: MM.YYYY

VENC: MM.YYYY

APROBADO
SAG

09-01-2026

Vial 4000 dosis

Cada dosis contiene:

Salmonella Enteritidis cepa Sm24/Rif12/Ssq,
1 x 10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC
Salmonella Typhimurium cepa Na12/Rif 9/Rtt,
1 x 10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC.
Excipientes csp 1 dosis.

Especie de destino: Pollas de reemplazo
(futuras reproductoras y futuras ponedoras),
Pavos (engorda y reproductores).

Mantener refrigerado: entre 2 - 8°C.
No congelar. Proteger de la luz solar directa.
Para mayor información: ver inserto.

Fabricado por:

Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Alemania
Reg. SAG N°: 2402-B

*AviPro*TM

SALMONELLA DUO

Vacuna viva modificada *Salmonella Enteritidis* y
Salmonella Typhimurium

4000 dosis

Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral.

USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

N° Serie:

F: Fab.:

F: Venc.:

APROBADO
SAG

09-01-2026



APROBADO
SAG

SALMONELLA DUO

09-01-2026

Vacuna viva modificada *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium.

USO VETERINARIO

Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral.

Cada dosis contiene:

Salmonella Enteritidis cepa

SM24/Rif12/Ssq1x10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC

Salmonella Typhimurium cepa

Nal2/Rif 9/Rtt1x10⁸ UFC - 6 x 10⁸ UFC

Excipientes c.s.p 1 dosis.

Especie de destino:

Pollas de reemplazo (futuras reproductoras y futuras ponedoras), Pavos (engorda y reproductores).

Indicación(es) de uso:

Pollas de reemplazo:

Inmunización activa, para reducir la excreción fecal y la colonización de los órganos internos por cepas de campo de *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium, así como para reducir la colonización de los huevos por cepas de campo de *Salmonella* Enteritidis.

Pavos: Inmunización activa, para reducir la colonización de los órganos internos por cepas de campo de *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium.

Establecimiento de la inmunidad

Pollas: 15 días después de la primera vacunación

Pavos: 21 días después de la primera vacunación

Duración de la inmunidad (desde el momento de la última vacunación aplicada conforme al programa de tratamiento recomendado)

Pollas: 52 semanas frente a *Salmonella* Enteritidis y 46 semanas frente a *Salmonella* Typhimurium

Pavos reproductores: 30 semanas frente a *Salmonella* Enteritidis y 28 semanas frente a *Salmonella* Typhimurium.

Pavos de engorda: 10 semanas frente a *Salmonella* Enteritidis y 10 semanas frente a *Salmonella* Typhimurium.

Dosis:

Pollas de reemplazo: una dosis el primer día de vida, seguida de una segunda vacunación entre la semana 6 a 8 de vida y una tercera vacunación alrededor de la semana 16 de vida (por lo menos 3 semanas antes del inicio de la postura).

Pavos de engorde: una dosis el primer día de vida, seguida de una segunda vacunación a las 6 semanas de vida.

Pavos reproductores: una dosis el primer día de vida, seguida de una segunda vacunación a las 6 semanas de vida, una tercera vacunación a las 16 semanas de vida y una cuarta vacunación a las 23 ó 24 semanas de vida.

Vía de administración: oral, mediante el agua de bebida.

Modo de empleo:

- Indicaciones para una correcta administración
- El contenido de los viales abiertos se debe utilizar completamente.
- Prepare sólo la cantidad de vacuna que se utilizará dentro de 4 horas.
- Proteja la vacuna reconstituida de la luz solar directa, heladas y temperaturas superiores a 25°C.
- Siga estas instrucciones para una correcta administración, de manera que todas las aves reciban la dosis adecuada.
- Determinación de la cantidad requerida de agua
- Idealmente la vacuna debe administrarse en un volumen de agua que las aves vayan a consumir en 3 horas. Utilice el registro de medición de agua del día anterior para calcular con exactitud la cantidad correcta de agua en cada caso.
- Como guía, la vacuna deberá aplicarse en agua fría y fresca en una proporción de 1 litro de agua por cada 1000 aves por cada día de vida, por ejemplo; 10 litros sería necesario para 1000 aves de 10 días de edad.
- En condiciones climáticas cálidas y poblaciones de gran tamaño, esta cantidad podría aumentarse hasta un máximo de 40 litros por cada 1000 aves.
- Resuspensión del liofilizado
- Todo el contenido de un vial debe utilizarse completo, ya que su división puede dar lugar a errores de dosificación.
- Todos los equipos utilizados para la vacunación (tuberías, mangueras, tubos, etc) deben limpiarse a fondo y dejarse libre de detergente y desinfectante.
- Utilice solo agua potable y fresca, preferiblemente libre de cloro y de iones metálicos. La leche descremada en polvo (<1% de grasa, 2 – 4 gramos por litro de agua) o leche descremada fluida (20 – 40 mL por litro de agua) puede mejorar la calidad del agua del grifo y por lo tanto la estabilidad de la vacuna. Sin embargo, la incorporación de la leche descremada deberá realizarse por lo menos 10 minutos antes de la adición de la vacuna.
- Abra el vial de la vacuna bajo agua y disuélvalo completamente. Como la vacuna concentrada es ligeramente viscosa, se debe tener cuidado para vaciar completamente la ampolla y la tapa, enjuagándola con agua. La suspensión de la vacuna debe moverse constantemente durante varios minutos antes de su administración.
- Aplicación de la vacuna resuspendida
- Espere a que el agua de los bebederos se haya consumido, de manera que los niveles de agua antes de la aplicación de la vacuna sean mínimos. Si el agua está todavía presente, las líneas deben ser drenadas antes de aplicar la vacuna.
- Aplique la vacuna en un plazo máximo de 3 horas, asegurándose de que todas las aves beban durante este tiempo. Debido a las variaciones en los hábitos de consumo de agua de los pollos, puede que sea necesario restringir el agua en algunas ubicaciones antes de la vacunación para asegurar que todas las aves beban durante el periodo de vacunación.
- Podría ser necesario un periodo de restricción hídrica de 2 – 3 horas antes de la vacunación para garantizar que cada ave reciba una dosis de vacuna.
- Asegúrese que las aves no tengan acceso a agua potable (sin vacuna) durante la vacunación.

Efectos adversos o reacciones adversas:

No se han descrito.

Contraindicaciones:

No vacunar aves enfermas. No utilizar durante el período de postura, ni en las 3 semanas anteriores al inicio de dicho período.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Los pollos vacunados podrán excretar la cepa vacuna de la *Salmonella* Enteritidis hasta 21 días y la cepa vacuna de la *Salmonella* Typhimurium hasta 35 días después de la vacunación.
- La propagación de las cepas vacuna de *Salmonella* en pavos es intermitente. Después de vacunarse una vez el primer día de vida, la duración de la excreción de la cepa vacuna de *Salmonella* Enteritidis se observa hasta el día 49 y la cepa vacuna de *Salmonella* Typhimurium hasta el día 63.
- La vacuna podría contagiar a las aves susceptibles que estén en contacto con las aves vacunadas.

DUMINY

- En muy raras ocasiones, las cepas vacuna podrán aislarse del entorno durante un periodo superior al indicado cuando se utilicen métodos de detección de muy alta sensibilidad.
- Asegurar que el agua de bebida esté libre de detergentes, desinfectantes y ácidos.
- Las cepas vacuna son altamente sensibles a las fluoroquinolonas y presentan una mayor sensibilidad a la eritromicina, cloranfenicol, doxiciclina, detergentes y agentes patógenos ambientales.
- La diferenciación entre las cepas vacuna y las cepas de campo se realiza mediante un antibiograma:
Salmonella Enteritidis: A diferencia de las cepas de campo, la cepa vacuna es sensible a la eritromicina (concentración recomendada de 15-30 µg/ml) y resistente a la estreptomina (concentración recomendada de 200 µg/ml) y a la rifampicina (concentración recomendada de 200 µg/ml).
Salmonella Typhimurium: A diferencia de las cepas de campo, la cepa vacuna es sensible a la eritromicina (concentración recomendada de 15-30 µg/ml) y resistente al ácido nalidixico (concentración recomendada 20 µg/ml) y a la rifampicina (concentración recomendada 200 µg/ml).
- Las cepas vacuna también se pueden distinguir de las cepas de campo utilizando un método de reacción en cadena de polimerasa (PCR) en tiempo real.
- Dependiendo del método analítico utilizado, la vacunación oral puede dar lugar a reacciones seropositiva bajas en aves individuales dentro de una parvada. Dado que la monitorización serológica de Salmonella es solo un análisis de la parvada, los hallazgos positivos deben confirmarse, por ejemplo, mediante pruebas bacteriológicas.

Precauciones especiales para el operador:

Utilizar equipo de protección personal (guantes) para la manipulación de la vacuna.

- Abrir el vial bajo agua para evitar la formación de aerosoles.
- Lavar y desinfectar las manos después de manipular la vacuna.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental, acudir a su médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.
- La cepa vacuna es sensible a una serie de antibióticos, incluidas las fluoroquinolonas (ciprofloxacino).
- Dado que la vacuna se ha preparado con microorganismos vivos atenuados, se deben tomar las medidas adecuadas para evitar la contaminación del manipulador y otras personas que colaboran en el proceso.
- Los animales vacunados pueden excretar cepas vacuna.
- Se aconseja a las personas inmunodeprimidas evitar cualquier contacto con la vacuna y con los animales recién vacunados.
- Esta vacuna no debe ser administrada por mujeres embarazadas.
- El personal encargado de atender a los animales vacunados deben seguir los principios generales de higiene (cambio de ropa, uso de guantes, limpieza y desinfección de las botas) y tener especial cuidado al manipular las heces de los pollos y pavos vacunados hasta 35 y 63 días después de la vacunación, respectivamente.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización. Puesto que corresponde a una vacuna viva, deberá evitarse el uso simultáneo de antibióticos, ya que son efectivos contra la Salmonella. No obstante, si esta situación fuese inevitable, se deberá reinmunizar a la población. La decisión de utilizar esta vacuna antes o después de un tratamiento antibiótico deberá valorarse de manera individual en cada caso.

Principales incompatibilidades:

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico veterinario. El agua utilizada para resuspender y diluir la vacuna debe estar libre de detergentes y desinfectantes.

Período de eficacia:

Una vez reconstituida la vacuna es estable por 4 horas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado entre 2 - 8°C. No congelar. Proteger de la luz solar directa.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar:

Se recomienda eliminar los frascos vacíos y restos del producto sin usar mediante incineración.

Período de resguardo:

Pollos: 21 días (carne y huevos).

Pavos: 70 días después de la primera vacunación, 49 días después de la repetición de la vacunación.

Presentaciones disponibles:

Caja 10 viales x 2000 dosis

Caja 10 viales x 4000 dosis

Fabricado por:

Lohmann Animal Health GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven, Alemania

Importado y distribuido por:

Elanco Chile SpA.

Rosario Norte 615 of. 1502

Las Condes, Santiago, Chile

Tel.: 800 100 212

Bajo licencia de:

Elanco Animal Health Inc., USA.

Reg. SAG N°: 2402-B

Venta bajo receta médico veterinaria

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.



Resumen de Características del Producto Inmunológico

1. Denominación del producto inmunológico:

- a) **Nombre de fantasía:** AviPro® Salmonella Duo
- b) **Nombre genérico:** Vacuna viva modificado *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral


2. Composición:

Cada dosis contiene:

Salmonella Enteritidis, Cepa Sm24/Rif12/Ssq..... 1 x 10⁸ UFC – 6 x 10⁸ UFC
Salmonella Typhimurium, Cepa Nal2/Rif9/Rtt..... 1 x 10⁸ UFC – 6 x 10⁸ UFC
Excipientes c.s.p..... 1 dosis

3. Propiedades inmunológicas:

Para estimular la inmunidad activa contra *Salmonella* Enteritidis fagotipo 4 y *Salmonella* Typhimurium fagotipo 2.



4. Particularidades clínicas:

a) Especies de destino y subcategorías:

Pollas de reemplazo (futuras reproductoras y futuras ponedoras) y pavos (engorda y reproductores).

b) Indicaciones de uso:

Pollas de reemplazo

Inmunización activa, para reducir la excreción fecal y la colonización de los órganos internos por cepas de campo de *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium, así como para reducir la colonización de los huevos por cepas de campo de *Salmonella* Enteritidis.

Pavos

Inmunización activa, para reducir la colonización de los órganos internos por cepas de campo de *Salmonella* Enteritidis y *Salmonella* Typhimurium.

Establecimiento de la inmunidad

Pollos: 15 días después de la primera vacunación.

Pavos: 21 días después de la primera vacunación.

Duración de la inmunidad (desde el momento de la última vacunación aplicada conforme al programa de vacunación recomendado)

Pollos: 52 semanas frente a *Salmonella* Enteritidis y 46 semanas frente a *Salmonella* Typhimurium.

Pavos reproductores: 30 semanas frente a *Salmonella* Enteritidis y 28 semanas frente a *Salmonella* Typhimurium.

Pavos de engorda: 10 semanas frente a *Salmonella* Enteritidis y 10 semanas frente a *Salmonella* Typhimurium.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Posología:

Pollas de reemplazo	
Primera dosis	1er día de edad
Segunda dosis	6 – 8 semanas de edad
Tercera dosis	16 semanas de edad (al menos 3 semanas antes de la postura)

Pavos engorda	
Primera dosis	1er día de edad
Segunda dosis	6 semanas de edad

Pavos reproductores	
Primera dosis	1er día de edad
Segunda dosis	6 semanas de edad
Tercera dosis	16 semanas de edad
Cuarta dosis	23 - 24 semanas de edad

Edad o peso:

A partir del primer día de vida.

Condición fisiológica:

Animales sanos.

Vía de administración:

Oral, mediante el agua de bebida

**APROBADO
SAG
09-01-2026**

Modo de empleo:

- Indicaciones para una correcta administración:
 - El contenido de los viales abiertos se debe utilizar completamente.
 - Prepare sólo la cantidad de vacuna que se utilizará dentro de 4 horas.
 - Proteja la vacuna reconstituida de la luz solar directa, heladas y temperaturas superiores a 25°C.
 - Siga estas instrucciones para una correcta administración, de manera que todas las aves reciban la dosis adecuada.
- Determinación de la cantidad requerida de agua:
 - Idealmente la vacuna debe administrarse en un volumen de agua que las aves vayan a consumir en 3 horas. Utilice el registro de medición de agua del día anterior para calcular con exactitud la cantidad correcta de agua en cada caso.
 - Como guía, la vacuna deberá aplicarse en agua fría y fresca en una proporción de 1 litro de agua por cada 1.000 aves por cada día de vida, por ejemplo; 10 litros serían necesarios para 1.000 aves de 10 días de edad.
 - En condiciones climáticas cálidas y poblaciones de gran tamaño, esta cantidad podría aumentarse hasta un máximo de 40 litros por cada 1.000 aves.
- Resuspensión del liofilizado:
 - Todo el contenido de un vial debe utilizarse completo, ya que su división puede dar lugar a errores de dosificación.
 - Todo el equipo utilizado para la vacunación (tuberías, mangueras, tubos, etc.) deberá limpiarse a fondo y dejarse libre de detergentes y desinfectantes.
 - Utilice solo agua potable y fresca, preferiblemente libre de cloro y de iones metálicos. La leche descremada en polvo (<1% de grasa, 2-4 gramos por litro de agua) o leche descremada fluida (20-40 mL por litro de agua) puede mejorar la calidad del agua del grifo y, por lo tanto, la estabilidad de la vacuna. Sin embargo, la incorporación de la

leche descremada deberá realizarse por lo menos 10 minutos antes de la adición de la vacuna.

- Abra el vial de la vacuna bajo agua y disuélvalo completamente. Como la vacuna concentrada es ligeramente viscosa, se debe tener cuidado para vaciar completamente la ampolla y la tapa, enjuagándola con agua. La suspensión de la vacuna debe removerse constantemente durante varios minutos antes de su administración.
- Aplicación de la vacuna resuspendida:
 - Espere a que el agua de los bebederos se haya consumido, de manera que los niveles de agua antes de la aplicación de la vacuna sean mínimos. Si el agua está todavía presente, las líneas deben ser drenadas antes de aplicar la vacuna.
 - Aplique la vacuna en un plazo máximo de 3 horas, asegurándose de que todas las aves beban durante este tiempo. Debido a las variaciones en los hábitos de consumo de agua de las aves, puede que sea necesario restringir el agua en algunas ubicaciones antes de la vacunación para asegurar que todas las aves beban durante el periodo de vacunación.
 - Podría ser necesario un periodo de restricción hídrica de 2-3 horas antes de la vacunación para garantizar que cada ave reciba una dosis de vacuna.
 - Asegúrese que las aves no tengan acceso a agua potable (sin vacuna) durante la vacunación.

d) Contraindicaciones:

No vacunar aves enfermas.

No utilizar durante el periodo de postura, ni en las 3 semanas anteriores al inicio de dicho periodo.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:

No se han descrito.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso:

Los pollos vacunados podrán excretar la cepa vacuna de la *Salmonella* Enteritidis hasta 21 días y la cepa vacuna de la *Salmonella* Typhimurium hasta 35 días después de la vacunación. La propagación de las cepas vacuna de *Salmonella* en pavos es intermitente. Después de vacunarse una vez el primer día de vida, la duración de la excreción de la cepa vacuna de *Salmonella* Enteritidis se observa hasta el día 49 y la cepa vacuna de *Salmonella* Typhimurium hasta el día 63. Después de la repetición de la vacunación, se reduce la duración de la excreción.

La vacuna podría contagiar a las aves susceptibles que estén en contacto con las aves vacunadas.

En muy raras ocasiones, las cepas vacuna podrán aislarse del entorno durante un periodo superior al indicado cuando se utilicen métodos de detección de muy alta sensibilidad.

Asegurar que el agua de bebida esté libre de detergentes, desinfectantes y ácidos.

Las cepas vacuna son altamente sensibles a las fluoroquinolonas y presentan una mayor sensibilidad a eritromicina, cloranfenicol, doxiciclina, detergentes y agentes patógenos ambientales.

La diferenciación entre las cepas vacuna y las cepas de campo se realiza mediante un antibiograma:

- *Salmonella* Enteritidis:

A diferencia de las cepas de campo, la cepa vacuna es sensible a la eritromicina (concentración recomendada de 15-30 µg/mL) y resistente a la estreptomicina (concentración recomendada de 200 µg/mL) y a la rifampicina (concentración recomendada de 200 µg/mL).

- **Salmonella Typhimurium:**

A diferencia de las cepas de campo, la cepa vacuna es sensible a la eritromicina (concentración recomendada de 15-30 µg/mL) y resistente al ácido nalidíxico (concentración recomendada 20 µg/mL) y a la rifampicina (concentración recomendada 200 µg/mL).

Las cepas vacuna también se pueden distinguir de las cepas de campo utilizando un método de reacción en cadena de polimerasa (PCR) en tiempo real.

Dependiendo del método analítico utilizado, la vacunación oral puede dar lugar a reacciones seropositiva bajas en aves individuales dentro de una parvada. Dado que la monitorización serológica de *Salmonella* es solo un análisis de la parvada, los hallazgos positivos deben confirmarse, por ejemplo, mediante pruebas bacteriológicas.

g) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

No utilizar en aves en periodo de postura, ni en las 3 semanas anteriores al inicio de dicho periodo.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Puesto que corresponde a una vacuna viva, deberá evitarse el uso simultáneo de tratamientos antibióticos, ya que son efectivos contra la *Salmonella*. No obstante, si esta situación fuese inevitable, se deberá reinmunizar a la población. La decisión de utilizar esta vacuna antes o después de un tratamiento antibiótico deberá valorarse de manera individual en cada caso.

i) Sobredosis:

No aplica.

j) Período de resguardo:

Pollos

Carne y huevos: 21 días.

Pavos

Carne: 70 días después de la primera vacunación, 49 días después de la repetición de la vacunación.



k) Precauciones especiales para el operador:

Utilizar equipo de protección personal (guantes) para la manipulación de la vacuna.

Abrir el vial bajo agua para evitar la formación de aerosoles.

Lavar y desinfectar las manos después de manipular la vacuna.

No ingerir. En caso de ingestión accidental, acuda a su médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

Las cepas vacuna son sensibles a una serie de antibióticos, incluidas las fluoroquinolonas (ciprofloxacino).

Dado que la vacuna se ha preparado con microorganismos vivos atenuados, se deben tomar las medidas adecuadas para evitar la contaminación del manipulador y otras personas que colaboran en el proceso.

Los animales vacunados pueden excretar las cepas de la vacuna. Se aconseja a las personas inmunodeprimidas evitar cualquier contacto con la vacuna y con los animales recién vacunados.

Esta vacuna no debe ser administrada por mujeres embarazadas.

El personal encargado de atender a los animales vacunados deberá seguir los principios generales de higiene (cambio de ropa, uso de guantes, limpieza y desinfección de las botas) y tener especial cuidado al manipular las heces de los pollos y pavos vacunados hasta 35 y 63 días después de la vacunación, respectivamente.

5. Particularidades farmacéuticas:

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado:

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún otro producto farmacéutico veterinario.

El agua utilizada para resuspender y diluir la vacuna debe estar libre de detergentes y desinfectantes.

b) Período de eficacia, incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda:

Vacuna liofilizada: 18 meses.

Después de reconstituida: 4 horas.

c) Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerada entre 2 - 8°C. No congelar. Proteger de la luz solar directa.

d) Descripción de los envases:

Estuche con 10 frascos de vidrio tipo I, etiquetados, cerrados con tapón de goma de clorobutilo y precinto de aluminio conteniendo 2.000 o 4.000 dosis cada uno. Incluye prospecto interno.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración:

Se recomienda eliminar los frascos vacíos y restos del producto sin usar mediante incineración.

6. Condición de venta:

Venta bajo receta médico veterinaria.

7. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante:

Fabricado por:

Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann Strasse 4
27471 Cuxhaven, Alemania.

Importado y distribuido por:

Elanco Chile SpA.
Rosario Norte 615, of 1502,
Las Condes, Santiago, Chile.
Tel.: 800 100 212

Bajo licencia de:

Elanco Animal Health Inc., USA.



USO VETERINARIO

Reg. SAG N° 2402-B