

Elanco

AviPro® Precise
Elanco Animal Health

ETIQUETA ESTUCHE CARA
DELANTERA 10000 DOSIS

Reg. SAG N° 2406-B

AviPro®
PRECISE

Vacuna viva contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa

10 x 10000 dosis

Polvo liofilizado para reconstituir Suspensión Oral.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA

YL209567B

DUMMY

Place the Lactas
glass and move them
from right hand side

**APROBADO
SAG**

02 MAR 2020

Elanco

AviPro® Precise
Elanco Animal Health

ETIQUETA ESTUCHE CARA
TRASERA

AviPro® PRECISE

Vacuna viva contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa. Polvo liofilizado para reconstituir Suspensión Oral.

Cada dosis contiene: Virus bursitis infecciosa, cepa LC 75... > $10^{3.0}$ DIE₅₀. Excipientes c.s.p 1 dosis. **Especie de destino:** Pollos Broiler, pollos/pollas de reemplazo de reproductores y pollas de reemplazo. **Periodo de resguardo:** Cero (0) días. **Condiciones de almacenamiento:** Mantener refrigerado entre (2 - 8°C). No congelar. Proteger de la luz solar directa. **Indicación de uso, Dosis, Vía de administración y modo de empleo, Contraindicaciones, Efectos adversos, Interacciones, Advertencias y precauciones especiales de uso, Precauciones para el operador, Precauciones para la disposición:** ver inserto.

Importado y distribuido por:

Elanco Chile SpA.
Rosario Norte 615, of 1502, piso 15 Las Condes,
Santiago, Chile. Tel.: 56 2 2611 9239

Fabricado por:

Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Strasse 4
27472 Cuxhaven, Alemania

YL209567C

DUMMY

Place the Laminates
glue-mat ends 10mm
from left hand edge

**APROBADO
SAG**

02 MAR 2020

Elanco

AviPro® Precise
Elanco Animal Health

**ETIQUETA VIAL
10000 DOSIS**

Cada dosis contiene: Virus bursitis infecciosa, cepa LC 75.... > 10^{3.0} DIE₅₀.
Excipientes c.s.p 1 dosis.
Especie de destino: Pollos Broiler, pollos/pollas de reemplazo de reproductores y pollas de reemplazo.
Condiciones de almacenamiento: Mantener refrigerado entre 2 - 8°C. No congelar. Proteger de la luz solar directa. Para mayor información: ver inserto.
Fabricado por:
Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Strasse 4
27472 Cuxhaven, Alemania

**AviPro®
PRECISE**

Vacuna viva contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa

10000 dosis

Polvo liofilizado para reconstituir
Suspensión Oral.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

YL209567A
Reg. SAG N°2406-B

N° serie:

Fecha

Fab.:

Vence:

**APROBADO
SAG**

02 MAR 2020

PA209567X

AviPro® PRECISE

Vacuna viva contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa.

USO VETERINARIO

Polvo liofilizado para reconstituir Suspensión Oral.

Cada dosis contiene:

Virus bursitis infecciosa, cepa LC 75 > 10^{3.0} D_{IE50}.
Excipientes c.s.p. 1 dosis

Especie de destino:

Pollos Broiler, pollo/pollas de reemplazo de reproductores
y pollas de reemplazo.

Indicaciones de uso:

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la
Enfermedad Infecciosa de la Bursa (reducción de síntomas
clínicos y lesiones severas en la Bolsa de Fabricio).

Establecimiento de la inmunidad: 14 días post vacunación.

Duración de la inmunidad: hasta 15 semanas.

Dosis:

1 dosis/ave.

Edad o peso:

A partir de los 7 días de edad.

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

Pollos Broiler:

- Con niveles nulos de anticuerpos maternos: a partir de los
7 días de vida.

- Con anticuerpos maternos: a partir de los 14 días de vida.

Pollos/pollas de reemplazo de reproductores y pollas

de reemplazo:

- Con niveles nulos de anticuerpos maternos: a partir de los
7 días de vida.

- Con anticuerpos maternos: a partir de las 3-4 semanas
de vida.

Condición fisiológica:

Animales sanos.

Vía de administración:

Oral, en agua de bebida.

Modo de empleo:

- Determinar el número de dosis de AviPro® PRECISE
y la cantidad de agua (ver más abajo) requerida. No dividir
el contenido del vial para vacunar más de un corral
o sistema de bebederos, ya que esto puede producir
errores de dosificación.
- Asegurar que todos los conductos, mangas, comederos,
bebederos, etc. estén completamente limpios y libre de restos
de detergentes, desinfectantes, etc.
- Asegurar que el agua de bebida esté fría, limpia y libre de
detergentes y desinfectantes para asegurar la viabilidad de la
vacuna. Sólo usar agua fresca, preferentemente libre de cloro
e iones metálicos. Se puede añadir al agua leche descremada
en polvo con bajo contenido de grasa (por ejemplo, < 1% de
grasa) (2 - 4 g/L) o leche descremada fluida (20 - 40 mL/L de
agua) para mejorar su calidad y aumentar la estabilidad de
AviPro® PRECISE. Realizar este procedimiento 10 minutos
antes de la reconstitución de AviPro® PRECISE.
- Abrir el envase de AviPro® PRECISE debajo del agua
y reconstituir completamente su contenido.
Vaciar cuidadosamente y completamente el envase
y enjuagarlo junto con el tapón con agua.
- Dejar que el agua de los bebederos se consuma hasta niveles
mínimos antes de la vacunación. Eliminar el agua de todos los
conductos antes de la administración de AviPro® Precise,
de manera que los bebederos contengan exclusivamente
agua con la vacuna.
- Administrar AviPro® PRECISE durante (hasta) 2 horas
y asegurar que todas las aves beban durante este tiempo.
Dado que la conducta trófica relativa a la ingestión de agua
varía entre las aves, puede ser necesario el retiro previo del
agua potable de algunos sitios antes de la vacunación, con
el fin de garantizar que todos los animales beban durante el
período de vacunación.
- El objetivo es que cada ave consuma 1 dosis de
AviPro® PRECISE.
- Idealmente, administrar la vacuna en el volumen de agua
consumido por los animales en un plazo de 2 horas. Como
regla general, la vacuna reconstituida generalmente se añade
al agua fría y fresca en una proporción de 1000 dosis de
vacuna por litro de agua por día de edad para 1000 aves.
Por ejemplo, para 1000 aves de 10 días de edad se
necesitarán 10 litros.
A altas temperaturas o para razas pesadas esta cantidad
podría aumentarse hasta un máximo de 40 litros por cada
1000 animales. En caso de duda, medir la cantidad de agua
ingerida el día antes de la vacunación.

APROBADO
SAG

02 MAR 2020

DUMMY

- Administrar la vacuna inmediatamente una vez reconstituida. Durante la vacunación los animales no deberán tener acceso a otra fuente de agua.
- Proteger la vacuna reconstituida de la luz directa del sol y de temperaturas superiores a 25°C.
- Preparar solamente el volumen de **AviPro® PRECISE** que se administrará dentro de 2 horas.

Efectos y reacciones adversas:

Siete días después de la vacunación se puede apreciar una disminución general moderada de linfocitos en la mayoría de las aves. La repoblación de linfocitos se produce 7 días después de la vacunación y 28 días después de ella sólo se mantiene una necrosis leve de la bursa, en algunas aves.

Contraindicaciones:

No vacunar aves enfermas.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

La vacuna se puede propagar a los pollos no vacunados, ya que se excreta en las heces por al menos 9 días. Evitar la propagación a las gallinas ponedoras.

Para reducir la presión infecciosa antes del inicio de la inmunidad, es recomendable retirar el material de cama y limpiar el corral entre los ciclos de cría.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones especiales para el operador:

No rociar ni derramar durante la administración.

Lavar y desinfectar manos y equipo luego de la vacunación.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y la eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Sobredosis:

La administración de 10 veces la dosis se considera segura. Sin embargo, no se recomienda sobredosificar.

Período de eficacia:

Una vez reconstituida, aplicar dentro de 2 horas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerada entre 2 - 8°C. No congelar.

Proteger de la luz solar directa.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o material de desecho:

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Período de resguardo:

Cero (0) días.

Presentaciones:

Caja 10 viales x 1000 dosis.

Caja 10 viales x 10000 dosis.

Fabricado por:

Lohmann Animal Health GmbH
Heinz-Lohmann-Strasse 4
27472 Cuxhaven, Alemania.

Importado y distribuido por:

Elanco Chile SpA.
Rosario Norte 615, piso 15, of. 1502
Las Condes, Santiago, Chile.
Tel.: 56 2 2611 9239

Bajo licencia de:

Elanco Animal Health Incorporated, USA.

Registro SAG N° 2406-B

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

AviPro, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

**APROBADO
SAG**

02 MAR 2020

DUMMY

Elanco

Resumen de Características del Producto Inmunológico


1. Denominación del producto inmunológico:

- a) **Nombre de fantasía:** AviPro® Precise
- b) **Nombre genérico:** Vacuna viva contra la Enfermedad Infecciosa de la Bursa
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral

2. Composición:

Cada dosis contiene:

Virus Bursitis Infecciosa, cepa LC 75..... > 10^{3.0} DIE₅₀.
Excipientes c.s.p..... 1 dosis



3. Propiedades inmunológicas:

Para estimular la inmunidad activa contra el virus Gumboro (Enfermedad Infecciosa de la Bursa).

4. Particularidades clínicas:

a) **Especie(s) de destino y subcategoría(s):**

Pollos broiler, pollos/pollas de reemplazo de reproductoras y pollas de reemplazo.

b) **Indicación(es) de uso:**

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad Infecciosa de la Bursa (reducción de los síntomas clínicos y las lesiones severas en la bolsa de Fabricio).

Establecimiento de la inmunidad: 14 días post vacunación.

Duración de la inmunidad: hasta 15 semanas.

c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía(s) de administración y modo de empleo:**

Dosis:

1 dosis/ave.

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

- Pollos broiler:
 - Con niveles nulos de anticuerpos maternos: a partir de los 7 días de vida.
 - Con anticuerpos maternos: a partir de los 14 días de vida.
- Pollos/pollas de reemplazo de reproductores y pollas de reemplazo:
 - Con niveles nulos de anticuerpos maternos: a partir de los 7 días de vida.
 - Con anticuerpos maternos: a partir de las 3-4 semanas de vida.

Edad:

A partir de los 7 días de edad.

Condición fisiológica:

Animales sanos.

Vía(s) de administración:

Oral, en el agua de bebida.

**APROBADO
SAG**

02 MAR 2020

Modo de empleo:

- Determinar el número de dosis de AviPro® Precise y la cantidad de agua (ver más abajo) requerida. No dividir el contenido del vial para vacunar más de un corral o sistema de bebederos, ya que esto puede producir errores de dosificación.
- Asegurar que todos los conductos, mangas, comederos, bebederos, etc. están completamente limpios y libre de restos de detergentes, desinfectantes, etc.
- Asegurar que el agua de bebida está fría, limpia y libre de detergentes y desinfectantes para asegurar la viabilidad de la vacuna. Sólo usar agua fresca, preferentemente libre de cloro e iones metálicos. Se puede añadir al agua leche descremada en polvo con bajo contenido de grasa (por ejemplo, < 1% de grasa) (2 – 4 g/L) o leche descremada fluida (20 – 40 mL/L de agua) para mejorar su calidad y aumentar la estabilidad de AviPro® Precise. Realizar este procedimiento 10 minutos antes de la reconstitución de AviPro® Precise.
- Abrir el envase de AviPro® Precise debajo de agua y reconstituir completamente su contenido. Vaciar cuidadosamente y completamente el envase y enjuagarlo junto con el tapón con agua.
- Dejar que el agua de los bebederos se consuma hasta niveles mínimos antes de la vacunación. Eliminar el agua de todos los conductos, de manera que los bebederos contengan exclusivamente agua con la vacuna. Vaciar el agua de los conductos antes de la administración de AviPro® Precise.
- Administrar AviPro® Precise durante (hasta) 2 horas y asegurar que todas las aves beban durante este tiempo. Dado que la conducta trófica relativa a la ingestión de agua varía entre las aves, puede ser necesario el retiro previo del agua potable de algunos sitios antes de la vacunación, con el fin de garantizar que todos los animales beban durante el período de vacunación.
- El objetivo es que cada ave consuma 1 dosis de AviPro® Precise.
- Idealmente, administrar la vacuna en el volumen de agua consumido por los animales en un plazo de 2 horas. Como regla general, la vacuna reconstituida generalmente se añade al agua fría y fresca en una proporción de 1000 dosis de vacuna por litro de agua por día de edad para 1000 aves. Por ejemplo, para 1000 aves de 10 días de edad se necesitarán 10 litros. A altas temperaturas o para razas pesadas esta cantidad podría aumentarse hasta un máximo de 40 litros por cada 1000 animales. En caso de duda, medir la cantidad de agua ingerida el día antes de la vacunación.
- Administrar la vacuna inmediatamente una vez reconstituida. Durante la vacunación los animales no deberán tener acceso a otra fuente de agua.
- Proteger la vacuna reconstituida de la luz directa del sol y de temperaturas superiores a 25°C.
- Preparar solamente el volumen de AviPro® Precise que se administrará dentro de 2 horas.

d) Contraindicaciones:

No vacunar aves enfermas.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:

Siete días después de la vacunación se puede apreciar una disminución general moderada de linfocitos en la mayoría de las aves. La repoblación de linfocitos se produce 7 días después de la vacunación y 28 días después de ella sólo se mantiene una necrosis leve de la bursa, en algunas aves.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso:

La vacuna se puede propagar a los pollos no vacunados, ya que se excreta en las heces por al menos 9 días. Evitar la propagación a las gallinas ponedoras.

Para reducir la presión infecciosa antes del inicio de la inmunidad, es recomendable retirar el material de cama y limpiar el corral entre los ciclos de cría.

Mantener fuera del alcance de los niños.

g) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

No aplicar durante el período de postura.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado:

No existe información disponible respecto de la seguridad y la eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis:

La administración de 10 veces la dosis se considera seguro. Sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) Período de resguardo:

Cero (0) días.

k) Precauciones especiales para el operador:

No rociar ni derramar durante la administración. Lavar y desinfectar manos y equipos luego de la vacunación.

5. Particularidades farmacéuticas:

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado:

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

b) Período de eficacia, incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda:

36 meses.

Una vez reconstituida, aplicar dentro de 2 horas.

c) Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado: entre 2 - 8 °C. No congelar. Proteger de la luz solar directa.

d) Descripción de los envases:

Estuche de cartón con 10 frascos de vidrio tipo 1, etiquetados, cerrados con tapón de elastómero de clorobutilo y precinto de aluminio conteniendo 1.000 ó 10.000 dosis. Incluye prospecto interno.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración:

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6. Condición de venta:

Venta bajo receta médico veterinaria.

7. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante:

Fabricado por:


Lohmann Animal Health GmbH
Heinz- Lohmann-Strasse 4, 27471
Cuxhaven, Alemania

Importado y distribuido por:

Elanco Chile SpA.
Rosario Norte 615, of 1502, piso 15,
Las Condes, Santiago, Chile.
Tel.: 56 2 2611 9239

Bajo licencia de:

Elanco Animal Health Incorporated, USA.



USO VETERINARIO

Reg. SAG N° 2406-B