

PROSPECTO

Novamune®

Vacuna viva congelada de complejo inmune contra la Enfermedad de Gumboro
Suspensión Inyectable

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

COMPOSICIÓN

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Gumboro, Cepa SYZA26

Excipientes csp

$\geq 10^{2.65}$ DIC₅₀
0,2 mL

APROBADO
SAG
23-08-2023

ESPECIE DE DESTINO Y SUBCATEGORÍA: Pollitas de reemplazo

INDICACIONES DE USO

Inmunización active, para reducir la mortalidad, los signos clínicos, las lesiones agudas de la bolsa de Fabricio y para prevenir la excreción viral.

-Establecimiento de la inmunidad: a partir de las 4 semanas posteriores a la vacunación, dependiendo de los niveles de anticuerpos de origen materno (MDA).

-Duración de la inmunidad: 9 semanas posteriores a la vacunación.

POSOLOGÍA, EDAD O PESO, CONDICIÓN FISIOLÓGICA, VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Se aplica una inyección de 0.2 ml por ave, una sola vez, a la edad de un día. La vacuna debe ser administrada por inyección subcutánea bajo la piel del cuello, mediante un dispositivo de inyección automático o manual.

Cantidad de ampollas por vacuna	Solvente (ml)	Volumen de una dosis (ml)
4 x 500	400	0.2
8 x 500	800	0.2
10 x 500	1000	0.2
2 x 1000	400	0.2
4 x 1000	800	0.2
5 x 1000	1000	0.2
1 x 2000	400	0.2
2 x 2000	800	0.2

Se deben aplicar las precauciones asépticas normales.

Los usuarios deben familiarizarse con todas las medidas de seguridad y de precaución para la manipulación de nitrógeno líquido, con el fin de evitar lesiones personales.

Instrucciones para la preparación de la vacuna:

1. Tras establecer el volumen de dosis de la(s) ampolla(s) de vacuna con el formato de disolvente, retirar rápidamente el número exacto de ampollas que se necesiten del contenedor de nitrógeno líquido.
2. Retirar 2 - 5 ml de disolvente en una jeringa estéril de 5 - 10 ml. Usar una aguja de calibre 18 como mínimo.
3. Descongelar rápidamente el contenido de las ampollas por agitación suave en agua a 27–39 °C.
4. Tan pronto como estén completamente descongeladas, abrir las ampollas manteniéndolas a una distancia correspondiente a la longitud del brazo para prevenir cualquier riesgo de lesión si se rompiera la ampolla.
5. Una vez abierta la ampolla, lentamente retirar su contenido en la jeringa estéril que ya contiene los 2-5 ml de disolvente.
6. Transferir la suspensión descongelada a la bolsa de disolvente. La vacuna preparada según se ha descrito, se mezcla por agitación suave.
7. Retirar con la jeringa una porción de la vacuna y usarla para enjuagar la ampolla. Transferir suavemente el enjuagado de la ampolla a la bolsa de disolvente. Repetir una o dos veces.
8. Repetir los pasos 2 – 7 con el total de las ampollas descongeladas.
9. La vacuna preparada según se ha descrito, se mezcla mediante agitación suave para que esté lista para su uso.
10. Una vez reconstituida, usar antes de 2 horas.

EFFECTOS ADVERSOS O REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y SEVERIDAD) EN LA(S) ESPECIE(S) DE DESTINO DERIVADOS DEL USO DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

En pollas vacunadas, se ha observado muy frecuentemente una ligera a moderada depleción linfocitaria, que es máxima alrededor de los 7 días tras la vacunación. Después de 7 días esta depleción disminuye y es seguida por una repoblación linfocitaria y una regeneración de la bolsa de Fabricio.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Vacunar únicamente animales sanos.
- Vacunar únicamente aves MDA positivas, que tengan al menos niveles medios de MDA al día de edad de 2500 unidades ELISA.
- Los pollos vacunados pueden eliminar la cepa vacunal hasta 14 días después de la vacunación. Durante este tiempo debe evitarse el contacto de pollos inmunodeprimidos o no vacunados con pollos vacunados.
- Deben adoptarse las medidas de manejo pertinentes para evitar la propagación de la cepa vacunal a aves susceptibles.
- Todas las aves del lote deberán vacunarse a la vez.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
23-08-2023

USO DURANTE LA POSTURA

No use en aves en postura ni dentro de 4 semanas anteriores al inicio del periodo de postura.

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUANDO SON ADMINISTRADOS EN FORMA CONCOMITANTE CON EL PRODUCTO INMUNOLÓGICO Y SUS POSIBLES EFECTOS EN EL ANIMAL TRATADO.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización

SOBREDOSIS.

La aplicación de 10 veces la dosis ha demostrado ser segura, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

PERIODO DE RESGUARDO: 0 días.

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

PRINCIPALES INCOMPATIBILIDADES FÍSICAS O QUÍMICAS CON OTROS PRODUCTOS CON LOS CUALES ES NORMALMENTE DILUÍDO, MEZCLADO O CO-ADMINISTRADO

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente (Cevac Solvent Poultry) que forma parte de la vacuna.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar ingerir alimentos o fumar durante la manipulación de la vacuna.

Los tanques de nitrógeno líquido y los envases de la vacuna deben ser manipulados únicamente por personal capacitado. Durante las operaciones de descongelación y apertura de la ampolla, al manipular el producto medicinal veterinario, se debe utilizar equipo de protección personal, que consiste en guantes y lentes de protección.

Se deben abrir las ampollas mientras se sostienen a una distancia de lo largo del brazo, con el fin de prevenir cualquier riesgo de lesión, en caso de ruptura de la ampolla. Las ampollas congeladas de vidrio pueden explotar durante cambios repentinos de temperatura.

El personal involucrado en la atención de aves vacunadas debe seguir los principios de higiene general (cambio de ropa, uso de guantes, limpieza y desinfección de botas) y tener un cuidado especial al manejar los desechos de los pollos vacunados.

PERÍODO DE EFICACIA (ESTABILIDAD)

Vacuna congelada: 24 meses

Diluyente: 30 meses

La vacuna debe usarse dentro de las 2 horas posteriores a su dilución.

APROBADO
SAG
23-08-2023

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE PRODUCTO SIN UTILIZAR Y EL EQUIPO UTILIZADO PARA SU ADMINISTRACIÓN

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener la vacuna congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

Mantener el diluyente a temperatura ambiente entre 15-30°C. No refrigerar.

PRESENTACIÓN

Vacuna: Ampollas de 500, 1.000 o 2.000 dosis.

El número de dosis por ampolla se presenta en una etiqueta de color, adjunta a cada pajilla.

Diluyente: Bolsa de cloruro de polivinilo, etiquetada conteniendo 400, 800 o 1.000, mL

FABRICADO POR

Ceva–Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

1107 Budapest, Szállás u. 5., HUNGRÍA

APROBADO
SAG

23-08-2023

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Importado y distribuido por

Ceva Salud Animal Chile SpA,

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile.

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Bajo licencia de Ceva–Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA

REGISTRO SAG N°

Novamune IBD



SC

For animal treatment only/ Uso veterinario/
Usage vétérinaire / Para uso animal únicamente
Ceva-Phylaxia Co. Ltd.

Lot/Lote/Part:

APROBADO
SAG

23-08-2023

Mfg/Fab/Fabr:

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

EXP/Venc:

L12

Batch N°
1000 D

Batch N°
2000 D



Cevac Solvent Poultry

DILUYENTE PARA RECONSTITUIR VACUNAS AVIARES

400 ml

No usar el diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: Mantener entre 5-25° C.
No congelar.

Utilizar todo el contenido después de preparado.

Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago Chile.

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Hungría.

Para ser usado en la vacuna Reg. SAG N°:

Fabricado por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Hungría.

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
23-08-2023

EXP:

Lot:

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

23-08-2023



Cevac Solvent Poultry

DILUYENTE PARA RECONSTITUIR VACUNAS AVIARES

800 ml

No usar el diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: Mantener entre 5-25° C.
No congelar.

Utilizar todo el contenido después de preparado.

Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago Chile.

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Hungría.

Para ser usado en la vacuna Reg. SAG N°:

Fabricado por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Hungría.

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
23-08-2023

EXP:

Lot:

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

23-08-2023



Cevac Solvent Poultry

DILUYENTE PARA RECONSTITUIR VACUNAS AVIARES

1000 ml

No usar el diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: Mantener entre 5-25° C.
No congelar.

Utilizar todo el contenido después de preparado.

Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Importado y distribuido por: Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago Chile.

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Hungría.

Para ser usado en la vacuna Reg. SAG N°:

Fabricado por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Hungría.

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
23-08-2023

EXP:

Lot:

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

23-08-2023



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1.- Denominación del producto inmunológico

- a) Nombre Fantasía: Novamune®
- b) Genérico: Vacuna viva congelada de complejo inmune contra la Enfermedad de Gumboro
- c) Forma Farmacéutica: Suspensión inyectable

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

2.- Composición

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Gumboro, Cepa SYZA26
Excipientes csp

$\geq 10^{2.65}$ DIC₅₀
0,2 mL

APROBADO
SAG
23-08-2023

3.- Propiedades inmunológicas

Para estimular de inmunidad activa contra virus Gumboro. El contenido de anticuerpos presentes en la vacuna, forman un complejo inmune con el virus vacunal de tipo intermedio- plus o caliente que permite la liberación lenta del virus y su replicación en la bolsa de Fabricio, cuando los anticuerpos neutralizantes maternos alcanzan un valor de 6000 unidades ELISA.

4.- Particularidades clínicas:

a) Especie de destino y subcategoría.

Pollitas de reemplazo

b) Indicaciones de uso

Inmunización activa, para reducir la mortalidad, los signos clínicos, las lesiones agudas de la bolsa de Fabricio y para prevenir la excreción viral.

-Establecimiento de la inmunidad: a partir de las 4 semanas posteriores a la vacunación, dependiendo de los niveles de anticuerpos de origen materno (MDA).

-Duración de la inmunidad: 9 semanas posteriores a la vacunación.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.

Dosis:

0,2 ml dosis/ave

Frecuencia e intervalo:

Dosis única

**Edad o peso:**

Administrar al día de edad

Condición fisiológica:

Animales sanos

Vía de administración

Subcutánea, bajo la piel del cuello

**APROBADO
SAG**

23-08-2023

**REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

Modo de empleo:

Administrar de forma aséptica, mediante un dispositivo de inyección automático o manual.

Cantidad de ampollas por vacuna	Solvente (ml)	Volumen de una dosis (ml)
4 x 500	400	0.2
8 x 500	800	0.2
10 x 500	1000	0.2
2 x 1000	400	0.2
4 x 1000	800	0.2
5 x 1000	1000	0.2
1 x 2000	400	0.2
2 x 2000	800	0.2

Instrucciones para la preparación de la vacuna:

1. Tras establecer el volumen de dosis de la(s) ampolla(s) de vacuna con el formato de disolvente, retirar rápidamente el número exacto de ampollas que se necesiten del contenedor de nitrógeno líquido.
2. Retirar 2 - 5 ml de disolvente en una jeringa estéril de 5 - 10 ml. Usar una aguja de calibre 18 como mínimo.
3. Descongelar rápidamente el contenido de las ampollas por agitación suave en agua a 27–39 °C.
4. Tan pronto como estén completamente descongeladas, abrir las ampollas manteniéndolas a una distancia correspondiente a la longitud del brazo para prevenir cualquier riesgo de lesión si se rompiera la ampolla.
5. Una vez abierta la ampolla, lentamente retirar su contenido en la jeringa estéril que ya contiene los 2-5 ml de disolvente.
6. Transferir la suspensión descongelada a la bolsa de disolvente. La vacuna preparada según se ha descrito, se mezcla por agitación suave.
7. Retirar con la jeringa una porción de la vacuna y usarla para enjuagar la ampolla. Transferir suavemente el enjuagado de la ampolla a la bolsa de disolvente. Repetir una o dos veces.
8. Repetir los pasos 2 – 7 con el total de las ampollas descongeladas.
9. La vacuna preparada según se ha descrito, se mezcla mediante agitación suave para que esté lista para su uso.
10. Una vez reconstituida, usar antes de 2 horas.



d) Contraindicaciones

No vacunar pollitas procedentes de gallinas no vacunadas o que no tengan anticuerpos de origen materno (MDA) frente al virus Gumboro, ya que la vacunación de estas aves puede causar inmunosupresión

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:

En pollas vacunadas, se ha observado muy frecuentemente una leve a moderada depleción linfocitaria, que es máxima alrededor de los 7 días tras la vacunación. Después de 7 días esta depleción disminuye y es seguida por una repoblación linfocitaria y una regeneración de la bolsa de Fabricio.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso.

- Vacunar únicamente animales sanos.
- Vacunar únicamente aves MDA positivas, que tengan al menos niveles medios de MDA al día de edad de 2500 unidades ELISA.
- Los pollos vacunados pueden eliminar la cepa vacunal hasta 14 días después de la vacunación. Durante este tiempo debe evitarse el contacto de pollas inmunodeprimidas o no vacunadas con pollas vacunadas.
- Deben adoptarse las medidas de manejo pertinentes para evitar la propagación de la cepa vacunal a aves susceptibles.
- Todas las aves del lote deberán vacunarse a la vez.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

APROBADO
SAG
23-08-2023

g) Uso durante la postura.

No use en aves en postura ni dentro de 4 semanas anteriores al inicio del periodo de postura

h) Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización

i) Sobredosis.

La aplicación de 10 veces la dosis ha demostrado ser segura, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) Período de resguardo.

0 días.



k) Precauciones especiales para el operador.

Evitar ingerir alimentos o fumar durante la manipulación de la vacuna.

Los tanques de nitrógeno líquido y los envases de la vacuna deben ser manipulados únicamente por personal capacitado. Durante las operaciones de descongelación y apertura de la ampolla, al manipular el producto medicinal veterinario, se debe utilizar equipo de protección personal, que consiste en guantes y lentes de protección.

Se deben abrir las ampollas mientras se sostienen a una distancia de lo largo del brazo, con el fin de prevenir cualquier riesgo de lesión, en caso de ruptura de la ampolla. Las ampollas congeladas de vidrio pueden explotar durante cambios repentinos de temperatura.

El personal involucrado en la atención de aves vacunadas debe seguir los principios de higiene general (cambio de ropa, uso de guantes, limpieza y desinfección de botas) y tener un cuidado especial al manejar los desechos de los pollos vacunados.

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

5.- Particularidades farmacéuticas.

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado.

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente (Cevac Solvent Poultry) que forma parte de la vacuna.

b) Período de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda.

Vacuna congelada: 24 meses

Diluyente: 30 meses

La vacuna debe usarse dentro de las 2 horas posteriores a su dilución.

c) Condiciones de almacenamiento.

Mantener la vacuna congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

Mantener el diluyente a temperatura ambiente entre 15-30°C. No refrigerar.

d) Descripción de los envases.

-Vacuna: Ampolla de vidrio claro tipo I, impresa, conteniendo 500, 1.000 o 2.000 dosis. Las ampollas se disponen en una pajilla, provista de una etiqueta en la que se indica el N° de dosis.

-Diluyente: Bolsa de cloruro de polivinilo, etiquetada conteniendo 400, 800 o 1000 mL

-Incluye prospecto.

APROBADO
SAG
23-08-2023



e)Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración.

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6.- Condición de venta.

Venta bajo receta médico veterinaria.

REGISTRO SAG N° 2601-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

7.- Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante

Fabricado por

Ceva–Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u. 5. Hungría.

APROBADO
SAG
23-08-2023

Importado y distribuido por

Ceva Salud Animal Chile SpA,
Avda. Apoquindo 3669, Of 801, Las Condes, Santiago – Chile.

Bajo licencia de Ceva–Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Hungría

USO VETERINARIO

Registro SAG N°