



## PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO

**ETIQUETA CAJA****Nobilis® Coryza**Vacuna inactivada *Avibacterium paragallinarum*

Suspensión Inyectable

Pollas de reemplazo y gallinas ponedoras

Reg. SAG N° \_\_\_\_-B

**USO VETERINARIO****Contenido: 12 x 1 frasco de 1.000 dosis (250 mL)****LEER INSERTO ANTES DE USAR****PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA****Composición**Cada dosis contiene:*A. Paragallinarum* Cepa 083 (serotipo A)  $\geq 1$  CPD<sub>70</sub><sup>1</sup>*A. Paragallinarum* Cepa Spross (serotipo B)  $\geq 1$  CPD<sub>70</sub><sup>1</sup>*A. Paragallinarum* Cepa H-18 (serotipo C)  $\geq 1$  CPD<sub>70</sub><sup>1</sup>

Excipientes c.s.p. 0,25 mL

Adyuvante: Saponina purificada

1 70% dosis protectora pollo

**REGISTRO SAG N° 2691-B**  
**SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO****Condiciones de almacenamiento**

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°. No congelar. Proteger de la luz.

Una vez abierto utilizar dentro de 3 horas.

**APROBADO**  
**SAG****Mantener fuera del alcance de los niños.****VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA****13-11-2024****Fabricado por:** Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda**Importado y distribuido por:** Intervet Veterinaria Chile Limitada. Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile. **Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.****SERIE:****F. FAB.:****VENCE:**

PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO

---

**ETIQUETA FRASCO**

**Nobilis® Coryza**

Vacuna inactivada *Avibacterium paragallinarum*

Suspensión inyectable

Pollas de reemplazo y gallinas ponedoras

**USO VETERINARIO**

**Contenido: 1.000 dosis (250 mL)**

**LEER INSERTO ANTES DE USAR**

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°. No congelar. Proteger de la luz.

Una vez abierto utilizar dentro de 3 horas.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA**

**Fabricado por:**

Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holanda

REGISTRO SAG N° 2691-B

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

**Importado y distribuido por:**

Intervet Veterinaria Chile Limitada.

Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.

**Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.**

**Reg. SAG N° \_\_\_\_\_-B**

**SERIE:**

**F. FAB.:**

**VENCE:**

## PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO

**INSERTO**
**Nobilis® Coryza**

 Vacuna inactivada *Avibacterium paragallinarum*

Suspensión inyectable.

**USO VETERINARIO**
**Composición**
Cada dosis contiene:

 A. *Paragallinarum* Cepa 083 (serotipo A)  $\geq 1$  CPD<sub>70</sub><sup>1</sup>

 A. *Paragallinarum* Cepa Spross (serotipo B)  $\geq 1$  CPD<sub>70</sub><sup>1</sup>

 A. *Paragallinarum* Cepa H-18 (serotipo C)  $\geq 1$  CPD<sub>70</sub><sup>1</sup>

Excipientes c.s.p. 0,25 mL

Adyuvante: Saponina purificada

<sup>1</sup> 70% dosis protectora pollo

**Especie de destino**

Pollas de reemplazo y gallinas ponedoras.

**Indicaciones de uso**

 Inmunización activa para la reducción de los signos clínicos de Coriza Infecciosa, causada por *Avibacterium paragallinarum* serotipo A, B y C y reducción de la tasa de reisolamiento bacteriano.

Inicio de inmunidad: 2 semanas.

Duración de inmunidad: 52 semanas.

**Dosis**

0,25 mL.

**APROBADO**  
**SAG**  
 13-11-2024

**Edad o peso**

A partir de las 10 semanas de edad.

REGISTRO SAG N° 2691-B  
 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

**Esquema de vacunación**

- 1° dosis: entre 10-12 semanas de edad
- 2° dosis: revacunar a lo menos 4 semanas posterior a la primera dosis y a más tardar 4-6 semanas antes del inicio de la postura.

---

**PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO**

---

**Condición fisiológica**

Aves sanas.

**Vía de administración**

Vía intramuscular

**Modo de empleo**

Agitar bien antes de usar

Deben ser utilizados procedimientos asépticos comunes durante la vacunación.  
Solo deben utilizarse jeringas y agujas estériles.

REGISTRO SAG N° 2691-B  
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

**Contraindicaciones**

No vacunar dentro de las 4-6 semanas antes del inicio de la postura.

**Efectos o reacciones adversas**

Ocasionalmente se observa una hinchazón transitoria de suave a dura (10 mm) en el lugar de la inyección. Estas hinchazones desaparecen en 2 semanas.

**Advertencias y precauciones especiales de uso**

Mantener fuera del alcance de los niños.

APROBADO  
SAG  
13-11-2024

**Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores**

No vacunar durante la postura.

**Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

**Sobredosis**

No se observan otras reacciones locales y sistémicas después de la vacunación con una sobredosis que las observadas después de la vacunación con una dosis única.

**Período de resguardo**

Cero (0) días.

---

**PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO**

---

**Precauciones especiales para el operador**

En caso de autoinyección accidental, busque atención médica inmediatamente y muestre al médico el prospecto o la etiqueta.

**Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

**Condiciones de almacenamiento**

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°. No congelar. Proteger de la luz.  
Una vez abierto utilizar dentro de 3 horas.

**Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración**

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados

**Venta Bajo Receta Médico Veterinaria****Fabricado por:**

Intervet International B.V.  
Wim de Korverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Holanda

REGISTRO SAG N° 2691-B  
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO  
SAG

13-11-2024

**Importado y distribuido por:**

Intervet Veterinaria Chile Limitada.  
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.

**Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.**

**Reg. SAG N° \_\_\_\_\_-B**

## PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO

**RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**
**1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO**
**a) Nombre de fantasía**

Nobilis® Coryza

**b) Nombre genérico**

 Vacuna inactivada *Avibacterium paragallinarum*
**c) Forma farmacéutica**

Suspensión inyectable.

 REGISTRO SAG N° 2691-B  
 SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

**2. COMPOSICIÓN**
Cada dosis contiene:

 A. *Paragallinarum* Cepa 083 (serotipo A)  $\geq 1$  CPD<sub>70</sub><sup>1</sup>

 A. *Paragallinarum* Cepa Spross (serotipo B)  $\geq 1$  CPD<sub>70</sub><sup>1</sup>

 A. *Paragallinarum* Cepa H-18 (serotipo C)  $\geq 1$  CPD<sub>70</sub><sup>1</sup>

Excipientes c.s.p. 0,25 mL

Adyuvante: Saponina purificada

<sup>1</sup> 70% dosis protectora pollo

 APROBADO  
 SAG  
 13-11-2024

**3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS**

 Para estimular la inmunidad activa homologa (serotipo-especifica) contra *Avibacterium paragallinarum* serotipos A, B y C.

**4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS**
**a) Especie de destino**

Pollas de reemplazo y gallinas ponedoras.

**b) Indicaciones de uso**

 Inmunización activa para la reducción de los signos clínicos de Coriza Infecciosa, causada por *Avibacterium paragallinarum* serotipo A, B y C y reducción de la tasa de reaislamiento bacteriano.

---

**PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO**

---

Inicio de inmunidad: 2 semanas.

Duración de inmunidad: 52 semanas.

**c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo**

Dosis:

0,25 mL.

Edad o peso:

A partir de las 10 semanas de edad.

Esquema de vacunación:

- 1° dosis: entre 10-12 semanas de edad
- 2° dosis: revacunar a lo menos 4 semanas posterior a la primera dosis y a más tardar 4-6 semanas antes del inicio de la postura.

Condición fisiológica:

Aves sanas.

REGISTRO SAG N° 2691-B  
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Vía de administración:

Vía intramuscular

APROBADO  
SAG

13-11-2024

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar

Deben ser utilizados procedimientos asépticos comunes durante la vacunación.

Solo deben utilizarse jeringas y agujas estériles.

**d) Contraindicaciones**

No vacunar dentro de las 4-6 semanas antes del inicio de la postura.

**e) Efectos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico**

Ocasionalmente se observa una hinchazón transitoria de suave a dura (10 mm) en el lugar de la inyección. Estas hinchazones desaparecen en 2 semanas.

---

**PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO**

---

**f) Advertencias y precauciones especiales de uso**

Mantener fuera del alcance de los niños.

**g) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores**

No vacunar durante la postura.

**h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

REGISTRO SAG N° 2691-B  
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

**i) Sobredosis**

No se observan otras reacciones locales y sistémicas después de la vacunación con una sobredosis que las observadas después de la vacunación con una dosis única.

APROBADO  
SAG  
13-11-2024

**j) Período de resguardo**

Cero (0) días.

**k) Precauciones especiales para el operador**

En caso de autoinyección accidental, busque atención médica inmediatamente y muestre al médico el prospecto o la etiqueta.

**5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS****a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

**b) Período de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda.**

Frasco PET: 24 meses

Frasco Vidrio: 12 meses

Una vez abierto utilizar dentro de 3 horas.

**PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO**

---

**c) Condiciones de almacenamiento**

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°. No congelar. Proteger de la luz.

**d) Descripción de los envases**

Caja de cartón etiquetada conteniendo 12 frascos de vidrio o PET, etiquetados, cerrados con tapón de halógenobutilo y sellados con capsula de aluminio codificada, conteniendo 250 mL, equivalente a 1.000 dosis. Incluye inserto.

**e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración**

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

**6. CONDICIÓN DE VENTA**

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

**7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA FABRICANTE Y DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA EMPRESA LICENCIANTE****Fabricado por:**

Intervet International B.V.  
Wim de Korverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Holanda

REGISTRO SAG N° 2691-B  
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO  
SAG

13-11-2024

**Importado y distribuido por:**

Intervet Veterinaria Chile Limitada.  
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.

**Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.**

**USO VETERINARIO**

Reg. SAG N° \_\_\_\_-B