

REGISTRO SAG N° 2709-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Nobilis Rismavac

CVI988

APROBADO
SAG

29-08-2025



MSD

Animal Health

Lot Exp.

imprint area


INSERT

Nobilis®
RISMAVAC

APROBADO
SAG
29-08-2025



VACUNA VIVA ASOCIADA A CÉLULAS CONTRA LA
ENFERMEDAD DE MAREK, RISPENS, SEROTIPO 1,
CONGELADA.



USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Herpes (HCV), Cepa CVI 988 (Rispens) $\geq 3.0 \log_{10}$ TCID₅₀

Excipientes c.s.p. 0,2 mL

- Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B, Neomicina y/o Polimixina B.

INDICACIONES

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de los signos asociados a la enfermedad de Marek producida por cepas muy virulentas.

ESPECIE DE DESTINO

Aves.

Chile: Pollos broiler, pollos/pollas de reemplazo de reproductores y pollas de reemplazo.

México: Aves de postura/reproductoras/progenitoras.

Perú: Pollitas de reemplazo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar vía subcutánea en el cuello o intramuscular en la pierna (aves de un día de edad). o por vacunación *in-ovo* en embriones de 18 días de edad.

DOSIS

Inyectar 0,2 ml por ave o 0,05 ml por huevo embrionado.

El contenido entero del frasco debe ser usado dentro de las dos horas después de hacer la mezcla.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

AMPOLLA/AMPOLLETA: Mantener congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

DILUYENTE: Mantener a temperatura ambiente, por debajo de 30°C .

La vacuna reconstituida no debe ser expuesta a luz solar directa o calor.

CONTENEDOR: Mantener en posición vertical, bien nivelado, en una zona limpia, ventilada y alejada de fuentes de calor

PRECAUCIONES PARA EL OPERADOR

El contenedor de Nitrógeno Líquido y la vacuna deberán ser manipulados solamente por personal apropiadamente entrenado, con elementos de seguridad apropiados considerando las precauciones de seguridad para la manipulación de nitrógeno líquido y los materiales que se encuentran a muy baja temperatura. Debe tenerse extremo cuidado para evitar la contaminación de las manos, ojos y vestimenta con la vacuna.

PREPARACIÓN DE LA VACUNA

ESTERILIZAR EL EQUIPO DE VACUNACIÓN HIRVIÉNDOLO EN AGUA POR 20 MINUTOS O MEDIANTE AUTOCLAVE (15 MINUTOS A 121°C) NO USAR DESINFECTANTES QUÍMICOS.

PREPARAR SOLAMENTE LA VACUNA QUE VA A SER APLICADA DURANTE LA PRÓXIMA HORA.

1. Use el contenido de una ampolla/ampolleta de vacuna de 1000 dosis por bolsa de diluyente estéril de 200 mL y 2000 dosis por bolsa de diluyente estéril de 400 mL. Para vacunación *in ovo* utilice 50 mL de diluyente estéril por cada 1000 dosis de vacuna.
2. Antes de retirar la vacuna del contenedor de nitrógeno líquido, protéjase las manos con guantes, use mangas largas y use una máscara para que cubra el rostro o lentes. Podría ocurrir un accidente con el nitrógeno líquido o con la ampolla/ampolleta de la vacuna. Cuando se saque la ampolla/ampolleta del porta-ampolletas, mantenga las palmas de los guantes lejos del cuerpo y la cara.
3. Cuando se retire la cánula con las ampollas/ampolletas del contenedor de nitrógeno líquido, saque sólo la ampolla/ampolleta que va a usar inmediatamente. Se recomienda manipular una ampolla/ampolleta a la vez. Después de sacar la ampolla/ampolleta, el porta-ampolletas que contiene el resto de las ampollas/ampolletas debe colocarse inmediatamente en el nitrógeno líquido.
4. El contenido de las ampollas/ampolletas se descongela introduciéndola en agua a temperatura ambiente ($15-27^{\circ}\text{C}$). No descongelar en agua caliente o fría. Seque la ampolla/ampolleta y agítela para que se disperse el contenido. Luego rompa la ampolla/ampolleta e inmediatamente proceda de la siguiente manera:

PRECAUCIÓN: Las ampollas/ampolletas pueden explotar por los cambios repentinos de temperatura. **NO DESCONGELE EN AGUA CALIENTE O FRÍA.**

5. Extraiga el contenido de la ampolla/ampolleta en una jeringa estéril de 5 a 10 mL, con una aguja de 1 mm (calibre 18).
6. Inserte la aguja en la bolsa del diluyente y diluya inmediatamente llenando la jeringa con una porción de diluyente.

IMPORTANTE: El diluyente debe estar a temperatura ambiente (por debajo de 30°C) al momento de la mezcla.

7. El contenido de la jeringa llena es incorporado al resto de la bolsa de diluyente. Es importante que esto sea hecho lentamente para permitir a la vacuna llegar hasta el fondo de la bolsa. Agite muy bien la bolsa hasta que la vacuna este mezclada. Retirar una porción del diluyente con la jeringa para lavar la ampolla/ampolleta. Inyectar este contenido en la bolsa del diluyente. Sacar la jeringa.
8. Llenar previamente la jeringa automática estéril de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y establecer la dosis de 0,2 mL.
9. La vacuna está ahora lista para su uso.

METODO DE EMPLEO

Aplicación subcutánea:

1. Diluya la vacuna según las instrucciones teniendo en cuenta las precauciones de manipulación.
2. Llenar la jeringa automática estéril de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y establecer la dosis de 0,2 mL.
3. Sostenga el ave por la nuca y con el dedo pulgar y el índice suavemente estire la piel. Inserte la aguja por debajo de la piel en dirección opuesta a la cabeza del pollo. Inyecte 0,2 mL por ave.
4. El frasco de la vacuna debe ser mantenido en un baño frío y agitado frecuentemente.
5. Pueden ser utilizados sistemas automáticos de vacunación.
6. Evite que la aguja entre en contacto con los músculos o los huesos del cuello.
7. El contenido total de la vacuna reconstituida debe ser utilizada antes de 2 horas después de su dilución.

Aplicación Intramuscular:

1. Diluya la vacuna según las instrucciones teniendo en cuenta las precauciones de manipulación.
2. Asegure el ave firmemente de modo que deje el muslo libre para la inoculación. Introduzca la aguja ligeramente inclinada con el fin de lograr la aplicación intramuscular profunda sin afectar el hueso. Inyecte 0,2 mL por ave. Puede aplicarse en el musculo de la pechuga siguiendo los mismos procedimientos.

3. El frasco de la vacuna debe ser mantenido en un baño frío y agitado frecuentemente
4. Pueden ser utilizados sistemas automáticos de vacunación.
5. Evite que la aguja entre en contacto con los huesos de la pierna o del pecho.
6. El contenido total de la vacuna reconstituida debe ser utilizada antes de 2 horas después de su dilución.

Aplicación In-ovo:

1. Diluya la vacuna según las instrucciones teniendo en cuenta las precauciones de manipulación.
2. La dilución debe seguir las recomendaciones del fabricante de la maquina vacunadora con el fin de aplicar 0,05 ml por huevo embrionado.
3. Seguir las indicaciones del fabricante de la maquina incluyendo el procedimiento de limpieza, sanitización y desinfección post-vacunación.

CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida, cuando es utilizado de acuerdo a las instrucciones.

EFFECTOS ADVERSOS O REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Todas las aves deben ser vacunas al mismo tiempo.
- Mantener las ampollas/ampolletas congeladas en todo momento antes de su uso.
- Verificar diariamente el nivel de nitrógeno líquido del contenedor.
- El manejo y almacenamiento inadecuado de la vacuna puede provocar perdida de la potencia.
- No remover la vacuna del nitrógeno líquido sino hasta que esté listo para utilizarla.
- No utilizar si la vacuna se ha descongelado en el interior del contenedor de nitrógeno líquido.
- Nunca volver a congelar una ampolla/ampolleta que haya sido previamente descongelada.
- Se recomiendan buenas prácticas para reducir la exposición al virus de Marek durante al menos tres semanas posteriores a la vacunación.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Chile: No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

PERIODO DE RESGUARDO/RETIRO

Cero (0) días.

PRECAUCIONES PARA LA DISPOSICIÓN

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Argentina: Los envases deben ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.

Colombia: La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIÓN

Ampollas/ampolletas de vidrio criogénico con 1000 o 2000 dosis.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consulte al Médico Veterinario

Fabricado por:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, (P.O. Box 31) 5830 AA Boxmeer, Países Bajos

Importado y distribuido por:

Chile: Intervet Chile Limitada.

Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

Reg. SAG N° 2709-B

Venta bajo receta Médico Veterinario

Ecuador: Intervet Ecuador, S.A.,

Av. Naciones Unidas E10-44 y República Del Salvador,

Edificio City Plaza, Piso 6, Quito – Ecuador.

Ecuador: **Reg. No. 4A-3010-AGROCALIDAD**

Colombia: MSD Salud Animal S.A.S.

Reg. ICA.: 3995 DB

Venta bajo fórmula del médico veterinario

Argentina: Intervet Argentina S.A.

SENASA Cert. N° 86.174

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director técnico: Eduardo Vicente Lopez, Med. Vet. MPBA 4505.

VENTA BAJO RECETA

México: Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Perú: Merck Sharp & Dohme Salud Animal Perú S.A.

Cal. Andrés Reyes 338, San Isidro, Lima 15046

RUC 20372399687

Reg. SENASA B.01.8.01.I.1075

Venta bajo receta

Costa Rica: Reg. No.: MV-5962

Honduras: Reg. No.: MV-2-945

Guatemala: Reg. No.: NL94-65-66-14871

Nicaragua: Reg. No.: MV-11223

Panamá: Reg. No.: MV-010719

Rep. Dominicana: Reg. No.: 4918

El Salvador: Reg. No.: 203

Venta bajo receta médica

**APROBADO
SAG**

29-08-2025

APROBADO
SAG

29-08-2025

NOBILIS DILUENT CA

Diluyente para vacunas Marek asociadas a células
200 ml

Composición: Sucrosa, Digerido pancreático de caseína,
Fosfato de potasio monobásico, Fenolsulfoftaleína,
Agua para inyección

Uso: ver instrucciones de la vacuna.

Almacenamiento: por debajo de 30°C

USO VETERINARIO



SENASA CERT. N°: 01-084

Importado y comercializado por: Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs.
As.

Argentina: Los envases utilizados deben ser
descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Importado y distribuido por: Intervet Chile Ltda. Mariano
Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago -
Chile. Reg. SAG N°2709-B

Mantener fuera del alcance de los niños y animales
domésticos.

Fabricado por: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN

Boxmeer, Holanda



MSD

Animal Health

Lote:

Elab:

Venc:

Imprint
Area

PSB020829_02_R2

40 x 72 mm

K

APROBADO
SAG

29-08-2025

NOBILIS DILUENT CA

Diluyente para vacunas Marek asociadas a células
400 ml

Composición: Sucrosa, Digerido pancreático de
caseína,

Fosfato de potasio monobásico, Fenolsulfoftaleína,
Agua para inyección

Uso: ver instrucciones de la vacuna.

Almacenamiento: por debajo de 30°C

USO VETERINARIO



SENASA CERT. N°: 01- 084

Importado y comercializado por: Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs.
As.

Argentina: Los envases utilizados deben ser
descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Importado y distribuido por: Intervet Chile Ltda. Mariano
Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago -
Chile. Reg. SAG N°2709-B

Mantener fuera del alcance de los niños y animales
domésticos.

Fabricado por: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN

Boxmeer, Holanda



MSD

Animal Health

Lote:

Elab:

Venc:

Imprint
Area

PSB020829_02_R2

40 x 72 mm

K

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

a) Nombre de fantasía

Nobilis® Rismavac

b) Nombre genérico

Vacuna viva contra la Enfermedad de Marek, Rispens, Serotipo 1, congelada.

c) Forma farmacéutica

Suspensión inyectable



2. COMPOSICIÓN

Cada dosis de contiene:

Virus Herpes Gallina (HCV), Cepa VCI988 (Rispens) $\geq 3,0 \log_{10} \text{TCID}_{50}$

Excipientes c.s.p. 0,2 mL

- Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B, Neomicina y/o Polimixina B

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra cepas muy virulentas de la Enfermedad de Marek.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

a) Especie de destino

Pollos broilers, pollos/pollas de reemplazo de reproductores y pollas de reemplazo.

b) Indicaciones de uso

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de los signos asociados a la Enfermedad de Marek producida por cepas muy virulentas.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo

Posología:

1 dosis/pollo o 1 dosis/embrión.

Edad o peso:

Pollos de 1 día de edad o huevos embrionados de 18 días de incubación.

Condición fisiológica:

Aves sanas.

Vía de administración:

Vía subcutánea en el cuello o intramuscular en la pierna (aves de 1 día de edad).

Vía *in ovo* (embriones de 18 días de incubación).

Frecuencia:

Dosis única.

APROBADO
SAG
29-08-2025

Preparación de la vacuna:

Preparar solamente la vacuna que va a ser aplicada durante la próxima hora. ESTERILIZAR EL EQUIPO DE VACUNACIÓN HIRVIENDOLO EN AGUA POR 20 MINUTOS O MEDIANTE AUTOCLAVE (15 MINUTOS A 121°C). NO USAR DESINFECTANTES QUÍMICOS.

1. Use el contenido de una ampolla de vacuna de 1000 dosis por bolsa de diluyente estéril de 200 mL y 2000 dosis por bolsa de diluyente estéril de 400 mL. Para la vacunación *in ovo* utilice 50 mL de diluyente estéril por cada 1000 dosis de vacuna.
2. Antes de retirar la vacuna del contenedor de nitrógeno líquido, protéjase las manos con guantes, use mangas largas y use una máscara para que cubra el rostro o lentes. Podría ocurrir un accidente con el nitrógeno líquido o con la ampolla de la vacuna. Cuando se saque la ampolla del porta-ampolletas, mantenga las palmas de los guantes lejos del cuerpo y la cara.
3. Cuando se retire la cánula con las ampollas del contenedor de nitrógeno líquido, saque solo la ampolla que va a usar inmediatamente. Se recomienda manipular una ampolla a la vez. Después de sacar la ampolla, el porta-ampolletas que contiene el resto de las ampollas debe colocarse inmediatamente en el nitrógeno líquido.
4. El contenido de las ampollas se descongela introduciéndola en agua a temperatura ambiente (15-27°C). No descontelar en agua caliente o fría. Seque la ampolla y agítela para que se disperse el contenido. Luego rompa la ampolla e inmediatamente proceda de la siguiente manera:

PRECAUCION: Las ampollas pueden explotar por los cambios repentinos de temperatura. NO DESCONGELE EN AGUA CALIENTE O FRÍA.

5. Extraiga el contenido de la ampolla en una jeringa estéril de 5 a 10 mL, con una aguja de 1mm (calibre 18).
6. Inserte la aguja en la bolsa del diluyente y diluya inmediatamente llenando la jeringa con una porción del diluyente.

IMPORTANTE: El diluyente debe estar a temperatura ambiente (12-25°C) al momento de la mezcla.

7. El contenido de la jeringa llena es incorporado al resto de diluyente.
Es importante que esto sea hecho lentamente para permitir a la vacuna llegar hasta el fondo de la bolsa. Agite muy bien la bolsa hasta que la vacuna este mezclada. Retirar una porción del diluyente con la jeringa para lavar la ampolla. Inyectar este contenido en la bolsa del diluyente. Sacar la jeringa.
8. Llenar previamente la jeringa automática estéril de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y establecer la dosis de 0,2 mL.
9. La vacuna está ahora lista para su uso.

APROBADO
SAG
29-08-2025

Modo de empleo:

Aplicación subcutánea:

1. Diluya la vacuna según las instrucciones teniendo en cuenta las precauciones de manipulación.
2. Llenar la jeringa automática estéril de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y establecer la dosis de 0,2 mL.
3. Sostenga el ave por la nuca y con el dedo pulgar y el índice suavemente esture la piel. Inserte la aguja por debajo de la piel en dirección opuesta a la cabeza del pollo. Inyecta 0,2 mL por ave.
4. La bolsa de la vacuna debe ser mantenido en un baño frio y agitado frecuentemente.
5. Pueden ser utilizados sistemas automáticos de vacunación.
6. Evite que la aguja entre en contacto con los músculos o los huesos del cuello.
7. El contenido total de la vacuna reconstituida debe ser utilizada antes de 2 horas después de su dilución.

Aplicación intramuscular:

1. Diluya la vacuna según las instrucciones teniendo en cuenta las precauciones de manipulación.
2. Asegure el ave firmemente de modo que deje el muslo libre para la inoculación. Introduzca la aguja ligeramente inclinada con el fin de lograr la aplicación intramuscular profunda sin afectar el hueso. Inyecte 0,2 mL por ave. Puede aplicarse en el musculo de la pechuga siguiendo los mismos procedimientos.
3. La bolsa de la vacuna debe ser mantenido en un baño frio y agitado frecuentemente.
4. Pueden ser utilizados sistemas automáticos de vacunación.
5. Evite que la aguja entre en contacto con los huesos de la pierna o del pecho.
6. El contenido total de la vacuna reconstituida debe ser utilizada antes de 2 horas después de su dilución.

Aplicación in ovo:

1. Diluya la vacuna según las instrucciones teniendo en cuenta las precauciones de manipulación.
2. La dilución debe seguir las recomendaciones del fabricante de la maquina vacunadora con el fin de aplicar 0,05 mL huevo embrionado.
3. Seguir las indicaciones del fabricante de la maquina incluyendo el procedimiento de limpieza, sanitización y desinfección post-vacunación.

d) Contraindicaciones

Ninguna conocida.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico

No se han descrito.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso

- Todas las aves deben ser vacunas al mismo tiempo.
- Mantener las ampollas congeladas en todo momento antes de su uso.
- Verificar diariamente el nivel de nitrógeno líquido del contenedor.
- El manejo y almacenamiento inadecuado de la vacuna puede provocar perdida de la potencia.
- No remover la vacuna del nitrógeno líquido sino hasta que esté listo para utilizarla.
- No utilizar si la vacuna se ha descongelado en el interior del contenedor de nitrógeno líquido.
- Nunca volver a congelar una ampolla que haya sido previamente descongelada.
- Se recomiendan buenas prácticas para reducir la exposición al virus de Marek durante al menos tres semanas posteriores a la vacunación.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

g) Uso durante postura y en animales reproductores

No utilizar en gallinas en postura.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

APROBADO
SAG

29-08-2025

i) Sobredosis

La administración de 10 veces la dosis recomendada ha demostrada ser segura, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) Período de resguardo

Cero (0) días.

k) Precauciones especiales para el operador

El contenedor de nitrógeno líquido y la vacuna deberán ser manipulados solamente por personal apropiadamente entrenado, con elementos de seguridad apropiados considerando las precauciones de seguridad para la manipulación de nitrógeno líquido y los materiales que se encuentran a muy baja temperatura. Debe tenerse extremo cuidado para evitar la contaminación de las manos, ojos y vestimenta con la vacuna.

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS**a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, excepto con el diluyente que forma parte de este producto.

b) Período de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda.

Ampolla: 36 meses.

Diluyente: 36 meses.

Una vez reconstruido según las indicaciones: 2 horas a 2°- 8°C.

c) Condiciones de almacenamiento

Ampolla: Mantener congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

Diluyente: Mantener a temperatura ambiente, por debajo a 30°C.

La vacuna reconstituida no debe ser expuesta a luz solar directa o calor.

Contenedor: Mantener en posición vertical, bien nivelado, en una zona limpia, ventilada y alejada de fuentes de calor.

d) Descripción de los envases

Ampolla de vidrio hidrolítico tipo I, impresa, sellada al calor, conteniendo 1.000 o 2.000 dosis. Bolsa de plástico multicapa, etiquetada conteniendo 200, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 o 1600 mL de diluyente. Incluye prospecto interno.

APROBADO
SAG

29-08-2025

V1

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.


6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA FABRICANTE Y DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA EMPRESA LICENCIANTE

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda



Importado y distribuido por:

Intervet Veterinaria Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Reg. SAG N° 2709-B