



Etiqueta estuche conteniendo 20 frascos de 500 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes.

20 x 500 dosis

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.,
1107 Budapest, Szállás u. 5., Hungría.

Importado y Distribuido por:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL
Av. L. N. Alem 822, 4° piso (C1001AAQ)
Buenos Aires.

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto.:

**APROBADO
SAG
20-05-2025**

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Atención al Cliente 0800-333-7888

info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

SENASA Certificado N° 13-156

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA

Araucana 1277, Montevideo.

Resp. Técnico: Dra Marcela Eugster

Matrícula N° 4950 - Reg MGA.P xxxxxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA,

Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Reg. SAG N°xxxx

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Hungría

Prohibida la venta fraccionada

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivo atenuado de Bronquitis Infecciosa, cepa 1/96 $\geq 2,8 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Uso por aspersión o en agua de bebida

ADVERTENCIAS

Utilizar el contenido de este envase inmediatamente después de reconstituido.

No acepte el producto si el precinto está roto.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

PERIODO DE RESGUARDO:

Cero días.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° C y 8° C. Protegido de la luz.

Venta bajo receta médico-veterinaria

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile

www.ceva.com



Etiqueta Frasco conteniendo 500 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes.

500 dosis

Administración: Uso por aspersión o en agua de bebida.

Almacenamiento: 2° C a 8° C.

Advertencias: Utilizar el contenido de una sola vez.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

Venta bajo receta médico-veterinaria

USO VETERINARIO

Importador y Distribuidor:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N.

Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Certificado N°: 13-156

En Bolivia: Agroserve S.R.L., Santa Cruz.

Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA. Reg. MGAP xxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA. **Reg. SAG N°xxxx**

**APROBADO
SAG
20-05-2025**

A2375 - Ceva-Phylaxia, Hungría

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto:

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**



Etiqueta estuche conteniendo 20 frascos de 1000 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

20x1000 dosis

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.,
1107 Budapest, Szállás u. 5., Hungría.

Importado y Distribuido por:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL
Av. L. N. Alem 822, 4º piso (C1001AAQ)
Buenos Aires.

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto.:

**APROBADO
SAG
20-05-2025**

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Atención al Cliente 0800-333-7888

info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

SENASA Certificado N° 13-156

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA

Araucana 1277, Montevideo.

Resp. Técnico: Dra Marcela Eugster

Matrícula N° 4950 - Reg MGA.P xxxxxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA,

Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Reg. SAG N°xxxx

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Hungría

Prohibida la venta fraccionada

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivo atenuado de Bronquitis Infecciosa, cepa 1/96 $\geq 2,8 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Uso por aspersión o en agua de bebida

ADVERTENCIAS

Utilizar el contenido de este envase inmediatamente después de reconstituido.

No acepte el producto si el precinto está roto.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

PERIODO DE RESGUARDO:

Cero días.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° C y 8° C. Protegido de la luz.

Venta bajo receta médico-veterinaria

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile

www.ceva.com



Etiqueta Frasco conteniendo 1000 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

1000 dosis

Administración: Uso por aspersión o en agua de bebida

Almacenamiento: 2° C a 8° C.

Advertencias: Utilizar el contenido de una sola vez.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

Venta bajo receta médico-veterinaria

USO VETERINARIO

Importador y Distribuidor:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N.

Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Certificado N°: 13-156

En Bolivia: Agroserve S.R.L., Santa Cruz.

Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA. Reg. MGAP xxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA. **Reg. SAG N°xxxx**

**APROBADO
SAG
20-05-2025**

A2375 - Ceva-Phylaxia, Hungría

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto:

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**



Etiqueta estuche conteniendo 20 frascos de 2500 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

20 x 2500 dosis

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.,
1107 Budapest, Szállás u. 5., Hungría.

Importado y Distribuido por:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL
Av. L. N. Alem 822, 4º piso (C1001AAQ)
Buenos Aires.

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto.:

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Atención al Cliente 0800-333-7888

info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

SENASA Certificado N° 13-156

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

En Bolivia: Agroserve S.R.L., Santa Cruz. Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA

Araucana 1277, Montevideo.

Resp. Técnico: Dra Marcela Eugster

Matrícula N° 4950 - Reg MGA.P xxxxxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA,

Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Reg. SAG N°xxxx

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Hungría

Prohibida la venta fraccionada

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivo atenuado de Bronquitis Infecciosa, cepa 1/96 $\geq 2,8 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Uso por aspersión o en agua de bebida

ADVERTENCIAS

Utilizar el contenido de este envase inmediatamente después de reconstituido.

No acepte el producto si el precinto está roto.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

PERIODO DE RESGUARDO:

Cero días.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° C y 8° C. Protegido de la luz.

Venta bajo receta médico-veterinaria

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

**APROBADO
SAG**

20-05-2025

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile

www.ceva.com



Etiqueta Frasco conteniendo 2500 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

2500 dosis

Administración: Uso por aspersión o en agua de bebida

Almacenamiento: 2° C a 8° C.

Advertencias: Utilizar el contenido de una sola vez.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

Venta bajo receta médico-veterinaria

USO VETERINARIO

Importador y Distribuidor:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N.

Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Certificado N°: 13-156

En Bolivia: Agroserve S.R.L., Santa Cruz.

Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA. Reg. MGAP xxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA. **Reg. SAG N°xxxx**

**APROBADO
SAG**

20-05-2025

A2375 - Ceva-Phylaxia, Hungría

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto:

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**



Etiqueta estuche conteniendo 20 frascos de 5000 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

20 x 5000 dosis

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.,
1107 Budapest, Szállás u. 5., Hungría.

Importado y Distribuido por:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL
Av. L. N. Alem 822, 4º piso (C1001AAQ)
Buenos Aires.

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto.:

**APROBADO
SAG
20-05-2025**

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Atención al Cliente 0800-333-7888

info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

SENASA Certificado N° 13-156

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA

Araucana 1277, Montevideo.

Resp. Técnico: Dra Marcela Eugster

Matrícula N° 4950 - Reg MGA.P xxxxxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA,

Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Reg. SAG N°xxxx

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Hungría

Prohibida la venta fraccionada

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivo atenuado de Bronquitis Infecciosa, cepa 1/96 $\geq 2,8 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Uso por aspersión o en agua de bebida

ADVERTENCIAS

Utilizar el contenido de este envase inmediatamente después de reconstituido.

No acepte el producto si el precinto está roto.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

PERIODO DE RESGUARDO:

Cero días.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° C y 8° C. Protegido de la luz.

Venta bajo receta médico-veterinaria

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile

www.ceva.com



Etiqueta Frasco conteniendo 5000 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

5000 dosis

Administración: Uso por aspersión o en agua de bebida

Almacenamiento: 2° C a 8° C.

Advertencias: Utilizar el contenido de una sola vez.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

Venta bajo receta médico-veterinaria

USO VETERINARIO

Importador y Distribuidor:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N.

Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Certificado N°: 13-156

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz.

Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA. Reg. MGAP xxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA. **Reg. SAG N°xxxx**

**APROBADO
SAG
20-05-2025**

A2375 - Ceva-Phylaxia, Hungría

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto:

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**



Etiqueta estuche conteniendo 20 frascos de 8000 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

20 x 8000 dosis

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.,
1107 Budapest, Szállás u. 5., Hungría.

Importado y Distribuido por:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL
Av. L. N. Alem 822, 4º piso (C1001AAQ)
Buenos Aires.

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto.:

**APROBADO
SAG**

20-05-2025

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Atención al Cliente 0800-333-7888

info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

SENASA Certificado N° 13-156

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA

Araucana 1277, Montevideo.

Resp. Técnico: Dra Marcela Eugster

Matrícula N° 4950 - Reg MGA.P xxxxxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA,

Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Reg. SAG N°xxxx

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Hungría

Prohibida la venta fraccionada

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivo atenuado de Bronquitis Infecciosa, cepa 1/96 $\geq 2,8 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Uso por aspersión o en agua de bebida

ADVERTENCIAS

Utilizar el contenido de este envase inmediatamente después de reconstituido.

No acepte el producto si el precinto está roto.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

PERIODO DE RESGUARDO:

Cero días.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° C y 8° C. Protegido de la luz.

Venta bajo receta médico-veterinaria

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile

www.ceva.com



Etiqueta Frasco conteniendo 8000 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

8000 dosis

Administración: Uso por aspersión o en agua de bebida

Almacenamiento: 2° C a 8° C.

Advertencias: Utilizar el contenido de una sola vez.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

Venta bajo receta médico-veterinaria

USO VETERINARIO

Importador y Distribuidor:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N.

Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Certificado N°: 13-156

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz.

Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA. Reg. MGAP xxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA. **Reg. SAG N°xxxx**

**APROBADO
SAG
20-05-2025**

A2375 - Ceva-Phylaxia, Hungría

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto:

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**



Etiqueta estuche conteniendo 20 frascos de 10000 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

20 x 10000 dosis

Producido por:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.,
1107 Budapest, Szállás u. 5., Hungría.

Importado y Distribuido por:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL
Av. L. N. Alem 822, 4º piso (C1001AAQ)
Buenos Aires.

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto.:

**APROBADO
SAG
20-05-2025**

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Atención al Cliente 0800-333-7888

info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

SENASA Certificado N° 13-156

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA

Araucana 1277, Montevideo.

Resp. Técnico: Dra Marcela Eugster

Matrícula N° 4950 - Reg MGA.P xxxxxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA,

Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Reg. SAG N°xxxx

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Hungría

Prohibida la venta fraccionada

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivo atenuado de Bronquitis Infecciosa, cepa 1/96 $\geq 2,8 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Uso por aspersión o en agua de bebida

ADVERTENCIAS

Utilizar el contenido de este envase inmediatamente después de reconstituido.

No acepte el producto si el precinto está roto.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

PERIODO DE RESGUARDO:

Cero días.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° C y 8° C. Protegido de la luz.

Venta bajo receta médico-veterinaria

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile

www.ceva.com



Etiqueta Frasco conteniendo 10000 dosis

Cevac Ibird®

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

10000 dosis

Administración: Uso por aspersión o en agua de bebida

Almacenamiento: 2° C a 8° C.

Advertencias: Utilizar el contenido de una sola vez.

Instrucciones en el prospecto adjunto.

Venta bajo receta médico-veterinaria

USO VETERINARIO

Importador y Distribuidor:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL - Av. L. N.

Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

Certificado N°: 13-156

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz.

Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

En Uruguay: Nasmek Corporation SA. Reg. MGAP xxx

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA. **Reg. SAG N°xxxx**

**APROBADO
SAG
20-05-2025**

A2375 - Ceva-Phylaxia, Hungría

Fecha de Elab.:

Lote N°:

Fecha de Vto:

**REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**



Prospecto

Cevac Ibird®

REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes

CEVAC IBird® contiene una cepa variante del virus de la Bronquitis Infecciosa en forma viva, liofilizada. Los huevos embrionados de gallina, utilizados en la producción de esta vacuna son obtenidos de parvadas libres de patógenos específicos (SPF).

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivo atenuado de Bronquitis Infecciosa, cepa 1/96

$\geq 2,8 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Excipientes c.s.p.

1 dosis

APROBADO
SAG
20-05-2025

ESPECIE DE DESTINO

Pollos *broilers* y pollas de reemplazo.

INDICACIONES DE USO

Inmunización activa, para reducir el efecto perjudicial de la infección sobre la actividad ciliar y la presencia de virus en tráquea que puede evidenciarse mediante síntomas clínicos respiratorios, producidas por la infección por cepas variantes del virus Bronquitis Infecciosa que pertenezcan al grupo 793/B.

Establecimiento de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: 6 semanas después de la vacunación en pollos *broilers* y 9 semanas después de la vacunación en pollas de reemplazo.

INTERACCIONES

Se dispone de datos de seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede mezclarse y administrarse en forma conjunta con Cevac Ceva® Mass L, Registro SAG N° 299-B, mediante aplicación por nebulización en pollitos a partir del 1 día de edad.

Tras la administración conjunta, la duración de la inmunidad en pollitos *broilers* ha sido de 9 semanas. Los productos mezclados protegen contra cepas que pertenecen a los grupos 793/B y Massachusetts del IBV. Los parámetros de seguridad de las vacunas mezcladas no son diferentes a los descritos para las vacunas administradas de manera separada. Lea la información del producto Cevac Ceva® Mass L antes de su uso.

Se debe tener cuidado para evitar la propagación de las cepas vacunales a otras especies de aves, en particular cuando se mezclan las vacunas.

El uso simultáneo de ambas vacunas puede aumentar el riesgo de recombinación de los virus y la potencial aparición de nuevas variantes. Sin embargo, la probabilidad del riesgo de que esto ocurra se ha estimado muy baja.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso combinado con otros productos farmacéuticos.

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

1 dosis/aves

Pollos *broilers*: dosis única.

Pollas de reemplazo: para mantener la inmunidad, debe revacunarse cada 3 semanas.



REGISTRO SAG N° 2710-B SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

La vacunación debe llevarse a cabo mediante la administración por aspersión: a partir de 1 día de edad para pollos de engorda y pollitas ponedoras y mediante agua de bebida, desde los 10 días de edad para las pollitas ponedoras.

Administración por aspersión:

- La vacuna debe disolverse preferentemente en agua destilada o, alternativamente, en agua limpia, fría y sin cloro.
- Debe abrirse el número adecuado de viales bajo el agua.
- El volumen de agua para la reconstitución debe ser suficiente para asegurar una distribución homogénea cuando se nebuliza a los pollos.
- El volumen variará de acuerdo con la edad de los pollos que vayan a ser vacunados y el sistema de administración, pero se sugiere al menos 200 mL de agua por 1000 dosis.
- La suspensión de vacuna debe extenderse uniformemente sobre el número correcto de pollos, a una distancia de 30-40 cm utilizando tamaños de gota entre 100-200 µm (spray de gota gruesa). La pulverización se llevará a cabo preferentemente cuando los pollos están agrupados en la oscuridad.
- El pulverizador debe estar libre de sedimentos, corrosión y trazas de desinfectantes.
- Para la distribución eficaz de la vacuna, asegúrese que los pollos están agrupados todos juntos durante la pulverización.
- Dependiendo de las condiciones del alojamiento, durante y después de la vacunación deberá apagarse la ventilación para evitar turbulencias.

Administración mediante agua de bebida

- La vacuna debe disolverse en el agua de bebida.
- La cantidad de agua debe calcularse en base al consumo medio de agua del lote de animales en los 4 días previos a la vacunación.
- Calcular la cantidad de agua necesaria para que la vacuna se consuma en 2 horas. Esta cantidad debe corresponder aproximadamente al 30% del consumo diario.
- 48 horas antes del inicio de la vacunación, medicamentos, desinfectantes y cloro deben haberse retirado del agua de bebida.
- Debe retirarse el agua antes de la vacunación para que las aves tengan sed. El período de tiempo de privación de agua depende mucho de las condiciones climatológicas. La supresión del agua debe mantenerse el menor tiempo posible, con un mínimo de 30 minutos.
- Los viales deben abrirse bajo el agua.
- Utilizar agua limpia y fría para disolver la vacuna.
- Para la administración de la vacuna, como norma general, se disuelven 1.000 dosis en un litro por edad en días hasta un volumen máximo de 20 litros por 1.000 dosis, o cuando hace calor, la cantidad de agua puede aumentarse hasta 40 litros por 1.000 dosis.

APROBADO
SAG
20-05-2025

EFFECTOS Y REACCIONES ADVERSOS

Frecuentes (1 – 10 animales/100 animales vacunados)	Estertores traqueales*
--	------------------------

(*) Tras la vacunación se han observado ligeros estertores traqueales que pueden persistir durante al menos 10 días.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Todos los pollos de un mismo sitio deben ser vacunados a la vez y en las mismas instalaciones.



La cepa vacunal puede propagarse a pollos no vacunados. Los pollos vacunados pueden eliminar la cepa vacunal hasta 28 días o más después de la vacunación. Durante este tiempo se debe evitar el contacto de pollos inmunodeprimidos y no vacunados con pollos vacunados.

La vacuna no debe utilizarse sin que se haya hecho un diagnóstico de que la infección está causada por una cepa del grupo 793/B y después de que se haya establecido que el virus IBV del grupo 793/B es epidemiológicamente relevante en el área. Deben tomarse precauciones para evitar la introducción de la cepa variante en un área en la que no esté presente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO DURANTE PREÑEZ, LACTANCIA, POSTURA Y EN ANIMALES REPRODUCTORES.

El uso de la vacuna ha demostrado ser seguro durante la postura. Sin embargo, no se han llevado a cabo estudios que muestren la protección durante la postura.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Si la vacuna es administrada por aspersión, equipos de protección personal tales como guantes, anteojos de seguridad y máscara deberían ser usados durante el manejo del producto.

Lavar y desinfectar las manos luego del uso.

No ingerir alimentos o fumar durante la manipulación de la vacuna.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C y 8°C, protegido de la luz.

PRESENTACIÓN

Viales conteniendo 500, 1000, 2500, 5000, 8000 y 10000 dosis.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO-VETERINARIA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Importador y distribuidor:

En Argentina: Ceva Salud Animal SRL

Av. L. N. Alem 822, 4° piso (C1001AAQ) - Buenos Aires.

Directora Técnica: Méd. Vet. Alicia Vilela M.N. 8389

atención al Cliente 0800-333-7888

info.argentina@ceva.com - www.ceva.com.ar

Certificado N°: 13-156

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. Reg. SENASAG CR-PUV-B N° 006726/15

Resp. Técnico: Dra. Marcela Eugster Matrícula N° 4950 - Reg MGAP xxxxxx .

En Uruguay: Nasmek Corporation SA. Araucana 1277, Montevideo.

Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.

Reg. SAG N°xxxx

Bajo licencia de Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Hungría

Producido por:

Ceva-Phylaxia - Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u. 5., Hungría.

REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
20-05-2025



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** CEVAC IBird®
b) **Nombre Genérico:** Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, cepas variantes.
c) **Forma farmacéutica:** Polvo liofilizado para reconstituir suspensión.

2. Composición

Cada dosis de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivo atenuado de Bronquitis Infecciosa, cepa 1/96 $\geq 2,8 \log_{10} \text{DIE}_{50}$
Excipientes c.s.p. 1 dosis

3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra cepas variantes del virus Bronquitis Infecciosa.

4. Particularidades clínicas:

REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

a) **Especies de destino y subcategoría:**

Pollos *broilers* y pollas de reemplazo.

APROBADO
SAG

20-05-2025

b) **Indicaciones de uso**

Inmunización activa, para reducir el efecto perjudicial de la infección sobre la actividad ciliar y la presencia de virus en tráquea que puede evidenciarse mediante síntomas clínicos respiratorios, producidas por la infección por cepas variantes del virus Bronquitis Infecciosa que pertenezcan al grupo 793/B.

Establecimiento de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: 6 semanas después de la vacunación en pollos *broilers* y 9 semanas después de la vacunación en pollas de reemplazo

c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.**

- **Dosis:**

1 dosis/ave

- **Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:**

Pollos *broilers*: dosis única.

Pollas de reemplazo: para mantener la inmunidad, debe revacunarse cada 3 semanas

- **Edad o peso:**

Pollos *broilers* y pollas de reemplazo: a partir del 1 día de edad (vía aspersión).

Pollas de reemplazo: a partir de los 10 días de edad (vía oral).

- **Condición fisiológica:**

Aves sanas.



- **Vía de administración:**

Aspersión o agua de bebida.

- **Modo de empleo:**

Administración por aspersión:

- La vacuna debe disolverse preferentemente en agua destilada o, alternativamente, en agua limpia, fría y sin cloro.
- Debe abrirse el número adecuado de viales bajo el agua.
- El volumen de agua para la reconstitución debe ser suficiente para asegurar una distribución homogénea cuando se nebuliza a los pollos.
- El volumen variará de acuerdo con la edad de los pollos que vayan a ser vacunados y el sistema de administración, pero se sugiere al menos 200 mL de agua por 1000 dosis.
- La suspensión de vacuna debe extenderse uniformemente sobre el número correcto de pollos, a una distancia de 30-40 cm utilizando tamaños de gota entre 100-200 μ m (spray de gota gruesa). La pulverización se llevará a cabo preferentemente cuando los pollos están agrupados en la oscuridad.
- El pulverizador debe estar libre de sedimentos, corrosión y trazas de desinfectantes.
- Para la distribución eficaz de la vacuna, asegúrese que los pollos están agrupados todos juntos durante la pulverización.
- Dependiendo de las condiciones del alojamiento, durante y después de la vacunación deberá apagarse la ventilación para evitar turbulencias.

Administración mediante agua de bebida

- La vacuna debe disolverse en el agua de bebida.
- La cantidad de agua debe calcularse en base al consumo medio de agua del lote de animales en los 4 días previos a la vacunación.
- Calcular la cantidad de agua necesaria para que la vacuna se consuma en 2 horas. Esta cantidad debe corresponder aproximadamente al 30% del consumo diario.
- 48 horas antes del inicio de la vacunación, medicamentos, desinfectantes y cloro deben haberse retirado del agua de bebida.
- Debe retirarse el agua antes de la vacunación para que las aves tengan sed. El período de tiempo de privación de agua depende mucho de las condiciones climatológicas. La supresión del agua debe mantenerse el menor tiempo posible, con un mínimo de 30 minutos.
- Los viales deben abrirse bajo el agua.
- Utilizar agua limpia y fría para disolver la vacuna.
- Para la administración de la vacuna, como norma general, se disuelven 1.000 dosis en un litro por edad en días hasta un volumen



máximo de 20 litros por 1.000 dosis, o cuando hace calor, la cantidad de agua puede aumentarse hasta 40 litros por 1.000 dosis.

d) **Contraindicaciones**

No conocidas.

REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

e) **Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico.**

Frecuentes (1 – 10 animales/100 animales vacunados)	Estertores traqueales*
--	------------------------

(*) Tras la vacunación se han observado ligeros estertores traqueales que pueden persistir durante al menos 10 días.

APROBADO
SAG
20-05-2025

f) **Advertencias y precauciones especiales de uso.**

Todos los pollos de un mismo sitio deben ser vacunados a la vez y en las mismas instalaciones.

La cepa vacunal puede propagarse a pollos no vacunados. Los pollos vacunados pueden eliminar la cepa vacunal hasta 28 días o más después de la vacunación. Durante este tiempo se debe evitar el contacto de pollos inmunodeprimidos y no vacunados con pollos vacunados.

La vacuna no debe utilizarse sin que se haya hecho un diagnóstico de que la infección está causada por una cepa del grupo 793/B y después de que se haya establecido que el virus IBV del grupo 793/B es epidemiológicamente relevante en el área. Deben tomarse precauciones para evitar la introducción de la cepa variante en un área en la que no esté presente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

g) **Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores.**

El uso de la vacuna ha demostrado ser seguro durante la postura. Sin embargo, no se han llevado a cabo estudios que muestren la protección durante la postura.

a) **Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado.**

Se dispone de datos de seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede mezclarse y administrarse en forma conjunta con Cevac Ceva® Mass L, Registro SAG N° 299-B, mediante aplicación por nebulización en pollitos a partir del 1 día de edad.

Tras la administración conjunta, la duración de la inmunidad en pollitos *broilers* ha sido de 9 semanas.

Los productos mezclados protegen contra cepas que pertenecen a los grupos 793/B y Massachusetts del IBV. Los parámetros de seguridad de las vacunas mezcladas no son diferentes a los descritos para las vacunas administradas de manera separada. Lea la información del producto Cevac Ceva® Mass L antes de su uso.

Se debe tener cuidado para evitar la propagación de las cepas vacunales a



otras especies de aves, en particular cuando se mezclan las vacunas.

El uso simultáneo de ambas vacunas puede aumentar el riesgo de recombinación de los virus y la potencial aparición de nuevas variantes. Sin embargo, la probabilidad del riesgo de que esto ocurra se ha estimado muy baja.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso combinado con otros productos farmacéuticos

b) **Sobredosis.**

La aplicación de 10 veces la dosis ha demostrado ser segura, sin embargo, no se recomienda sobredosificar.

c) **Periodo de resguardo**

Cero (0) días.

APROBADO
SAG
20-05-2025

d) **Precauciones especiales para el operador.**

Si la vacuna es administrada por aspersión, equipos de protección personal tales como guantes, anteojos de seguridad y máscara deberían ser usados durante el manejo del producto.

Lavar y desinfectar las manos luego del uso.

No ingerir alimentos o fumar durante la manipulación de la vacuna.

5. **Particularidades farmacéuticas**

REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

a) **Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con la vacuna Cevac Ceva® Mass L, Registro SAG N° 299-B

b) **Período de eficacia(estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis según corresponda.**

18 meses

Una vez reconstituida, usar dentro de las 2 horas siguientes

c) **Condiciones de almacenamiento.**

Mantener refrigerado: entre 2 y 8°C. No congelar.

d) **Descripción de los envases.**

Caja de cartón impreso, con 20 frascos de vidrio tipo I, etiquetados, cerrados con tapón de goma de bromobutilo y precinto de aluminio-plástico conteniendo 500, 1.000, 2.500, 5.000, 8.000 o 10.000 dosis. Incluye inserto.

e) **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere.**

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.



6. Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

7. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento, importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda

Fabricado por:

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.
1107 Budapest, Szállás u.5, Hungría

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Hungría

APROBADO
SAG
20-05-2025

Registro SAG N° XXXX
USO VETERINARIO

REGISTRO SAG N° 2710-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO