

Nobilis®

IB Multi + ND + EDS



Vacuna inactivada contra Bronquitis Infecciosa Aviar, Enfermedad de Newcastle y Síndrome Caída de la Postura.

Emulsión inyectable

USO VETERINARIO
Reg. SAG N° 2717-B

Gallinas reproductoras y ponedoras.

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz. Utilizar inmediatamente una vez abierto el frasco y descartar el producto sobrante.

Leer inserto antes de usar.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

Contenido: 12 x 500 dosis

Fabricado por: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda

Importado y distribuido por: Intervet Veterinaria Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes,
Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.



MSD
Animal Health

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Composición

Cada dosis contiene: Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo Massachusetts, cepa M41 $\geq 5,5 \log_2$ unidades VN; Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo D207/ D274, cepa 249g $\geq 4,0 \log_2$ unidades VN*; Virus Enfermedad de Newcastle, cepa Clone 30 ≥ 50 PD50 unidades* o $\geq 4,0 \log_2$ unidades HI* por 1/ 50 dosis Adenovirus Aviar, cepa BC14 $\geq 6,5 \log_2$ unidades HI* Excipientes c.s.p. 0,5 mL. Adyuvantes: Parafina líquida.

* Respuesta serológica en pollos

Vía de administración

Vía intramuscular, en músculo de muslo o pechuga.

Modo de empleo

Antes de utilizar la vacuna permitir que alcance la temperatura ambiente (15-25°C). Agitar el frasco vigorosamente antes de usar y periódicamente durante el uso. Asegurar que el equipo de vacunación este limpio y estéril antes de su uso. No utilizar equipo de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de gomas.

Advertencias y precauciones especiales de uso

En el evento donde vacunas vivas fueran utilizadas como primovacuna en aves contra las enfermedades Bronquitis Infecciosa y de Newcastle, la vacuna debe ser administrada al menos 4 semanas después de la administración de vacunas vivas.

APROBADO
SAG

17-07-2025

Vente:

F.Fab:

Serie:

Imprint
Area

Nobilis®

IB Multi + ND + EDS



Vacuna inactivada contra Bronquitis Infecciosa Aviar, Enfermedad de Newcastle y Síndrome Caída de la Postura.

Emulsión inyectable

USO VETERINARIO
Reg. SAG N° 2717-B

Gallinas reproductoras y ponedoras.

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz. Utilizar inmediatamente una vez abierto el frasco y descartar el producto sobrante.

Leer inserto antes de usar.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

Contenido: 12 x 1000 dosis

Fabricado por: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda

Importado y distribuido por: Intervet Veterinaria Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes,
Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.



MSD
Animal Health

PROHIBIDA LA VENTA FRACCIONADA

Composición

Cada dosis contiene: Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo Massachusetts, cepa M41 $\geq 5,5 \log_2$ unidades VN; Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo D207/ D274, cepa 249g $\geq 4,0 \log_2$ unidades VN*; Virus Enfermedad de Newcastle, cepa Clone 30 ≥ 50 PD50 unidades* o $\geq 4,0 \log_2$ unidades HI* por 1/ 50 dosis Adenovirus Aviar, cepa BC14 $\geq 6,5 \log_2$ unidades HI* Excipientes c.s.p. 0,5 mL. Adyuvantes: Parafina líquida.

* Respuesta serológica en pollos

Vía de administración

Vía intramuscular, en músculo de muslo o pechuga.

Modo de empleo

Antes de utilizar la vacuna permitir que alcance la temperatura ambiente (15-25°C). Agitar el frasco vigorosamente antes de usar y periódicamente durante el uso. Asegurar que el equipo de vacunación este limpio y estéril antes de su uso. No utilizar equipo de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de gomas.

Advertencias y precauciones especiales de uso

En el evento donde vacunas vivas fueran utilizadas como primovacuna en aves contra las enfermedades Bronquitis Infecciosa y de Newcastle, la vacuna debe ser administrada al menos 4 semanas después de la administración de vacunas vivas.

APROBADO
SAG

17-07-2025

Vente:

F.Fab:

Serie:

Imprint
Area

ESTUCHE**250 mL (500 dosis) o 500 mL (1000 dosis)****Nobilis® IB Multi + ND + EDS**

Vacuna inactivada contra Bronquitis Infecciosa Aviar, Enfermedad de Newcastle y Síndrome Caída de la Postura.

Emulsión inyectable

250 mL (500 dosis) o 500 mL (1000 dosis)

**USO VETERINARIO****Reg. SAG N°2717-B**

Gallinas reproductoras y ponedoras.

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz. Utilizar inmediatamente una vez abierto el frasco y descartar el producto sobrante.

Leer inserto antes de usar.**Mantener fuera del alcance de los niños.****Venta Bajo Receta Médico Veterinaria****Composición**Cada dosis de contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo Massachusetts, cepa M41		≥ 5,5 log ₂ unidades VN*
Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo D207/D274, cepa 249g		≥ 4,0 log ₂ unidades VN*
Virus Enfermedad de Newcastle, cepa Clone 30		≥ 50 PD ₅₀ unidades* o ≥ 4,0 log ₂ unidades HI* por 1/50 dosis
Adenovirus Aviar, cepa BC14		≥ 6,5 log ₂ unidades HI*
Excipientes c.s.p.		0,5 mL
- Adyuvante: Parafina líquida		

* Respuesta serológica en pollos

Especie de destino

Gallinas reproductoras y ponedoras.

Posología: 0,5 mL.

Edad o peso: 14 a 20 semanas de edad, pero no más tarde que 4 semanas antes de la fecha esperada de inicio de postura.

Condición fisiológica: Aves sanas.

Vía de administración: Vía intramuscular, en músculo de muslo o pechuga.

Modo de empleo:

Antes de utilizar la vacuna permitir que alcance la temperatura ambiente (15-25°C). Agitar el frasco vigorosamente antes de usar y periódicamente durante el uso. Asegurar que el equipo de vacunación este limpio y estéril antes de su uso. No utilizar equipo de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de gomas.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

En el evento donde vacunas vivas fueran utilizadas como primovacunación en aves contra las enfermedades Bronquitis Infecciosa y de Newcastle, la vacuna debe ser administrada al menos 4 semanas después de la administración de vacunas vivas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holanda

Importado y distribuido por: Intervet Veterinaria Chile Limitada., Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

Serie:
F.Fab:
Vence:



Vacuna inactivada contra Bronquitis Infecciosa Aviar, Enfermedad de Newcastle y Síndrome Caída de la Postura.

Nobilis® IB Multi + ND + EDS™



250 mL (500 dosis)
Emulsión inyectable

USO VETERINARIO
Reg. SAG N° 2717-B

Importado y distribuido por:
Intervet Veterinario Chile Limitada.,
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5,
Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International
B.V. Holanda.

Fabricado por:
Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda



Gallinas reproductoras y ponedoras.

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar.
Proteger de la luz. Utilizar inmediatamente una vez
abierto el frasco y descartar el producto sobrante.

Leer inserto antes de usar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

**APROBADO
SAG**

17-07-2025

Vence:

F.Fab:

Serie:

Imprint
Area

PSB020S05_01_R1
148x48 mm
C Y K

Vacuna inactivada contra Bronquitis Infecciosa Aviar, Enfermedad de Newcastle y Síndrome Caída de la Postura.

Nobilis® IB Multi + ND + EDS™



500 mL (1000 dosis)

Emulsión inyectable

USO VETERINARIO

Reg. SAG N° 2717-B

Importado y distribuido por:
Intervet Veterinario Chile Limitada.,
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5,
Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Intervet International
B.V. Holanda.

Fabricado por:
Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35,
5831 AN Boxmeer, Holanda



Gallinas reproductoras y ponedoras.

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar.
Proteger de la luz. Utilizar inmediatamente una vez
abierto el frasco y descartar el producto sobrante.

Leer inserto antes de usar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

**APROBADO
SAG**

17-07-2025

Vence:

F.Fab:


Serie:

Imprint
Area

Nobilis® IB Multi + ND + EDS



VACUNA INACTIVADA CONTRA BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR, ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y SÍNDROME CAÍDA DE LA POSTURA.
EMULSIÓN INYECTABLE



USO VETERINARIO

Composición

Cada dosis contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo Massachusetts, cepa M41		$\geq 5,5 \log_2$ unidades VN*
Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo D207/D274, cepa 249g		$\geq 4,0 \log_2$ unidades VN*
Virus Enfermedad de Newcastle, cepa Clone 30		$\geq 50 \text{ PD}_{50}$ unidades* o $\geq 4,0 \log_2$ unidades HI* por 1/50 dosis
Adenovirus Aviar, cepa BC14		$\geq 6,5 \log_2$ unidades HI*
Excipientes c.s.p.		0,5 mL
- Adyuvante: Parafina líquida		

* Respuesta serológica en pollos

Especie de destino

Gallinas reproductoras y ponedoras.



Indicaciones de uso

- Reducción de infección y prevención de la caída de producción de huevo causada por el serotipo Massachusetts del Virus Bronquitis Infecciosa.
- Reducción de la caída de producción de huevo y defectos de la cáscara del huevo causada por serotipo D274/D207 del Virus Bronquitis Infecciosa.
- Prevención de la mortalidad y signos clínicos y reducción de la infección causada por el Virus de Enfermedad de Newcastle.
- Reducción de la caída de producción de huevos y defectos de la cáscara del huevo causados por el virus del Síndrome de Caída de Postura 76´.

Inicio de la inmunidad: 4 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: 1 periodo de postura.

Posología

0,5 mL.

Edad o peso

14 a 20 semanas de edad, pero no más tarde que 4 semanas antes de la fecha esperada de inicio de postura.

Condición fisiológica

Aves sanas.

Vía de administración

Vía intramuscular, en músculo de muslo o pechuga.

Modo de empleo

Antes de utilizar la vacuna permitir que alcance la temperatura ambiente (15-25°C).

Agitar el frasco vigorosamente antes de usar y periódicamente durante el uso.

Asegurar que el equipo de vacunación este limpio y estéril antes de su uso.

No utilizar equipo de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de gomas.

Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Efectos adversos o reacciones adversas

Muy frecuentes (> animal por cada 10 animales tratados)	Inflamación del punto de inyección ¹
--	---

¹ Una inflamación difusa transitoria que persiste durante aproximadamente 14 días.

Advertencias y precauciones especiales de uso

En el evento donde vacunas vivas fueran utilizadas como primovacunación en aves contra las enfermedades Bronquitis Infecciosa y de Newcastle, la vacuna debe ser administrada al menos 4 semanas después de la administración de vacunas vivas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Uso durante postura y en animales reproductores

No utilizar en gallinas en postura y dentro de 4 semanas antes del inicio del periodo de postura.

Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Sobredosis

No se han observado otras reacciones distintas a las mencionadas en ítem "Efectos o Reacciones Adversas", después de la administración de una dosis doble de vacuna.

Período de resguardo

Cero (0) días.

Precauciones especiales para el operador

Para el operador:

Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. La inyección accidental/auto-inyección puede resultar en dolor severo e hinchazón, particularmente si es inyectado en una articulación o dedo, y en casos raros puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no se entrega atención médica inmediata. Si ya se inyectó accidentalmente con este medicamento veterinario, buscar ayuda médica inmediata incluso si solo una pequeña cantidad es inyectada y lleve el inserto con usted. Si el dolor persiste por más de 12 horas después del examen médico, buscar ayuda médica nuevamente.

Para el médico:

Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Si una pequeña cantidad ha sido inyectada, inyecciones accidentales con este medicamento pueden causar hinchazón intensa, lo que puede, por ejemplo, resultar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Se requiere de atención quirúrgica experta e INMEDIATA y puede ser necesario un incisión temprana e irrigación en el área inyectada, especialmente cuando está involucrada la pulpa del dedo o tendón.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz. Utilizar inmediatamente una vez abierto el frasco y descartar el producto sobrante.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

No arrojar los envases vacíos o envases con el producto junto con los desechos domésticos. No eliminar en el suelo o en cursos de agua.

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria
Mantener fuera del alcance de los niños



Fabricado por

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda

Importado y distribuido por

Intervet Veterinario Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

Reg. SAG N° 2717-B

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

a) Nombre de fantasía

Nobilis® IB Multi + ND + EDS

b) Nombre genérico

Vacuna inactivada contra virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Enfermedad de Newcastle y Síndrome Caída de la Postura.

c) Forma farmacéutica

Emulsión inyectable.



2. COMPOSICIÓN

Cada dosis de contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo Massachusetts, cepa M41	≥ 5,5 log ₂ unidades VN*
Virus Bronquitis Infecciosa Aviar, Serotipo D207/D274, cepa 249g	≥ 4,0 log ₂ unidades VN*
Virus Enfermedad de Newcastle, cepa Clone 30	≥ 50 PD ₅₀ unidades* o ≥ 4,0 log ₂ unidades HI* por 1/50 dosis
Adenovirus Aviar, cepa BC14	≥ 6,5 log ₂ unidades HI*
Excipientes c.s.p.	0,5 mL
- Adyuvantes: Parafina líquida.	

* Respuesta serológica en pollos

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra los virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar, Enfermedad de Newcastle y Síndrome Caída de la Postura.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

a) Especie de destino

Gallinas reproductoras y ponedoras.

b) Indicaciones de uso

- Reducción de infección y prevención de la caída de producción de huevo causada por el serotipo Massachusetts del Virus Bronquitis Infecciosa.
- Reducción de la caída de producción de huevo y defectos de la cáscara del huevo causada por serotipo D274/D207 del Virus Bronquitis Infecciosa.
- Prevención de la mortalidad y signos clínicos y reducción de la infección causada por el Virus de Enfermedad de Newcastle.
- Reducción de la caída de producción de huevos y defectos de la cáscara del huevo causados por el virus del Síndrome de Caída de Postura 76´.

Inicio de la inmunidad: 4 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: 1 periodo de postura.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo

Posología:

0,5 mL.



Edad o peso:

14 a 20 semanas de edad, pero no más tarde que 4 semanas antes de la fecha esperada de inicio de postura.

Condición fisiológica:

Aves sanas.

Vía de administración:

Vía intramuscular, en músculo de muslo o pechuga.

Modo de empleo:

Antes de utilizar la vacuna permitir que alcance la temperatura ambiente (15-25°C).

Agitar el frasco vigorosamente antes de usar y periódicamente durante el uso.

Asegurar que el equipo de vacunación este limpio y estéril antes de su uso.
No utilizar equipo de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de gomas.

d) Contraindicaciones

Ninguna conocida.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico

Muy frecuentes (> animal por cada 10 animales tratados)	Inflamación del punto de inyección ¹
--	---

¹ Una inflamación difusa transitoria que persiste durante aproximadamente 14 días.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso

En el evento donde vacunas vivas fueran utilizadas como primovacunación en aves contra las enfermedades Bronquitis Infecciosa y de Newcastle, la vacuna debe ser administrada al menos 4 semanas después de la administración de vacunas vivas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

g) Uso durante postura y en animales reproductores

No utilizar en gallinas en postura y dentro de 4 semanas antes del inicio del periodo de postura.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis

No se han observado otras reacciones distintas a las mencionadas en ítem "Efectos o Reacciones Adversas", después de la administración de una dosis doble de vacuna.

j) Período de resguardo

Cero (0) días.

APROBADO
SAG
17-07-2025

k) Precauciones especiales para el operadorPara el operador:

Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. La inyección accidental/auto-inyección puede resultar en dolor severo e hinchazón, particularmente si es inyectado en una articulación o dedo, y en casos raros puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no se entrega atención médica inmediata. Si ya se inyectó accidentalmente con este medicamento veterinario, buscar ayuda médica inmediata incluso si solo una pequeña cantidad es inyectada y lleve el inserto con usted. Si el dolor persiste por más de 12 horas después del examen médico, buscar ayuda médica nuevamente.

Para el médico:

Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Si una pequeña cantidad ha sido inyectada, inyecciones accidentales con este medicamento pueden causar hinchazón intensa, lo que puede, por ejemplo, resultar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Se requiere de atención quirúrgica experta e INMEDIATA y puede ser necesario un incisión temprana e irrigación en el área inyectada, especialmente cuando está involucrada la pulpa del dedo o tendón.

APROBADO
SAG
17-07-2025

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS**a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

b) Período de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda.

24 meses.

Utilizar inmediatamente una vez abierto el frasco y descartar el producto sobrante.

c) Condiciones de almacenamiento

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz.

d) Descripción de los envases

Estuche de cartulina impreso, con 1 frasco de polietileno tereftelato (PET) o vidrio hidrolítico tipo II, etiquetado, cerrado con tapón de goma nitrilo y sellado con una cápsula de aluminio, conteniendo 250 mL (500 dosis) o 500 mL (1000 dosis). Incluye inserto.

Caja etiquetada, con 12 frascos de polietileno tereftelato (PET), etiquetados, cerrados con tapón de goma nitrilo y sellado con cápsula de aluminio, conteniendo 250 mL (500 dosis) o 500 mL (1000 dosis). Incluye inserto.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

No arrojar los envases vacíos o envases con el producto junto con los desechos domésticos. No eliminar en el suelo o en cursos de agua.

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA FABRICANTE Y DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA EMPRESA LICENCIANTE**Fabricado por:**

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda

APROBADO
SAG
17-07-2025

Importado y distribuido por:

Intervet Veterinario Chile Limitada.

Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Reg. SAG N° 2717-B