




REGISTRO SAG N° 2719-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
22-07-2025

Contenido: 500 mL (1000 dosis)

Nobilis®
RT + IB multi + ND + EDS

Nobilis®
RT + IB multi + ND + EDS

Contenido: 250 mL (500 dosis)

Leer inserto antes de usar.

Gallinas reproductoras y de postura
Vía intramuscular
Dosis única de 0,5 mL.

Composición:
Cada dosis contiene:
Pneumovirus Aviar, Cepa BUT1#8544 ≥ 9,5 log₂ unidades ELISA*
Virus Bronquitis Infecciosa Aviar,
Serotipo Massachusetts, Cepa M41 ≥ 5,5 log₂ unidades VN*
Virus Bronquitis Infecciosa Aviar,
Serotipo D207/D274, Cepa 249g ≥ 4,0 log₂ unidades VN*
Virus Enfermedad de Newcastle,
Cepa Clone 30 ≥ 50 unidades PD₅₀
≥ 4,0 log₂ unidades HI por 1/50 dosis*
Adenovirus Aviar, Cepa BC14 ≥ 6,5 log₂ unidades HI*
Excipientes c.s.p. 0,5 mL
- Adyuvante: Parafina líquida
*respuesta serológica en pollos

Efectos adversos o reacciones adversas:

Muy frecuentes (>1 animal por cada 10 animales tratados):	Inflamación del punto de inyección ¹
--	---

¹ Una inflamación difusa transitoria que persiste durante aproximadamente 14 días.

Nobilis®
RT + IB multi + ND + EDS

Contenido: 250 mL (500 dosis)

Fabricado por:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda

Importado y distribuido por:
Intervet Chile Limitada.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

Reg. SAG N° ____-8

Serie: F. Fab.: Vence:

imprint area
Varnish free



PSA020S02 02 R1
82,5x82,5x156mm
CMYK

Nobilis®
RT + IB multi + ND + EDS

VACUNA INACTIVADA CONTRA RINOTRAQUEITIS AVIAR,
BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR, ENFERMEDAD DE
NEWCASTLE Y SÍNDROME CAÍDA DE LA POSTURA.

EMULSIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

Contenido: 250 mL (500 dosis)



Nobilis®
RT + IB multi + ND + EDS

Contenido: 250 mL (500 dosis)

Contraindicaciones:
Ninguna conocida.

Uso durante postura y en animales reproductores:
No usar en aves en postura y dentro de las 4 semanas antes del inicio del periodo de postura.

Periodo de resguardo:
Cero (0) días.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz.
Una vez abierto, utilizar dentro de 3 horas.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración:
No arrojar los envases vacíos o envases con el producto junto con los desechos domésticos.
No eliminar en el suelo o en cursos de agua.
Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Venta Bajo Receta Médica Veterinaria
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Nobilis® RT+IBmulti+ND+EDS



VACUNA INACTIVADA CONTRA RINOTRAQUEITIS AVIAR, BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR,
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y SÍNDROME CAÍDA DE LA POSTURA
EMULSIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

Contenido: 250 mL

Leer inserto antes de usar.
Gallinas reproductoras y de postura
Vía intramuscular
Dosis única de 0,5 mL.



Modo de empleo:

Antes de usar, permitir que la vacune alcance temperatura ambiente (15-25°C).
Agitar el frasco vigorosamente antes de usar y periódicamente durante el uso.
Asegurar que el equipo de vacunación está limpio y estéril antes de su uso.
No utilizar equipos de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de gomas.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz.
Una vez abierto, utilizar dentro de 3 horas.

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes,
Santiago, Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.


Reg. SAG N° ____-B

Señe: F. Fab.: Vence:

Imprint
Area

**APROBADO
SAG**

22-07-2025



Nobilis® RT+IBmulti+ND+EDS



VACUNA INACTIVADA CONTRA RINOTRAQUEITIS AVIAR, BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR,
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y SÍNDROME CAÍDA DE LA POSTURA
EMULSIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

Contenido: 500 mL

Leer inserto antes de usar.

Gallinas reproductoras y de postura
Vía intramuscular
Dosis única de 0,5 mL.



MSD
Animal Health

Modo de empleo:

Antes de usar, permitir que la vacune alcance temperatura ambiente (15-25°C).
Agitar el frasco vigorosamente antes de usar y periódicamente durante el uso.
Asegurar que el equipo de vacunación está limpio y estéril antes de su uso.
No utilizar equipos de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de gomas.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz.
Una vez abierto, utilizar dentro de 3 horas.

Venta Bajo Receta Médica Veterinaria

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes,
Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.
Reg. SAG N° ____-B

Señe: F. Fab.: Vence:

Imprint
Area

**APROBADO
SAG**

22-07-2025

Nobilis®
RT + IB multi + ND + EDS



VACUNA INACTIVADA CONTRA RINOTRAQUEITIS AVIAR, BRONQUITIS
INFECCIOSA AVIAR, ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y SÍNDROME CAÍDA DE LA
POSTURA.
EMULSIÓN INYECTABLE



USO VETERINARIO
Reg. SAG N° ____-B

Composición

Cada dosis contiene:

Pneumovirus Aviar, Cepa BUT1#8544 $\geq 9,5 \log_2$ unidades ELISA*
Virus Bronquitis Infecciosa Aviar,
Serotipo Massachusetts, Cepa M41 $\geq 5,5 \log_2$ unidades VN*
Virus Bronquitis Infecciosa Aviar,
Serotipo D207/D274, Cepa 249g $\geq 4,0 \log_2$ unidades VN*
Virus Enfermedad de Newcastle,
Cepa Clone 30 ≥ 50 unidades PD₅₀ o $\geq 4,0 \log_2$ unidades
HI por 1/50 dosis*
Adenovirus Aviar, Cepa BC14 $\geq 6,5 \log_2$ unidades HI*
- Adyuvante: Parafina líquida.
Excipientes c.s.p. 0,5 mL
*respuesta serológica en pollos

Especie de destino

Gallinas reproductoras y de postura.

REGISTRO SAG N° 2719-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Indicaciones de uso

Inmunización activa, como ayuda en la:

- Prevención de los signos respiratorios y reducción de la caída de la producción de huevos y defectos de la cáscara del huevo relacionados al virus de la Rinotraqueitis Aviar (Pneumovirus aviar).
- Reducción de la infección y prevención de la caída de producción de huevo causada por el serotipo Massachusetts del Virus Bronquitis Infecciosa.
- Reducción de la caída de producción de huevo y defectos de la cáscara del huevo causada por el serotipo D274/D207 del Virus Bronquitis Infecciosa.
- Prevención de la mortalidad y signos clínicos y reducción de la infección causada por el virus de la Enfermedad de Newcastle.
- Reducción de la caída de producción de huevos y defectos de la cáscara del huevo causados por el virus del Síndrome de Caída de la Postura '76.

Inicio de la inmunidad: 4 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: 1 periodo de postura.

Posología:

Dosis única de 0,5 mL.

Edad:

14 a 20 semanas de edad, pero no después de 4 semanas antes del inicio esperado de la postura.

En el evento en que vacunas vivas hayan sido utilizadas como primovacuna en aves contra Bronquitis Infecciosa, Rinotraqueitis y Enfermedad de Newcastle, la vacuna debe ser administrada al menos 4 semanas después de la administración de las vacunas vivas.

Condición fisiológica:

Aves sanas.

Vía de administración:

Vía intramuscular, en musculo de muslo o pecho.

Modo de empleo:

Antes de usar, permitir que la vacuna alcance temperatura ambiente (15-25 °C).

Agitar el frasco vigorosamente antes de usar y periódicamente durante el uso.

Asegurar que el equipo de vacunación está limpio y estéril antes de su uso.

No utilizar equipos de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de gomas.

Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico

Muy frecuentes (>1 animal por cada 10 animales tratados):	Inflamación del punto de inyección ¹
--	---

¹ Una inflamación difusa transitoria que persiste durante aproximadamente 14 días.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Uso durante postura y en animales reproductores

No usar en aves en postura y dentro de las 4 semanas antes del inicio del periodo de postura.

Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Sobredosis

No se observaron reacciones adversas diferentes a las mencionadas en ítem "Efectos adversos o reacciones adversas", cuando se administró el doble de la dosis.

Período de resguardo
Cero (0) días.

REGISTRO SAG N° 2719-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Precauciones especiales para el operador

Para el operador:

Este producto contiene aceite mineral. La inyección accidental/autoinyección puede resultar en dolor severo e hinchazón, particularmente si es inyectado en una articulación o dedo, y en casos raros esto puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no se entrega atención médica a tiempo.

Para el médico:

Este producto contiene aceite mineral. Incluso si pequeñas cantidades han sido inyectadas, la inyección accidental de este producto puede causar hinchazón intensa, la cual, por ejemplo, puede resultar en necrosis isquémica e incluso en la pérdida del dedo. Se requiere atención quirúrgica experta INMEDIATA y puede ser necesario una incisión temprana e irrigación del área inyectada, especialmente donde existe involucramiento de la pulpa del dedo o tendón.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico

Condiciones de almacenamiento

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz.
Una vez abierto, utilizar dentro de 3 horas.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

No arrojar los envases vacíos o envases con el producto junto con los desechos domésticos. No eliminar en el suelo o en cursos de agua.

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

a) Nombre de fantasía

Nobilis® RT + IB multi + ND + EDS

b) Nombre genérico

Vacuna inactivada contra Rinotraqueitis Aviar, Bronquitis Infecciosa Aviar, Enfermedad de Newcastle y Síndrome Caída de la Postura.

c) Forma farmacéutica

Emulsión inyectable

REGISTRO SAG N° 2719-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

2. COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Pneumovirus Aviar,

Cepa BUT1#8544

≥ 9,5 log₂ unidades ELISA*

Virus Bronquitis Infecciosa Aviar,

Serotipo Massachusetts, Cepa M41

≥ 5,5 log₂ unidades VN*

Virus Bronquitis Infecciosa Aviar,

Serotipo D207/D274, Cepa 249g

≥ 4,0 log₂ unidades VN*

Virus Enfermedad de Newcastle,

Cepa Clone 30

≥ 50 unidades PD₅₀ o

≥ 4,0 log₂ unidades HI por 1/50 dosis*

Adenovirus Aviar, Cepa BC14

Excipientes c.s.p.

≥ 6,5 log₂ unidades HI*

- Adyuvante: Parafina líquida

0,5 mL

*respuesta serológica en pollos

APROBADO
SAG

22-07-2025

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunización activa contra los virus de la Rinotraqueitis Aviar, Bronquitis Infecciosa Aviar, Enfermedad de Newcastle y Síndrome Caída de la Postura.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

a) Especie de destino

Gallinas reproductoras y ponedoras.

b) Indicaciones de uso

Inmunización activa, como ayuda en la:

- Prevención de los signos respiratorios y reducción de la caída de la producción de huevos y defectos de la cáscara del huevo relacionados al virus de la Rinotraqueitis Aviar (Pneumovirus aviar).
- Reducción de la infección y prevención de la caída de producción de huevo causada por el serotipo Massachusetts del Virus Bronquitis Infecciosa.
- Reducción de la caída de producción de huevo y defectos de la cascara del huevo causada por el serotipo D274/D207 del Virus Bronquitis Infecciosa.
- Prevención de la mortalidad y signos clínicos y reducción de la infección causada por el virus de la Enfermedad de Newcastle.
- Reducción de la cada de producción de huevos y defectos de la cáscara del huevo causados por el virus del Síndrome de Caída de la Postura ´76.

Inicio de la inmunidad: 4 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: 1 periodo de postura.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo

Posología:

Dosis única de 0,5 mL.

REGISTRO SAG N° 2719-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Edad o peso:

14 a 20 semanas de edad, pero no después de 4 semanas antes del inicio esperado de la postura.

En el evento en que vacunas vivas hayan sido utilizadas como primovacunación en aves contra Bronquitis Infecciosa, Rinotraqueitis y Enfermedad de Newcastle, la vacuna debe ser administrada al menos 4 semanas después de la administración de las vacunas vivas.

Condición fisiológica:

Aves sanas.

APROBADO
SAG

22-07-2025

Vía de administración:

Vía intramuscular, en musculo de muslo o pecho.

Modo de empleo:

Antes de usar, permitir que la vacune alcance temperatura ambiente (15-25°C).

Agitar el frasco vigorosamente antes de usar y periódicamente durante el uso.

Asegurar que el equipo de vacunación está limpio y estéril antes de su uso.

No utilizar equipos de vacunación con partes de goma, ya que el excipiente puede dañar ciertos tipos de gomas.

APROBADO
SAG
22-07-2025

d) Contraindicaciones

Ninguna conocida.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico

Muy frecuentes (>1 animal por cada 10 animales tratados):	Inflamación del punto de inyección ¹
---	---

¹ Una inflamación difusa transitoria que persiste durante aproximadamente 14 días.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

g) Uso durante postura y en animales reproductores

No usar en aves en postura y dentro de las 4 semanas antes del inicio del periodo de postura.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis

No se observaron reacciones adversas diferentes a las mencionadas en ítem “Efectos adversos o reacciones adversas”, cuando se administró el doble de la dosis.

j) Período de resguardo

Cero (0) días.

REGISTRO SAG N° 2719-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

k) Precauciones especiales para el operador

Para el operador:

Este producto contiene aceite mineral. La inyección accidental/autoinyección puede resultar en dolor severo e hinchazón, particularmente si es inyectado en una articulación o dedo, y en casos raros esto puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no se entrega atención médica a tiempo.

Para el médico:

Este producto contiene aceite mineral. Incluso si pequeñas cantidades han sido inyectadas, la inyección accidental de este producto puede causar hinchazón intensa, la cual, por ejemplo, puede resultar en necrosis isquémica e incluso en la pérdida del dedo. Se requiere atención quirúrgica experta INMEDIATA y puede ser necesario una incisión temprana e irrigación del área inyectada, especialmente donde existe involucramiento de la pulpa del dedo o tendón.

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico.

b) Período de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según corresponda.

24 meses.

Una vez abierto, utilizar dentro de 3 horas.

**APROBADO
SAG**

22-07-2025

c) Condiciones de almacenamiento

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar. Proteger de la luz.

d) Descripción de los envases

Estuche de cartulina impreso, con 1 frasco de polietileno tereftalato (PET) etiquetado, cerrado con tapón de goma nitrilo y sellado con una capsula de aluminio, conteniendo 250 mL (500 dosis) o 500 mL (1000 dosis). Incluye inserto.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

No arrojar los envases vacíos o envases con el producto junto con los desechos domésticos. No eliminar en el suelo o en cursos de agua.

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

REGISTRO SAG N° 2719-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA FABRICANTE Y DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA EMPRESA LICENCIANTE

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Holanda

APROBADO
SAG
22-07-2025

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Reg. SAG N° ____-B

REGISTRO SAG N° 2719-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO