



c. Proyecto de rotulado gráfico (estuche, etiqueta, blíster, prospecto, folletos).

RÓTULO IMPRESO AMPOLLA
Presentación de 1.000 dosis

1000 DOSIS/DOSES
VECTORMUNE® HVT LT
VACUNA CONTRA LA LARINGOTRAQUEITIS
AVIAR-ENFERMEDAD DE MAREK,
Serotipo 3, Vector Vivo de la Enfermedad
de Marek
VER EL INSERTO PARA INSTRUCCIONES
VACINA CONTRA A LARINGOTRAQUEÍTE
AVIÁRIA E DOENÇA DE MAREK,
Sorotipo 3, Vetor Vivo da Doença de Marek
PARA MAIS INFORMAÇÕES VIDE BULA
2545LATAM-02
CEVA ANIMAL HEALTH LLC
Lenexa, KS 66215 USA
VLN 368/PCN 16J1.R1
LOTE/PART.:
FABR.:
VENC.:

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG

21-10-2025



RÓTULO IMPRESO AMPOLLA
Presentación de 2.000 dosis

2000 DOSIS/DOSES
VECTORMUNE® HVT LT
VACUNA CONTRA LA LARINGOTRAQUEITIS
AVIAR-ENFERMEDAD DE MAREK,
Serotipo 3, Vector Vivo de la Enfermedad
de Marek
VER EL INSERTO PARA INSTRUCCIONES
VACINA CONTRA A LARINGOTRAQUEÍTE
AVIÁRIA E DOENÇA DE MAREK,
Sorotipo 3, Vetor Vivo da Doença de Marek
PARA MAIS INFORMAÇÕES VIDE BULA
4546LATAM-02
CEVA ANIMAL HEALTH LLC
Lenexa, KS 66215 USA
VLN 368/PCN 16J1.R1
LOTE/PART.:
FABR.:
VENC.:

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-10-2025



RÓTULO IMPRESO AMPOLLA
Presentación de 4.000 dosis

4000 DOSIS/DOSES
VECTORMUNE® HVT LT
VACUNA CONTRA LA LARINGOTRAQUEITIS
AVIAR-ENFERMEDAD DE MAREK,
Serotipo 3, Vector Vivo de la Enfermedad
de Marek
VER EL INSERTO PARA INSTRUCCIONES
VACINA CONTRA A LARINGOTRAQUEÍTE
AVIÁRIA E DOENÇA DE MAREK,
Sorotipo 3, Vetor Vivo da Doença de Marek
PARA MAIS INFORMAÇÕES VIDE BULA
4547LATAM-02
CEVA ANIMAL HEALTH LLC
Lenexa, KS 66215 USA
VLN 368/PCN 16J1.R1
LOTE/PART.:
FABR.:
VENC.:

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-10-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE BAXTER
Presentación de 400 mL

DILUYENTE ESTÉRIL PARA VACUNAS AVIARES
USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO 400 mL

COMPOSICIÓN SOLUCIÓN FOSFATADA ADICIONADA DE SACAROSA Y ROJO FENOL

MODO DE USAR / INSTRUCCIONES

VERIFICAR EL COLOR Y ASPECTO DEL DILUYENTE ANTES DE RECONSTITUIR LA VACUNA. DILUIR LA VACUNA A UTILIZAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEZCLAR CUIDADOSAMENTE LA SOLUCIÓN VACUNAL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR ENTRE 15° Y 30°.

NO REFRIGERAR.

NO UTILIZAR EL DILUYENTE SI SE VE TURBIO O ESTÁ DAÑADO EL ENVASE
INCINERAR ESTE ENVASE Y TODO EL CONTENIDO NO UTILIZADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO DE LA VACUNA PARA MAYOR INFORMACIÓN.

FABRICANTE

BAXTER HOSPITALAR LTDA

AV ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2555 - SÃO PAULO SP -BRASIL

CNPJ 49.351.786/0002-61

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Ceva Salud Animal- México

EN PARAGUAY

Representante - LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SA

Asesor técnico Dr. Erwin Muhr - registro N° 660

N° de registro SENACSA 20791

EN CHILE:

Ceva Salud Animal Chile SpA,

Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Para reconstituir la vacuna Reg. SAG N° _____

PART

FABR

VENC

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-10-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE BAXTER
Presentación de 800 mL

DILUYENTE ESTÉRIL PARA VACUNAS AVIARES
USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO 800 mL

COMPOSICIÓN SOLUCIÓN FOSFATADA ADICIONADA DE SACAROSA Y ROJO FENOL

MODO DE USAR / INSTRUCCIONES

VERIFICAR EL COLOR Y ASPECTO DEL DILUYENTE ANTES DE RECONSTITUIR LA VACUNA. DILUIR LA VACUNA A UTILIZAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEZCLAR CUIDADOSAMENTE LA SOLUCIÓN VACUNAL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR ENTRE 15° Y 30°.

NO REFRIGERAR.

NO UTILIZAR EL DILUYENTE SI SE VE TURBIO O ESTÁ DAÑADO EL ENVASE
INCINERAR ESTE ENVASE Y TODO EL CONTENIDO NO UTILIZADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO DE LA VACUNA PARA MAYOR INFORMACIÓN.

FABRICANTE

BAXTER HOSPITALAR LTDA

AV ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2555 - SÃO PAULO SP -BRASIL

CNPJ 49.351.786/0002-61

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Ceva Salud Animal- México

EN PARAGUAY

Representante - LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SA

Asesor técnico Dr. Erwin Muhr - registro N° 660

N° de registro SENACSA 20791

EN CHILE:

Ceva Salud Animal Chile SpA,

Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Para reconstituir la vacuna Reg. SAG N° _____

PART

FABR

VENC

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-10-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE BAXTER
Presentación de 1000 mL

DILUYENTE ESTÉRIL PARA VACUNAS AVIARES
USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO 1.000 mL

COMPOSICIÓN SOLUCIÓN FOSFATADA ADICIONADA DE SACAROSA Y ROJO FENOL

MODO DE USAR / INSTRUCCIONES

VERIFICAR EL COLOR Y ASPECTO DEL DILUYENTE ANTES DE RECONSTITUIR LA VACUNA. DILUIR LA VACUNA A UTILIZAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEZCLAR CUIDADOSAMENTE LA SOLUCIÓN VACUNAL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR ENTRE 15° Y 30°.

NO REFRIGERAR.

NO UTILIZAR EL DILUYENTE SI SE VE TURBIO O ESTÁ DAÑADO EL ENVASE
INCINERAR ESTE ENVASE Y TODO EL CONTENIDO NO UTILIZADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO DE LA VACUNA PARA MAYOR INFORMACIÓN.

FABRICANTE

BAXTER HOSPITALAR LTDA

AV ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2555 - SÃO PAULO SP -BRASIL

CNPJ 49.351.786/0002-61

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Ceva Salud Animal- México

EN PARAGUAY

Representante - LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SA

Asesor técnico Dr. Erwin Muhr - registro N° 660

N° de registro SENACSA 20791

EN CHILE:

Ceva Salud Animal Chile SpA,

Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Para reconstituir la vacuna Reg. SAG N° _____

PART

FABR

VENC

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-10-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE BAXTER
Presentación de 1200 mL

DILUYENTE ESTÉRIL PARA VACUNAS AVIARES
USO VETERINARIO

CONTENIDO NETO 1.200 mL

COMPOSICIÓN SOLUCIÓN FOSFATADA ADICIONADA DE SACAROSA Y ROJO FENOL

MODO DE USAR / INSTRUCCIONES

VERIFICAR EL COLOR Y ASPECTO DEL DILUYENTE ANTES DE RECONSTITUIR LA VACUNA. DILUIR LA VACUNA A UTILIZAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEZCLAR CUIDADOSAMENTE LA SOLUCIÓN VACUNAL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR ENTRE 15° Y 30°.

NO REFRIGERAR.

NO UTILIZAR EL DILUYENTE SI SE VE TURBIO O ESTÁ DAÑADO EL ENVASE
INCINERAR ESTE ENVASE Y TODO EL CONTENIDO NO UTILIZADO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSULTAR EL INSTRUCTIVO DE LA VACUNA PARA MAYOR INFORMACIÓN.

FABRICANTE

BAXTER HOSPITALAR LTDA

AV ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2555 - SÃO PAULO SP -BRASIL

CNPJ 49.351.786/0002-61

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Ceva Salud Animal- México

EN PARAGUAY

Representante - LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SA

Asesor técnico Dr. Erwin Muhr - registro N° 660

N° de registro SENACSA 20791

EN CHILE:

Ceva Salud Animal Chile SpA,

Avda. Apoquindo 3669, Of. 801, Las Condes, Santiago

Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Para reconstituir la vacuna Reg. SAG N° _____

PART

FABR

VENC

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-10-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE CEVA ANIMAL HEALTH, LLC
Presentación de 400 mL

Serial No

Manufacturing date:

Exp date

400 mL

DILUYENTE PARA RECONSTITUIR
VACUNAS AVIARES CONGELADAS

Composición: Solución fosfatada con adición de sacarosa y rojo fenol.

No usar este diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C). No refrigerar.

Para mayor información, ver prospecto interno.

Utilizar inmediatamente una vez reconstituido. Mantener fuera del alcance de los niños.

Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

Para reconstituir la vacuna Reg SAG N°

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC
8906 Rosehill Rd.
Lenexa, Kansas 66215, USA

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-10-2025



ETIQUETA BOLSA DILUYENTE FABRICANTE CEVA ANIMAL HEALTH, LLC
Presentación de 800 mL

Serial No

Manufacturing date:

Exp date

800 mL

DILUYENTE PARA RECONSTITUIR
VACUNAS AVIARES CONGELADAS

Composición: Solución fosfatada con adición de sacarosa y rojo fenol.

No usar este diluyente si se ve turbio.

Condiciones de almacenamiento: mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C). No refrigerar.

Para mayor información, ver prospecto interno.

Utilizar inmediatamente una vez reconstituido. Mantener fuera del alcance de los niños.

Incinerar este envase y todo el contenido no utilizado.

USO VETERINARIO

Para reconstituir la vacuna Reg SAG N°

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA,
Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Ceva Animal Health, LLC. USA

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC
8906 Rosehill Rd.
Lenexa, Kansas 66215, USA

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-10-2025



INSERTO

Presentación de 1.000, 2.000 y 4000 dosis

VECTORMUNE® HVT LT

Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Enfermedad de Marek y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Nota: Lea este inserto antes de comenzar la vacunación

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable.

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

ESPECIE DE DESTINO

Pollos *broilers* y Pollas de reemplazo.

APROBADO
SAG
21-10-2025

COMPOSICIÓN

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Herpes Pavo, Cepa FC-126, Serotipo 3, recombinante rHVT/ILT ≥ 3.160 UFP

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B

INDICACIONES DE USO

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Marek y de la Laringotraqueitis Infecciosa Aviar.

- **Inicio de la inmunidad:** 5 días de edad, contra la enfermedad de Marek, y 3 semanas de edad, contra la laringotraqueítis infecciosa aviar.
- **Duración de la inmunidad:** hasta las 6 semanas de edad para Laringotraqueitis infecciosa aviar

POSOLOGÍA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

- **Dosis:**
1 dosis/ave o 1 dosis /embrión
- **Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:**
Dosis única
- **Edad o peso:**
Pollos broiler/Pollas de reemplazo: 1 día de edad.
Huevos embrionados: 18-19 días de incubación.
- **Condición fisiológica:**



Embriones y pollos sanos.

- **Vía de administración:**

Vía subcutánea en la parte posterior del cuello (aves de 1 día de edad).

Vía in ovo (embriones de 18 - 19 días de incubación).

- **Modo de empleo:**

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Preparación de la vacuna

- Descongelar solo las ampollas que serán utilizadas, con un máximo de 3 a la vez.
- Retirar la ampolla del contenedor y colocar en un baño de agua limpia (20 – 30°C), agitando suavemente para obtener un descongelado rápido y uniforme.
- Romper el cuello de la ampolla y extraer cuidadosamente la vacuna de la ampolla con una aguja de calibre 18 -20 pulgadas y añadir suavemente el contenido a la bolsa del diluyente.
- Con una pequeña cantidad de diluyente enjuagar la ampolla para retirar el contenido completo.
- Mezcle el contenido de la bolsa de diluyente agitándolo suavemente.
- Utilizar la vacuna inmediatamente y agitar suavemente durante la aplicación para asegurar la correcta suspensión de las células.

Vacunación subcutánea

1. Diluir 1000 dosis de vacuna en 200 mL de diluyente.
2. Utilizar jeringa automática, agujas y demás equipo esterilizado en autoclave o por ebullición.
3. Utilizar una aguja corta (3/8 o 1/2 pulgada) de calibre 20
4. Administrar 0,2 mL de vacuna en forma aséptica.

APROBADO
SAG
21-10-2025

Vacunación *in ovo*

1. Leer el manual del operador del sistema de inyección de huevos antes de iniciar la vacunación.
2. Sanitizar el sistema de inyección antes y después de su uso, siguiendo los procedimientos descritos en el manual de operaciones.
3. Elegir la dilución a utilizar, dependiendo del volumen a inyectar en cada huevo:
 - Diluir 1.000 dosis de vacuna en 100 mL de diluyente y administrar 0,1 mL por embrión.
 - Diluir 1.000 dosis de vacuna en 50 mL de diluyente y administrar 0,05 mL por embrión.

PERIODO DE RESGUARDO

21 días.



EFFECTOS ADVERSOS O REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

No existe información disponible respecto a la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

PRINCIPALES INCOMPATIBILIDADES

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún otro producto farmacéutico, excepto con el diluyente suministrado por el fabricante.

CONTRAINDICACIONES

No se conocen

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

La vacuna debe almacenarse en nitrógeno líquido.

Verificar diariamente el nivel de nitrógeno líquido del contenedor.

El almacenamiento o manipulación inadecuados de la vacuna pueden provocar una pérdida de potencia.

No retire la vacuna del nitrógeno líquido hasta que esté lista para su uso.

No vuelva a congelar la vacuna.

Utilice todo el contenido inmediatamente después de la dilución.

Mantener fuera del alcance de los niños.

APROBADO
SAG
21-10-2025

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Vacuna: mantener congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

Diluyente: mantener a temperatura ambiente, entre 15 - 30°C. No refrigerar.

Utilizar inmediatamente una vez reconstituido

PRECAUCIONES PARA EL OPERADOR

Utilizar elementos de protección personal durante el manejo del producto.

Lavar y desinfectar las manos luego del uso.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata.

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

REG. SAG N°XXXX

Importado y distribuido por:



Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de:

Ceva Animal Health, LLC, USA.

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC.

8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, USA.

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

APROBADO
SAG
21-10-2025



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** Vectormune® HVT-LT
- b) **Nombre Genérico:** Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Enfermedad de Marek y Laringotraqueitis Infecciosa Aviar.
- c) **Forma farmacéutica:** Suspensión inyectable.

2. Composición

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Herpes Pavo, Cepa FC-126, Serotipo 3,
recombinante rHVT/ILT

Excipientes c.s.p.

-Preservantes: Gentamicina, Anfotericina B.

≥ 3.160 UFP

1 dosis

3. Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la Enfermedad de Marek y de la Laringotraqueitis Infecciosa Aviar.

4. Particularidades clínicas:

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

- a) **Especies de destino y subcategoría:**

Pollos *broilers* y pollas de reemplazo.

APROBADO
SAG
21-10-2025

- b) **Indicaciones de uso**

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Enfermedad de Marek y de la Laringotraqueitis Infecciosa Aviar.

Inicio de la inmunidad: 5 días de edad para enfermedad de Marek y 3 semanas post vacunación para Laringotraqueitis Infecciosa aviar.

Duración de la inmunidad: hasta las 6 semanas de edad para Laringotraqueitis infecciosa aviar.

- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.**

- **Dosis:** 1 dosis/ave o 1 dosis /embrión
- **Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:** dosis única
- **Edad o peso:** Pollos *broiler*/Pollas de reemplazo: 1 día de edad.
Huevos embrionados: 18-19 días de incubación.
- **Condición fisiológica:** Embriones y pollos sanos.
- **Vía de administración:**
Vía subcutánea en la parte posterior del cuello (aves de 1 día de edad).
Vía *in ovo* (embriones de 18 - 19 días de incubación).



APROBADO
SAG

21-10-2025

• **Modo de empleo:**

Preparación de la vacuna

- Descongelar solo las ampollas que serán utilizadas, con un máximo de 3 a la vez.
- Retirar la ampolla del contenedor y colocar en un baño de agua limpia (20 – 30°C), agitando suavemente para obtener un descongelado rápido y uniforme.
- Romper el cuello de la ampolla y extraer cuidadosamente la vacuna de la ampolla con una aguja de calibre 18 -20 pulgadas y añadir suavemente el contenido a la bolsa del diluyente.
- Con una pequeña cantidad de diluyente enjuagar la ampolla para retirar el contenido completo.
- Mezcle el contenido de la bolsa de diluyente agitándolo suavemente.
- Utilizar la vacuna inmediatamente y agitar suavemente durante la aplicación para asegurar la correcta suspensión de las células.

Vacunación subcutánea

1. Diluir 1000 dosis de vacuna en 200 mL de diluyente.
2. Utilizar jeringa automática, agujas y demás equipo esterilizado en autoclave o por ebullición.
3. Utilizar una aguja corta (3/8 o 1/2 pulgada) de calibre 20
4. Administrar 0,2 mL de vacuna en forma aséptica.

Vacunación in ovo

1. Leer el manual del operador del sistema de inyección de huevos antes de iniciar la vacunación.
2. Sanitizar el sistema de inyección antes y después de su uso, siguiendo los procedimientos descritos en el manual de operaciones.
3. Elegir la dilución a utilizar, dependiendo del volumen a inyectar en cada huevo:
 - Diluir 1.000 dosis de vacuna en 100 mL de diluyente y administrar 0,1 mL por embrión.
 - Diluir 1.000 dosis de vacuna en 50 mL de diluyente y administrar 0,05 mL por embrión.

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

d) **Contraindicaciones**

Ninguna conocida.

e) **Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico.**

No se han descrito.

f) **Advertencias y precauciones especiales de uso.**

La vacuna debe almacenarse en nitrógeno líquido.

Verificar diariamente el nivel de nitrógeno líquido del contenedor.



El almacenamiento o manipulación inadecuados de la vacuna pueden provocar una pérdida de potencia.

No retire la vacuna del nitrógeno líquido hasta que esté lista para su uso.

No vuelva a congelar la vacuna.

Utilice todo el contenido inmediatamente después de la dilución.

Mantener fuera del alcance de los niños.

g) **Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores.**

No utilizar en aves en postura o dentro de las 4 semanas anteriores al inicio del período de postura.

a) **Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado.**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

b) **Sobredosis.**

Se demostró que una sobredosis de vacuna era segura para las aves administrada por vía subcutánea. Sin embargo, no se recomienda sobredosificar.

c) **Periodo de resguardo**
21 días

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

d) **Precauciones especiales para el operador.**

Utilizar elementos de protección personal durante el manejo del producto.

Lavar y desinfectar las manos luego del uso.

Si la vacuna es inyectada accidentalmente al operario, debe buscarse atención médica inmediata

APROBADO
SAG

21-10-2025

5. Particularidades farmacéuticas

a) **Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún otro producto farmacéutico, excepto con el diluyente suministrado por el fabricante.

b) **Período de eficacia(estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis según corresponda.**

Vacuna congelada: 24 meses.

Diluyente: (Ceva Animal Health, LLC):30 meses.

(Baxter Hospitalar Ltda.): 24 meses.

Utilizar inmediatamente una vez reconstituido.



c) **Condiciones de almacenamiento.**

Vacuna: mantener congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

Diluyente: mantener a temperatura ambiente, entre 15 - 30°C. No refrigerar.

d) **Descripción de los envases.**

Ampolla de vidrio tipo I, impresa, sellada al calor, conteniendo 1.000, 2.000 o 4.000 dosis.

Bolsa de PVC, etiquetada, conteniendo 400, 800, 1.000 o 1.200 mL de diluyente.

Incluye prospecto.

e) **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere.**

Se recomienda incinerar los frascos vacíos y toda vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

REGISTRO SAG N° 2726-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

6. **Condición de venta**

Venta bajo receta médico-veterinaria

7. **Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento, importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda**

Fabricado por:

Ceva Animal Health, LLC.

8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 66215, USA.

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA.

Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de:

Ceva Animal Health, LLC, USA.

APROBADO
SAG
21-10-2025

8. **Otra información**

Mantener fuera del alcance de los niños

Registro SAG N° XXX

USO VETERINARIO