

ETIQUETA AMPOLLA**INNOFUSION® ND-IBD**

2000 // 4000 dosis

Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Enfermedad de Marek, Enfermedad de Newcastle y Enfermedad de Gumboro.

Mantener congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO**Fabricado por:** Intervet International B.V., Países Bajos**Importado y distribuido por:** Intervet Chile Ltda.

Reg. SAG N° _____-B

SERIE:

F. FAB.:

VENCE:

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**APROBADO**
SAG

27-11-2025

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

NOBILIS DILUENT CA

Diluyente para vacunas Marek asociadas a células
400 ml

Composición: Sucrosa, Digerido pancreático de caseína,
Fosfato de potasio monobásico, Fenolsulfotaleína,
Agua para inyección

Uso: ver instrucciones de la vacuna.

Almacenamiento: por debajo de 30°C

USO VETERINARIO



SENASA CERT. N°: 01-084

Importado y comercializado por: Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs.
As.

Argentina: Los envases utilizados deben ser descartados
de acuerdo a la legislación local vigente. Importado y
distribuido por: Intervet Chile Ltda. Mariano
Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago -
Chile. Reg. SAG N°2709-B; Reg. SAG N°xxxx-B

Mantener fuera del alcance de los niños y animales
domésticos.

Fabricado por: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraart 35, 5831 AN

Boxmeer, Holanda



Lote:

Elab:

Venc:

Imprint
Area

APROBADO
SAG

27-11-2025

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

NOBILIS DILUENT CA

Diluyente para vacunas Marek asociadas a células
800 ml

Composición: Sucrosa, Digerido pancreático de caseína,
Fosfato de potasio monobásico, Fenolsulfotaleína,
Agua para inyección

Uso: ver instrucciones de la vacuna.

Almacenamiento: por debajo de 30°C

USO VETERINARIO



SENASA CERT. N°: 01-084

Importado y comercializado por: Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Argentina: Los envases utilizados deben ser descartados
de acuerdo a la legislación local vigente. Importado y
distribuido por: Intervet Chile Ltda. Mariano
Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago -
Chile. Reg. SAG N°2709-B; Reg. SAG N°xxxx-B

Mantener fuera del alcance de los niños y animales
domésticos.

Fabricado por: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN

Boxmeer, Holanda



Lote:

Elab:

Venc:

Imprint
Area

APROBADO
SAG

27-11-2025

INSERTO**INNOFUSION® ND-IBD**

Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Enfermedad de Marek, Enfermedad de Newcastle y Enfermedad de Gumboro.
Suspensión y disolvente para Suspensión Inyectable.
USO VETERINARIO

**APROBADO
SAG**

27-11-2025

ComposiciónCada dosis reconstituida contiene:

Virus Herpes Pavo, Cepa HVP360,
Serotipo 3, recombinante rHVT/NDV/IBDV⁽¹⁾
Excipientes c.s.p.

10^{3,3} – 10^{4,6} UFP⁽²⁾
0,2 mL

⁽¹⁾ codificando proteína F de Virus de Newcastle y proteína VP2 de Virus Gumboro.

⁽²⁾ UFP: Unidades formadoras de placas.

Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la Enfermedad de Marek, virus de la Enfermedad de Newcastle y virus de la Enfermedad de Gumboro.

Especie de destino

Pollos broiler y pollas de reemplazo.

**REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO****Indicaciones de uso**

Como ayuda en la reducción de la mortalidad y signos clínicos causados por el virus de la Enfermedad de Newcastle.

Para prevenir la mortalidad y reducción de los signos clínicos y lesiones causadas por el virus de la Enfermedad Infecciosa de la Bursa.

Como ayuda en la reducción de la mortalidad, signos clínicos y lesiones causadas por el virus de la Enfermedad de Marek.

Inicio de la inmunidad

- Enfermedad de Newcastle: 4 semanas de edad.
- Enfermedad Infecciosa de la Bursa: 3 semanas de edad
- Enfermedad de Marek: 9 días.

Duración de la inmunidad

- Enfermedad de Newcastle: 60 semanas.
- Enfermedad Infecciosa de la Bursa: 60 semanas.
- Enfermedad de Marek: Periodo de riesgo completo.

Posología

- Uso subcutáneo: 0,2 mL por pollo
- Uso *in ovo*: 0,05 mL por huevo embrionado

Frecuencia

Dosis única.

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**Edad o peso**

Pollos de 1 día de edad o huevos embrionados de 18-19 días.

Condición fisiológica

Aves y huevos embrionados sanos.

APROBADO
SAG**Vía de administración**Vía subcutánea en el cuello o vía *in ovo*.**27-11-2025****Modo de empleo**

Se deben tomar las precauciones de asepsia usuales a todas las preparaciones y procedimientos de administración. La manipulación del nitrógeno líquido debe realizarse en un área bien ventilada.

1. Usar el diluyente asociado a células para vacunas de aves para la reconstitución.

Para el **uso subcutáneo** reconstituir la vacuna según la siguiente tabla:

Bolsa diluyente	Numero de ampollas de vacuna para uso subcutáneo
Bolsa de 400 mL de diluyente	1 ampolla conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 800 mL de diluyente	2 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 800 mL de diluyente	1 ampolla conteniendo 4000 dosis
Bolsa de 1200 mL de diluyente	3 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 1600 mL de diluyente	4 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 1600 mL de diluyente	2 ampollas conteniendo 4000 dosis

Cuando el producto es mezclado con Nobilis® Rismavac (Reg. SAG N°2709-B), ambas vacunas deben ser diluidas en la misma bolsa de diluyente, de la misma forma (400 mL de diluyente por cada 2000 dosis de ambos productos o 800 mL de diluyente por cada 4000 dosis de ambos productos).

Para el uso *in ovo* reconstituir la vacuna según la siguiente tabla:

Bolsa diluyente	Numero de ampollas de vacuna para uso subcutáneo
Bolsa de 400 mL de diluyente	4 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 400 mL de diluyente	2 ampollas conteniendo 4000 dosis
Bolsa de 800 mL de diluyente	8 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 800 mL de diluyente	4 ampollas conteniendo 4000 dosis
Bolsa de 1200 mL de diluyente	12 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 1200 mL de diluyente	6 ampollas conteniendo 4000 dosis
Bolsa de 1600 mL de diluyente	16 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 1600 mL de diluyente	8 ampollas conteniendo 4000 dosis

Al momento de la mezcla el diluyente debe ser transparente, de color rojo, sin sedimento y a temperatura ambiente (15° - 25°C).

- La preparación de la vacuna deberá ser planeada antes de que las ampollas sean retiradas del nitrógeno líquido y la cantidad exacta de ampollas de vacuna y cantidad de diluyente necesario deben ser calculados primero. No existe información disponible sobre el número de dosis en las ampollas una vez que son removidas del bastón, así que se debe tener especial cuidado de asegurar que las mezclas de las ampollas con el numero diferente de dosis sea evitado y el diluyente correcto sea utilizado.
- Antes de retirar las ampollas del contenedor de nitrógeno líquido, proteger las manos con guantes, utilizar mangas largas y utilizar mascara facial o gafas. Cuando una ampolla es removida del bastón, tomar en la palma de la mano enguatada lejos del cuerpos y cara.
- Cuando se retira el bastón de las ampollas del canister en el contenedor del nitrógeno líquido, exponer solo la(s) ampolla(s) a ser utilizada inmediatamente. Se recomienda manejar un máximo de 5 ampollas (desde un solo bastón) al mismo tiempo. Después de remover la(s) ampolla(s), las ampollas remanentes deben ser devueltas inmediatamente al canister del contenedor de nitrógeno líquido.
- Descongelar el contenido de la(s) ampolla(s) rápidamente por inmersión de la ampolla en agua limpia a 25° - 27°C. Agitar la ampolla gentilmente para dispersar el contenido. Con el objetivo de proteger las células, es importante que el contenido de la ampolla sea mezclado, inmediatamente después de descongelar, con el diluyente. Secar la ampolla, y luego romperla en su cuello e inmediatamente proceder con el siguiente punto.
- Retirar el contenido de la ampolla gentilmente en una jeringa estéril ajustada con una aguja de 18G.

PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO

7. Insertar la aguja a través del tapón de la bolsa de diluyente, y luego, lenta y gentilmente adicionar el contenido de la jeringa en el diluyente. Agitar gentilmente e invertir la bolsa para mezclar la vacuna. Retirar una pequeña cantidad de la bolsa de diluyente en la jeringa y enjuagar la ampolla. Inyectar el contenido remanente de la ampolla gentilmente en la bolsa de diluyente.
8. Repetir los pasos 6 y 7 para ampollas adicionales, si es requerido.
9. Remover la jeringa e invertir la bolsa (6-8 veces) para mezclar la vacuna.
10. La vacuna esta lista para su uso.

Después de añadir el contenido de la ampolla al diluyente, el producto listo para utilizar es una suspensión inyectable transparente y de color rojo.

La bolsa de la vacuna debe ser girada frecuentemente durante la vacunación para garantizar que la suspensión de la vacuna permanece homogénea y que el titulo viral correcto de la vacuna es administrado (por ejemplo, durante largas sesiones de vacunación).

Contraindicaciones

Ninguna conocida.

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Efectos adversos o reacciones adversas

Ninguno conocido.

APROBADO
SAG

27-11-2025

Advertencias y precauciones especiales de uso

Como esta es una vacuna viva, la cepa vaccinal es excretada desde las aves vacunadas y puede diseminarse a pavos. Las pruebas de seguridad han mostrado que la cepa es seguridad en pavos. Sin embargo, se tienen que seguir medidas de precaución con el objetivo de evitar el contacto directo o indirecto entre pollos vacunados y pavos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Uso durante postura y en animales reproductores

No utilizar durante la postura.

Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

Existen datos de seguridad y eficacia disponibles, los cuales demuestran que InnoFusion® ND-IBD puede ser mezclada en el mismo diluyente y administrada por la vía subcutánea con Nobilis® Rismavac (Reg. SAG N°2709-B). Para el uso mezclado, se ha demostrado un inicio de inmunidad de 5 días para Enfermedad de Marek.

PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO

Existen datos de seguridad y eficacia que demuestran que Nobilis® ND Clone 30 (Reg. SAG N°1119-B), Nobilis® ND C2 (Reg. SAG N°2008-B), Nobilis® IB Ma5 (Reg. SAG N°1115-B) o Nobilis® IB 4-91 (Reg. SAG N°2703-B) pueden ser administradas en forma concomitante (no mezclada) en pollos de 1 día de edad que son vacunados tanto por vía subcutánea como por vía *in ovo* con InnoFusion® ND-IBD. Para este uso asociado, se ha demostrado un inicio de la inmunidad es de 3 semanas (cuando se utiliza con Nobilis® ND Clone 30 (Reg. SAG N°1119-B) y 2 semanas (cuando es utilizada con Nobilis® ND C2 (Reg. SAG N°2008-B).

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos (excepto los mencionados anteriormente) por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Sobredosis

No se han observados síntomas después de la administración de 10 veces la dosis de la vacuna cuando es aplicada por vía subcutánea. Una sobredosis de 3 veces la dosis fue evaluada *in ovo*, la cual demostró ser segura. No existe información de la seguridad o posibles reacciones adversas después de la aplicación de 10 veces la dosis por vía *in ovo*.

Período de resguardo

Cero (0) días.

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Precauciones especiales para el operador

La manipulación de nitrógeno líquido debe ser realizada en un área bien ventilada. InnoFusion® ND-IBD es un virus en suspensión envasado en ampollas de vidrio y almacenadas en nitrógeno líquido. Antes de retirar las ampollas de del canister de nitrógeno líquido, se debe utilizar equipo de protección consistente de guantes, mangas largas y mascara facial o gafas. Con el objetivo de prevenir heridas serias, tanto por el nitrógeno líquido o por las ampollas cuando son removidas del canister, mantener la palma de la mano enguantada sosteniendo la ampolla lejos del cuerpo o la cara. Se debe tener cuidado para prevenir las manos contaminadas, ojos o ropa con el contenido de la ampolla. PRECAUCIÓN: Las ampollas han sido conocidas por explotar al exponerse a cambios repentinos de temperatura. No descongelar en agua caliente o agua helada. Descongelar las ampollas en agua limpia a 25°C-27°C.

Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir ni mezclar con ningún producto veterinario, excepto con Nobilis® Rismavac (Reg. SAG N°2709-B) y el diluyente suministrado por el fabricante.

APROBADO
SAG
27-11-2025

Condiciones de almacenamiento

Suspensión: Mantener congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

Diluyente: Almacenar por debajo de 30°C.

Contenedor: Almacenar el contenedor de nitrógeno líquido en una posición vertical, en una habitación limpia, seca y bien ventilada, separada de la sala de cría y pollos.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

Se recomienda incinerar las ampollas vacías y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria
Mantener fuera del alcance de los niños

APROBADO
SAG

27-11-2025

Fabricado por

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraart 35, 5831 AN Boxmeer,
Países Bajos

Importado y distribuido por

Intervet Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

Reg. SAG N° ____-B

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO INMUNOLÓGICO

a) Nombre de fantasía

Innofusion® ND-IBD

b) Nombre genérico

Vacuna viva recombinante vectorizada contra la Enfermedad de Marek, Enfermedad de Newcastle y Enfermedad de Gumboro.

c) Forma farmacéutica

Suspensión y disolvente para suspensión inyectable.

2. COMPOSICIÓN

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Cada dosis reconstituida contiene:

Virus Herpes Pavo, Cepa HVP360,

Serotipo 3, recombinante rHVT/NDV/IBDV⁽¹⁾

Excipientes c.s.p.

$10^{3,3} - 10^{4,6}$ UFP⁽²⁾

0,2 mL

⁽¹⁾ codificando proteína F de Virus de Newcastle y proteína VP2 de Virus Gumboro.

⁽²⁾ UFP: Unidades formadoras de placas.

3. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Para estimular la inmunidad activa contra el virus de la Enfermedad de Marek, virus de la Enfermedad de Newcastle y virus de la Enfermedad de Gumboro.

4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS

APROBADO
SAG

a) Especie de destino

Pollos broiler y pollas de reemplazo.

27-11-2025

b) Indicaciones de uso

Como ayuda en la reducción de la mortalidad y signos clínicos causados por el virus de la Enfermedad de Newcastle.

Para prevenir la mortalidad y reducción de los signos clínicos y lesiones causadas por el virus de la Enfermedad Infecciosa de la Bursa.

Como ayuda en la reducción de la mortalidad, signos clínicos y lesiones causadas por el virus de la Enfermedad de Marek.

Inicio de la inmunidad:

- Enfermedad de Newcastle: 4 semanas de edad.
- Enfermedad Infecciosa de la Bursa: 3 semanas de edad
- Enfermedad de Marek: 9 días.

Duración de la inmunidad:

- Enfermedad de Newcastle: 60 semanas.
- Enfermedad Infecciosa de la Bursa: 60 semanas.
- Enfermedad de Marek: Periodo de riesgo completo.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo

Posología:

- Uso subcutáneo: 0,2 mL por pollo
- Uso *in ovo*: 0,05 mL por huevo embrionado

Frecuencia:

Dosis única.

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Edad o peso:

Pollos de 1 día de edad o huevos embrionados de 18-19 días.

Condición fisiológica:

Aves y huevos embrionados sanos.

APROBADO
SAG

Vía de administración:

Vía subcutánea en el cuello o vía *in ovo*.

27-11-2025

Modo de empleo:

Se deben tomar las precauciones de asepsia usuales a todas las preparaciones y procedimientos de administración. La manipulación del nitrógeno líquido debe realizarse en un área bien ventilada.

1. Usar el diluyente asociado a células para vacunas de aves para la reconstitución.

Para el **uso subcutáneo** reconstituir la vacuna según la siguiente tabla:

Bolsa diluyente	Numero de ampollas de vacuna para uso subcutáneo
Bolsa de 400 mL de diluyente	1 ampolla conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 800 mL de diluyente	2 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 800 mL de diluyente	1 ampolla conteniendo 4000 dosis
Bolsa de 1200 mL de diluyente	3 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 1600 mL de diluyente	4 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 1600 mL de diluyente	2 ampollas conteniendo 4000 dosis

Cuando el producto es mezclado con Nobilis® Rismavac (Reg. SAG N°2709-B), ambas vacunas deben ser diluidas en la misma bolsa de diluyente, de la misma forma (400 mL de diluyente por cada 2000 dosis de ambos productos o 800 mL de diluyente por cada 4000 dosis de ambos productos).

Para el uso *in ovo* reconstituir la vacuna según la siguiente tabla:

Bolsa diluyente	Numero de ampollas de vacuna para uso subcutáneo
Bolsa de 400 mL de diluyente	4 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 400 mL de diluyente	2 ampollas conteniendo 4000 dosis
Bolsa de 800 ml de diluyente	8 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 800 mL de diluyente	4 ampollas conteniendo 4000 dosis
Bolsa de 1200 mL de diluyente	12 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 1200 mL de diluyente	6 ampollas conteniendo 4000 dosis
Bolsa de 1600 mL de diluyente	16 ampollas conteniendo 2000 dosis
Bolsa de 1600 mL de diluyente	8 ampollas conteniendo 4000 dosis

Al momento de la mezcla el diluyente debe ser transparente, de color rojo, sin sedimento y a temperatura ambiente (15° - 25°C).

2. La preparación de la vacuna deberá ser planeada antes de que las ampollas sean retiradas del nitrógeno líquido y la cantidad exacta de ampollas de vacuna y cantidad de diluyente necesario deben ser calculados primero. No existe información disponible sobre el número de dosis en las ampollas una vez que son removidas del bastón, así que se debe tener especial cuidado de asegurar que las mezclas de las ampollas con el numero diferente de dosis sea evitado y el diluyente correcto sea utilizado.
3. Antes de retirar las ampollas del contenedor de nitrógeno líquido, proteger las manos con guantes, utilizar mangas largas y utilizar mascara facial o gafas. Cuando una ampolla es removida del bastón, tomar en la palma de la mano enguatada lejos del cuerpos y cara.
4. Cuando se retira el bastón de las ampollas del canister en el contenedor del nitrógeno líquido, exponer solo la(s) ampolla(s) a ser utilizada inmediatamente. Se recomienda manejar un máximo de 5 ampollas (desde un solo bastón) al mismo tiempo. Después de remover la(s) ampolla(s), las ampollas remanentes deben ser devueltas inmediatamente al canister del contenedor de nitrógeno líquido.
5. Descongelar el contenido de la(s) ampolla(s) rápidamente por inmersión de la ampolla en agua limpia a 25° - 27°C. Agitar la ampolla gentilmente para dispersar el contenido. Con el objetivo de proteger las células, es importante que el contenido de la ampolla sea mezclado, inmediatamente

PARTE 1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO

- después de descongelar, con el diluyente. Secar la ampolla, y luego romperla en su cuello e inmediatamente proceder con el siguiente punto.
6. Retirar el contenido de la ampolla gentilmente en una jeringa estéril ajustada con una aguja de 18G.
 7. Insertar la aguja a través del tapón de la bolsa de diluyente, y luego, lenta y gentilmente adicionar el contenido de la jeringa en el diluyente. Agitar gentilmente e invertir la bolsa para mezclar la vacuna. Retirar una pequeña cantidad de la bolsa de diluyente en la jeringa y enjuagar la ampolla. Inyectar el contenido remanente de la ampolla gentilmente en la bolsa de diluyente.
 8. Repetir los pasos 6 y 7 para ampollas adicionales, si es requerido.
 9. Remover la jeringa e invertir la bolsa (6-8 veces) para mezclar la vacuna.
 10. La vacuna esta lista para su uso.

Después de añadir el contenido de la ampolla al diluyente, el producto listo para utilizar es una suspensión inyectable transparente y de color rojo.

La bolsa de la vacuna debe ser girada frecuentemente durante la vacunación para garantizar que la suspensión de la vacuna permanece homogénea y que el titulo viral correcto de la vacuna es administrado (por ejemplo, durante largas sesiones de vacunación).

d) Contraindicaciones

Ninguna conocida.

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la especie de destino, derivados del uso del producto inmunológico

Ninguno conocido.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso

Como esta es una vacuna viva, la cepa vaccinal es excretada desde las aves vacunadas y puede diseminarse a pavos. Las pruebas de seguridad han mostrado que la cepa es seguridad en pavos. Sin embargo, se tienen que seguir medidas de precaución con el objetivo de evitar el contacto directo o indirecto entre pollos vacunados y pavos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

g) Uso durante postura y en animales reproductores

No utilizar durante la postura.

APROBADO
SAG

27-11-2025

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado

Existen datos de seguridad y eficacia disponibles, los cuales demuestran que Innofusion® ND-IBD puede ser mezclada en el mismo diluyente y administrada por la vía subcutánea con Nobilis® Rismavac (Reg. SAG N°2709-B). Para el uso mezclado, se ha demostrado un inicio de inmunidad de 5 días para Enfermedad de Marek.

Existen datos de seguridad y eficacia que demuestran que Nobilis® ND Clone 30 (Reg. SAG N°1119-B), Nobilis® ND C2 (Reg. SAG N°2008-B), Nobilis® IB Ma5 (Reg. SAG N°1115-B) o Nobilis® IB 4-91 (Reg. SAG N°2703-B) pueden ser administradas en forma concomitante (no mezclada) en pollos de 1 día de edad que son vacunados tanto por vía subcutánea como por vía *in ovo* con Innofusion® ND-IBD. Para este uso asociado, se ha demostrado un inicio de la inmunidad es de 3 semanas (cuando se utiliza con Nobilis® ND Clone 30 (Reg. SAG N°1119-B) y 2 semanas (cuando es utilizada con Nobilis® ND C2 (Reg. SAG N°2008-B).

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos (excepto los mencionados anteriormente) por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis

No se han observados síntomas después de la administración de 10 veces la dosis de la vacuna cuando es aplicada por vía subcutánea. Una sobredosis de 3 veces la dosis fue evaluada *in ovo*, la cual demostró ser segura. No existe información de la seguridad o posibles reacciones adversas después de la aplicación de 10 veces la dosis por vía *in ovo*.

j) Período de resguardo

Cero (0) días.

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

k) Precauciones especiales para el operador

La manipulación de nitrógeno líquido debe ser realizada en un área bien ventilada. Innofusion® ND-IBD es un virus en suspensión envasado en ampollas de vidrio y almacenadas en nitrógeno líquido. Antes de retirar las ampollas de del canister de nitrógeno líquido, se debe utilizar equipo de protección consistente de guantes, mangas largas y mascara facial o gafas. Con el objetivo de prevenir heridas serias, tanto por el nitrógeno líquido o por las ampollas cuando son removidas del canister, mantener la palma de la mano enguantada sosteniendo la ampolla lejos del cuerpo o la cara. Se debe tener cuidado para prevenir las manos contaminadas, ojos o ropa con el contenido de la ampolla.

APROBADO
SAG

27-11-2025

PRECAUCIÓN: Las ampollas han sido conocidas por explotar al exponerse a cambios repentinos de temperatura. No descongelar en agua caliente o agua helada. Descongelar las ampollas en agua limpia a 25°C - 27°C.

5. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado

No diluir ni mezclar con ningún producto veterinario, excepto con Nobilis® Rismavac (Reg. SAG N°2709-B) y el diluyente suministrado por el fabricante.

b) Período de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la primera apertura del envase y/o extracción de la primera dosis, según Suspensión congelada: 36 meses

Diluyente: 36 meses

Una vez reconstituida, utilizar dentro de 2 horas.

c) Condiciones de almacenamiento

Suspensión: Mantener congelada en nitrógeno líquido (-196°C).

Diluyente: Almacenar por debajo de 30°C.

Contenedor: Almacenar el contenedor de nitrógeno líquido en una posición vertical, en una habitación limpia, seca y bien ventilada, separada de la sala de cría y pollos.

d) Descripción de los envases

Ampolla de vidrio tipo I, etiquetada, sellada al calor, conteniendo 2.000 o 4.000 dosis. Bolsa de plástico multicapa, etiquetada, conteniendo 400, 800, 1.200 o 1.600 mL de diluyente. Incluye prospecto.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración

Se recomienda incinerar las ampollas vacías y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

**APROBADO
SAG**

27-11-2025

6. CONDICIÓN DE VENTA

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria

**REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO**

7. NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA FABRICANTE Y DEL ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR, NOMBRE Y PAÍS DE LA EMPRESA LICENCIANTE

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
Países Bajos

APROBADO
SAG
27-11-2025

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Limitada.
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5, Las Condes, Santiago, Chile.
Bajo licencia de Intervet International B.V. Holanda.

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Reg. SAG N° ____-B

REGISTRO SAG N° 2730-B
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO