

CEVAC® BIL

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, Cepa Mass B48
y Enfermedad de Newcastle, Tipo B1, Cepa B1
Para la inmunización activa de pollos

20x 1000

50250-02

dosis



CEVAC® BIL
20 x 1000 dosis

STD 703

Producido por:

Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest,
Szálás u.5. Hungría.

Fecha de Fab.:

Serie n°:

Fecha de Exp.:

APROBADO
SAG

29-05-2024

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. - Reg. SENASAG CR-PUV No.: 001334/2006

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 0405-B

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. América - Quito - Reg N° : 4A-8200-AGROCALIDAD.

Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Lima. - Reg. SENASA No.: B.01.8.01.1.0622

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741 - Reg. INSAI2041PI34N074654

Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra - CPE 0711226742

En Colombia: Ceva Salud Animal S.A.S. Bogotá. - Reg. ICA No.: 6068 BV

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48..... $\geq 10^{10}$ EID₅₀

Virus Enfermedad de Newcastle, Cepa Hitchner B1..... $\geq 10^{5.5}$ EID₅₀

Excipientes..... csp 1 dosis

Uso mediante gotas intraoculares, aspersión o en el agua de consumo.

ADVERTENCIA: Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después de la reconstitución.

No aceptar si el sello está roto. Ver detalles en inserto incluido.

ALMACENAMIENTO: Entre 2° y 8° C., protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinario

Venta bajo prescripción del medico veterinario

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

STD 418

CEVAC® BIL

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa,
Cepa Mass B48 y Enfermedad de Newcastle,
Tipo B1, Cepa B1

1000 dosis



APROBADO
SAG

Polvo Liofilizado. 29-05-2024

Administración:

Vacunación en el agua de consumo,
mediante aspersión o en gotas intraoculares.

Almacenamiento:

Entre 2° y 8° C, protegido de la luz.

Advertencia:

Ver instrucciones completas en el inserto.

USO VETERINARIO

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

Reg. SENASAG CR-PUV No.: 001334/2006 ;

Reg. SAG No.: 0405-B ; ICA No.: 6068 BV ;

4A-8200-AGROCALIDAD ;

SENASA No.: B.01.8.01.1.0622 ;

INSAI2041PI34N074654

50249-02 - Producido por:

Ceva-Phylaxia, Hungría

Fab.:

Serie No.:

Exp.:

CEVAC® B1 L

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, Cepa Mass B48
y Enfermedad de Newcastle, Tipo B1, Cepa B1
Para la inmunización activa de pollos

20x 2500 dosis



59002-03

CEVAC® B1 L
20 x 2500 dosis

STD 705

Producido por:

Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals Co. Ltd. I 107
Budapest, Szállás u.5. Hungría.

Fecha de Fab.:

Serie n°:

Fecha de Exp.:

APROBADO
SAG

29-05-2024

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. - Reg. SENASAG CR-PUV No.: 001334/2006

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°.: 0405-B

En Ecuador: Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. América - Quito - Reg N° : 4A-8200-AGROCALIDAD.
Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Lima. - Reg. SENASA No.: B.01.8.01.10622

En Venezuela: Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741 - Reg. INSAI2041PI34N074654

Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra - CPE 0711226742

En Colombia: Ceva Salud Animal S.A.S., Bogotá. - Reg. ICA No.: 6068 BV

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48..... $\geq 10^{3.0}$ EID₅₀

Virus Enfermedad de Newcastle, Cepa Hitchner B1 $\geq 10^{5.5}$ EID₅₀

Excipientes..... csp 1 dosis

Uso mediante gotas intraculares, aspersión o en el agua de consumo.

ADVERTENCIA: Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después de la reconstitución.

No aceptar si el sello está roto. Ver detalles en inserto incluido.

ALMACENAMIENTO: Entre 2° y 8° C, protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta bajo prescripción del medico veterinario

USO VETERINARIO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

STD 418

CEVAC® BIL

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa,
Cepa Mass B48 y Enfermedad de Newcastle,
Tipo B1, Cepa B1

2500 dosis



**APROBADO
SAG**

29-05-2024

Polvo Liofilizado.

Administración:

Vacunación en el agua de consumo,
mediante aspersión o en gotas intraoculares.

Almacenamiento:

Entre 2° y 8° C, protegido de la luz.

Advertencia:

Ver instrucciones completas en el inserto.

USO VETERINARIO

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

Reg. SENASAG CR-PUV No.: 001334/2006 ;

Reg. SAG No.: 0405-B ; ICA No.: 6068 BV ;

4A-8200-AGROCALIDAD ;

SENASA No.: B.01.8.01.1.0622 ;

INSAI2041PI34N074654

59004-03 - Producido por:

Ceva-Phylaxia, Hungría

Fab.:

Serie No.:

Exp.:

CEVAC® B1 L

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, Cepa Mass B48
y Enfermedad de Newcastle, Tipo B1, Cepa B1
Para la inmunización activa de pollos

20x 5000

00000

dosis



CEVAC® B1 L
20 x 5000 dosis

STD 703

Producido por: Ceva-Phylaxia, Veterinary Biologicals
Co. Ltd. | 107 Budapest, Szállás u.5. Hungría

Fecha de Fab.:

Serie n°:

Fecha de Exp.:

APROBADO
SAG

29-05-2024

Importado y distribuido por:

En Bolivia: Agroservet S.R.L., Santa Cruz. - Reg. SENASAG CR-PUV No.: 001334/06

En Chile: Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 0405-B

En Colombia: Ceva Salud Animal S.A.S., Bogotá. - Reg. ICA No.: 6068 BV

En Ecuador: Representado por: Rebexa S.A. El Calzado Calle: S12 N° OE2-495 y Calle: OE2L - Quito -
Reg N° : 4A-8200-AGROCALIDAD.

En Perú: Ceva Salud Animal S.A.C., Lima. - Reg. SENASA No.: B.01.8.01.I.0622

En Venezuela: Ceva Salud Animal, C.A. - J-29606988-3 / Productos Swissagro, C.A. - J-30310874-I Asesor
tecnico: M.V. Nerina Alliegro Reg. INSAI2041PI34N074654

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus de la Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48..... $\geq 10^{3.0}$ EID₅₀

Virus de la Enfermedad de Newcastle, Cepa Hitchner B1..... $\geq 10^{5.5}$ EID₅₀

Excipientes.....csp 1 dosis

Uso mediante gotas intraoculares, aspersión o en el agua de consumo.

ADVERTENCIA: Utilizar todo el contenido de este empaque inmediatamente después de la reconstitución.

No aceptar si el sello está roto. Ver detalles en inserto incluido.

ALMACENAMIENTO: Entre 2° y 8° C., protegido de la luz.

PERÍODO DE RESGUARDO: 0 días.

En Chile: prohibida la venta fraccionada.

Venta bajo receta médico veterinaria
Venta bajo prescripción del medico veterinario
USO VETERINARIO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

STD 418

CEVAC® B1 L

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa,
Cepa Mass B48 y Enfermedad de Newcastle,
Tipo B1, Cepa B1

5000 dosis



Poivo Liofilizado.

Administración:

Vacunación en el agua de consumo,
mediante aspersión o en gotas intraculares.

Almacenamiento:

Entre 2° y 8° C., protegido de la luz.

Advertencia:

Ver instrucciones completas en el inserto.

**APROBADO
SAG**

29-05-2024

USO VETERINARIO

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

Reg. SENASAG CR-PLV No: 001334/06 ; Reg. SAG No:
0405-B ; ICA No: 6068 BV ; 4A-8200-AGROCALIDAD ;
SENASA No: B.01.8.01.10622 ; INSAI2041PG4N074654

000000 - Producido por:
Ceva-Phylaxia, Hungría
Fab.:
Serie No.:
Exp.:

CEVAC® B1 L

Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, Cepa Mass B48
y Enfermedad de Newcastle, Tipo B1, Cepa B1
Para la inmunización activa de pollos



APROBADO
SAG

29-05-2024

COMPOSICIÓN

Polvo Liofilizado.

Cada dosis contiene:

Virus Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48..... $\geq 10^{10}$ EID₅₀
Virus Enfermedad de Newcastle, Cepa Hitchner B1..... $\geq 10^{4.5}$ EID₅₀
Excipientescsp 1 dosis

INDICACIÓN DE USO

Para la inmunización activa de pollos sanos para prevenir la Bronquitis Infecciosa y Enfermedad de Newcastle, a partir del 1º día de edad.

La vacuna puede ser utilizada en la vacunación inicial o en la revacunación de pollos, pollas y gallinas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

La vacunación primaria debe llevarse a cabo con CEVAC B1 L administrada en gotas intraoculares o mediante aspersión a partir del primer día de edad.

La vacunación de refuerzo se recomienda tres o cuatro semanas después mediante administración en el agua de consumo.

Para las pollas se recomienda un segundo refuerzo a las 10 o 12 semanas de edad.

Método de administración en gotas intraoculares:

Llenar el frasco de la vacuna con el diluyente hasta 3/4 del volumen total para disolver la vacuna liofilizada. Verter y diluir la suspensión en el diluyente restante contenido en el frasco plástico con el cuentagotas. Esta preparación de la vacuna debe hacerse con aguja y jeringa estériles.

30 ml de diluyente deben alcanzar para administrar 1000 dosis (0.03 mL/ dosis).

Sostenga el ave por vacunar con la cabeza inclinada hacia un lado.

Sostenga el frasco plástico con la punta del cuentagotas hacia abajo y presione suavemente los lados, aplicando una gota de vacuna en el ojo del ave. Asegúrese que la vacuna se haya reabsorbido antes de liberar al ave.

Método de aspersión:

Se utiliza agua destilada estéril y se reconstituye la vacuna como se explicó en el método de administración en gotas intraoculares. Es preferible utilizar una máquina aspersora que funcione bajo presión constante, colocando una boquilla que produzca partículas de tamaño adecuado (según las recomendaciones del fabricante) y graduando la presión para obtener una lluvia gruesa.

El volumen utilizado varía de 0.2 a 0.3 litros por cada 1000 pollos encasetaados de 1 día, y de 0.5 a 1.0 litros por cada 1000 pollos sobre cama. Este volumen puede variar según las condiciones atmosféricas.

Tras la vacunación, las aves deben quedar ligeramente mojadas.

La vacuna se administra durante la hora más fresca del día, apagando la calefacción y reduciendo la ventilación.

Los pollos se reúnen en las cajas o en el suelo y se coloca la boquilla aspersora a una distancia de 20-30 cm de los animales. Se recomienda practicar la vacunación con luz tenue. Repita la aspersión por segunda vez.

Deje los pollos quietos por espacio de 15 minutos como mínimo y luego coloque la ventilación normal y encienda la calefacción.

Método de administración en el agua de consumo:

Se recomienda no utilizar desinfectantes en el agua de consumo desde 48 horas antes hasta 24 horas después de la vacunación. Cuando se utilice una bomba de cloro, debe apagarse durante este mismo período de tiempo. Los bebederos deben limpiarse completamente antes de utilizarlos para la vacunación. Para la limpieza no se deben utilizar desinfectantes.

Se cierra el sistema de distribución de agua, se levantan y se desocupan las líneas dispensadoras o se vacían los bebederos. El período de retención del agua varía en concordancia con la edad de los pollos por vacunar y las condiciones climáticas (promedio 1.5 horas).

59003-03



Se prepara únicamente la cantidad de vacuna que se va a utilizar inmediatamente. En la preparación y administración de la vacuna se utilizan únicamente materiales y utensilios de plástico.
Se prepara la cantidad requerida de agua que será consumida por las aves en dos horas. Este volumen puede variar, dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales.

Edad	3-4 semanas	A partir de las 10 semanas
Cantidad mínima de agua por 1.000 aves	25-30 litros	40 litros

Como ayuda para preservar la actividad del virus, se puede neutralizar el cloro con 2,5 g de leche descremada en polvo por litro de agua. No utilizar agua con altas concentraciones de iones metálicos. Mezclar la vacuna con agua limpia, fresca y no clorada, abriendo los viales bajo el agua y dejando estabilizar la mezcla durante 10 minutos. Abrir el sistema de hidratación cuando cambie el color del agua (azulada), bajar las líneas y verificar la distribución en todo el galpón. Cuando el tanque esté vacío, llenarlo con una solución de leche descremada en polvo, dejarlo reposar durante 10 minutos y abrir el sistema de irrigación para hidratar la solución de la vacuna remanente en las mangueras.
La suspensión de vacuna también puede ser distribuida manualmente por los operarios, utilizando recipientes plásticos.

PRECAUCIONES GENERALES

Solamente en pollos sanos puede obtenerse protección satisfactoria.
Aproximar siempre el número de dosis al millar superior siguiente (ejemplo, a 20.000 si son 19.450), no trate de aumentar la cantidad requerida. Todas las aves del lote deben ser vacunadas al mismo tiempo.
Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día.
Desechar todos los frascos de vacuna abiertos que sobren después de la vacunación, ciñéndose a las respectivas regulaciones locales o nacionales.
El almacenamiento o el manejo inadecuado de las vacunas puede resultar en pérdida de la potencia.

ADVERTENCIA

El virus de la Enfermedad de Newcastle puede causar una leve inflamación del ojo humano, la cual se prolonga por dos o tres días. Por lo tanto, debe tenerse cuidado al manipular el virus, para evitar el contacto con los ojos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Rara vez es dado observar síntomas respiratorios gripales 4 a 6 días después de la vacunación, pero desaparecen en pocos días.

ALMACENAMIENTO: Entre 2°C a 8°C, protegida de la luz.

PRESENTACIÓN: Viales con 1000, 2500 y 5000 dosis.

Venta bajo receta médico veterinaria

Venta bajo prescripción del médico veterinario

USO VETERINARIO

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**

Importado y distribuido por:

En **Bolivia:** Agroservet S.R.L., Santa Cruz

Reg. SENASAG CR-PUV No.: 001334/2006

En **Chile:** Ceva Salud Animal Chile SpA, Av. Apoquindo 3669, of. 801, Las Condes, Santiago.

Bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia.

Reg. SAG N°: 0405-B

En **Colombia:** Ceva Salud Animal S.A.S., Bogotá.

Reg ICA No.: 6068 BV

En **Ecuador:** Dimune S.A., San Francisco N39-145 y Av. América, Quito.

Reg. No.: 4A-8200-AGROCALIDAD

Médico Veterinario Responsable: Vladimir Egas.

En **Perú:** Ceva Salud Animal S.A.C., Calle José Gonzales 681, Miraflores, Lima.

Reg. SENASA No.: B.01.8.01.1.0622

En **Venezuela:** Productos Swissagro C.A., Caracas, RIF J-303108741

Reg. INSAI2041PI34N074654

Asesor técnico: M.V. Ana Rosa Guerra



Producido por: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. | 107 Budapest, Hungría

DILUYENTE ESTÉRIL PARA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE GOTA EN OJO

Uso Veterinario



APROBADO
SAG

29-05-2024

30 ML

PARA USO EN LAS SIGUIENTES VACUNAS

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Cevac Ceva® Mass L | Reg. SAG: 299-B |
| 2. Cevac Ceva® LT L | Reg. SAG: 371-B |
| 3. Cevac Ceva® BI L | Reg. SAG: 405-B |
| 4. Cevac Ceva® UNI L | Reg. SAG: 1544-B |
| 5. Cevac Ceva® Bron 120 L | Reg. SAG 1662-B |

Usar el contenido completo de una vez

Almacenar entre 5 y 25° C

Contenido: 30 ml para 1000 dosis

Fabricado por Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Company Ltd.,
Hungria.

Importado y distribuido por Ceva Salud Animal Chile SpA
bajo licencia de Ceva Santé Animale, Francia

Serie:

Venc :



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

1. Denominación del producto inmunológico

- a) **Nombre Fantasía:** CEVAC CEVA® BI L
- b) **Nombre Genérico:** Vacuna viva contra Bronquitis Infecciosa, Cepa Mass y Enfermedad de Newcastle, Tipo B1, Cepa B1
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo liofilizado

APROBADO
SAG
29-05-2024

2.- Composición

Cada dosis contiene:

Virus vivo de la Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts B48	$\geq 10^{3.0} \text{EID}_{50}$
Virus de Enfermedad de Newcastle, Cepa Hitchner B1	$\geq 10^{5.5} \text{EID}_{50}$
Excipientes	csp 1 dosis

3.- Propiedades Inmunológicas

Para estimular la inmunidad activa de pollos sanos contra el virus de la Bronquitis Infecciosa, Cepa Massachusetts y contra el virus Newcastle.

4.-Particularidades clínicas:

- a) **Especies de destino y subcategoría:** Aves (pollos, pollas y gallinas)
- b) **Indicaciones de uso**
Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Bronquitis Infecciosa, producida por virus tipo Mass, y Enfermedad de Newcastle, en pollos sanos a partir del 1° día de edad.
- c) **Posología, edad o peso, condición fisiológica, vías de administración y modo de empleo.**
La vacunación primaria debe llevarse a cabo mediante la administración intraocular o por aspersión a partir del primer día de edad.
Se recomienda administrar un refuerzo 3-4 semanas después, mediante agua de consumo.
En las pollas se recomienda un segundo refuerzo a la edad de 10-12 semanas de edad.

Vacunación intraocular:

- Llenar el frasco de la vacuna con el diluyente hasta 3/4 del volumen total para disolver la vacuna liofilizada.
- Verter y diluir la suspensión de la vacuna en el diluyente restante contenido en el frasco plástico, utilizando el cuentagotas.
- Esta preparación de la vacuna debe hacerse con aguja y jeringa estéril.
- 30 mL de diluyente deben alcanzar para administrar 1000 dosis.



- Sostenga el ave por vacunar con la cabeza inclinada hacia un lado.
- Sostenga el frasco plástico con la punta del cuentagotas hacia abajo y presione suavemente los lados, aplicando 0.03 mL (una gota) de vacuna en el ojo del ave. Asegúrese que la vacuna se haya reabsorbido antes de liberar al ave.

Vacunación mediante aspersión:

- Utilizando agua destilada estéril, reconstituir la vacuna como se explicó en el método de administración en gotas intraoculares.
- Es preferible usar una maquina aspersora que funcione bajo presión constante, colocando una boquilla que produzca partículas de tamaño adecuado (según las recomendaciones del fabricante), y graduando la presión para obtener una lluvia gruesa.
- El volumen utilizado varía de 0.2 a 0.3 litros/1000 pollos de días de edad en una caja y de 0.5 a 1 litro por cada 1000 pollos en cama. El volumen puede variar según las condiciones atmosféricas.
- Las aves deben quedar ligeramente mojadas después de la vacunación.
- Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día, apagando la calefacción e interrumpiendo la ventilación.
- Agrupar las aves en el suelo o en cajas. Reduzca la iluminación y fumíguelos a una altura de 20-30 cm sobre sus cabezas.
- Repetir la aspersión una vez más.
- Dejar las aves en reposo durante por lo menos 15 minutos después de la vacunación. Active la ventilación y encienda la calefacción.

APROBADO
SAG
29-05-2024

Vacunación oral (mediante agua de bebida)

- Se recomienda no utilizar desinfectantes en el agua de consumo desde 48 horas antes hasta 24 horas después de la vacunación. Cuando se utilice una bomba de cloro, apagarla durante este mismo periodo de tiempo.
- Los bebederos deben limpiarse completamente antes de utilizarlos para la vacunación. Para la limpieza no deben utilizarse desinfectantes.
- Cerrar el sistema de distribución de agua, levantar y desocupar las líneas dispensadoras o vaciar los bebederos.
- El periodo de retención del agua varia en concordancia con la edad de los pollos por vacunar y las condiciones climáticas (promedio 1.5 horas).
- Preparar únicamente la cantidad de vacuna que se va a utilizar inmediatamente.
- Utilizar únicamente materiales y utensilios de plástico para la preparación y administración de la vacuna.
- Preparar la cantidad requerida de agua que será consumida por las aves en dos horas. Este volumen puede variar, dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales.

Edad	3-4 semanas	Después de 10 semanas
Cantidad mínima de agua para 1000 pollos	25-30 litros	40 litros



- Como ayuda para preservar la actividad del virus, neutralizar el cloro con 2.5 g de leche descremada en polvo por litro de agua.
- No utilizar agua con altas concentraciones de iones metálicos.
- Mezclar la vacuna con agua limpia, fresca y no clorada, abriendo los viales bajo el agua y dejando estabilizar la mezcla durante 10 minutos.
- Abrir el sistema de hidratación cuando cambie el color de agua (azulosa), bajar las líneas y verificar la distribución en todo el galpón.
- Cuando el tanque este vacío, llenarlo con una solución de leche descremada en polvo, dejarlo reposar 10 minutos y abrir el sistema de irrigación para hidratar la solución de la vacuna remanente en las mangueras.
- La suspensión de la vacuna también puede ser distribuida manualmente por los operarios, utilizando recipientes plásticos.

d) Contraindicaciones

No administrar en aves enfermas.

e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico.

Ocasionalmente puede presentarse síntomas respiratorios leves 4 a 6 días después de la vacunación, los cuales desaparecen a los pocos días.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso.

Todas las aves del lote deben ser vacunadas al mismo tiempo.

Administrar la vacuna durante la hora más fresca del día.

Mantener fuera del alcance de los niños

g) Uso durante postura y reproducción

No aplica.

h) Interacciones con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado.

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis.

La administración de diez veces la dosis recomendada es bien tolerada, sin embargo, no se recomienda sobre dosificar.

j) Periodo de resguardo

Cero días

k) Precauciones especiales para el operador.

Evitar el contacto de la vacuna con las mucosas.

Utilizar gafas protectoras para la manipulación de la vacuna, ya que el virus Newcastle puede producir inflamación de los párpados.

Consultar al médico ante cualquiera sintomatología ocular.

**APROBADO
SAG
29-05-2024**



5.- Particularidades farmacéuticas.

a) **Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado**

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico, salvo con el diluyente que forma parte de la vacuna.

b) **Período de eficacia.**

18 meses.

Una vez abierto el frasco utilizar inmediatamente y en su totalidad

c) **Condiciones de almacenamiento.**

Mantener refrigerado: Entre 2 y 8°C. No congelar.

d) **Descripción de los envases.**

Estuche de cartulina impreso. Con 20 frascos de vidrio o plástico, etiquetados, cerrados con tapón de goma butílica y sello de aluminio, conteniendo 1000, 2500 o 5000 dosis. Incluye prospecto interno.

Frasco de polietileno, etiquetado, conteniendo 30 mL de diluyente. Incluye gotario dosificador

e). **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración, si la hubiere:**

Se recomienda disponer los desechos mediante incineración. Producto sin utilizar deben ser devueltos a la empresa importadora.

APROBADO
SAG

29-05-2024

6.- Condición de venta

Venta bajo receta medica veterinaria

7.- Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento, importador, nombre y país de la empresa licenciante, según corresponda

Fabricado por:

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co. Ltd.

1107 Budapest, Szállás u.5, Hungría

Importado y distribuido por:

Ceva Salud Animal Chile SpA

Av. Apoquindo 3669 Of. 801, Las Condes, Santiago – Chile

Bajo licencia de CEVA Sante Animale, Francia

Registro SAG N° 405-B

USO VETERINARIO