

Resumen de Características del Producto Inmunológico

**APROBADO
SAG**
24-02-2021

1. Denominación del producto inmunológico:

- a) **Nombre de fantasía:** Avipro® Salmonella Vac E
- b) **Nombre genérico:** Vacuna viva modificada *Salmonella enteritidis*
- c) **Forma farmacéutica:** Polvo liofilizado para reconstituir suspensión oral

2. Composición:

Cada dosis contiene:

Salmonella enteritidis, Cepa Sm 24/Rif12/Ss..... 1 x 10⁸ - 6 x 10⁸ ufc
Excipientes c.s.p..... 1 dosis

3. Propiedades inmunológicas:

Para estimular la inmunidad activa contra *Salmonella enteritidis*, fagotipo 4.

4. Particularidades clínicas:

a) Especie(s) de destino y subcategoría(s):

Pollas de reemplazo (pollitas futuras reproductoras y futuras ponedoras) y pollos broiler.

b) Indicación(es) de uso:

Inmunización activa, para reducir la colonización del tracto digestivo por *Salmonella enteritidis* y disminuir la excreción de la bacteria.

c) Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía(s) de administración y modo de empleo:

Esquema de vacunación recomendado:

Posología Pollas de Reemplazo	
Primera dosis	1er día de edad
Segunda dosis	6 – 8 semanas de edad
Tercera dosis	16 – 18 semanas de edad (al menos 3 semanas antes de la postura)

Posología Período de descanso	
Primera dosis	Inicio de la pelecha
Segunda dosis	Final de la pelecha

Posología Pollos broiler	
Dosis única	Al primer día de edad

Vía de administración:

Oral, mediante agua de bebida,

Modo de empleo:

- Asegúrese de que todos los conductos de cañerías, tubos, comederos, bebederos, etc., estén completamente limpios y libres de cualquier traza de desinfectantes, detergentes, jabón, etc.
- Abra el frasco de vacuna sumergido en agua y disolver el contenido completamente. La vacuna concentrada es ligeramente viscosa, por lo cual es necesario asegurarse de vaciar el frasco y su tapa completamente, enjuagándolos con agua.
- Después disolver minuciosamente en un jarro de 1 litro y agitar bien antes de efectuar la mezcla con más en una cubeta de 10 litros, previamente a la administración. La vacuna debe ser mezclada bien por varios minutos en cada etapa. No divida los frascos grandes para vacunar a más de un corral o un sistema de bebedero, ya que esto conlleva a errores de mezcla.
- Como guía general, se aplica la vacuna diluida a agua fría y fresca, a razón de 1 litro de agua por cada 1.000 aves por día de edad, es decir, para 1000 pollos de 10 días de vida se necesitarán 10 litros. Se recomienda marcar el nivel de agua consumida del bebedero el día anterior de la aplicación, para determinar con exactitud la cantidad de agua necesaria en cada caso. Para aumentar la estabilidad de la vacuna agregar leche descremada en polvo baja en grasa (es decir, <1% de materia grasa) en una proporción de 2 – 4 gramos por litro de agua o leche descremada (20-40 ml por litro de agua). Toda el agua corriente de las tuberías debe ser vaciada, de modo que los bebederos contengan sólo agua con vacuna.
- El agua de los bebederos debe consumirse antes de la vacunación para que los niveles de agua en estos sean mínimos. Si todavía hay presencia de agua, la tubería debe ser drenada antes de aplicar la vacuna. El agua con vacuna debe aplicarse en un plazo máximo de hasta 4 horas. Debe garantizarse que todas las aves beban durante esta fase. El comportamiento de las aves a beber varía. Puede ser necesario retirar el agua de bebida en algunos sitios antes de la vacunación para garantizar que todas las aves beban durante el período de vacunación. El objetivo es suministrar a cada ave una dosis de la vacuna. A tal efecto, puede ser necesario un período privación de agua de hasta 2-3 horas previas a la vacunación.
- Durante los primeros días de vida son preferibles los bebederos de campana, la utilización de bebederos de boquilla para pollos de un día de edad sólo puede recomendarse si estos se emplean de acuerdo a los reglamentos nacionales.

d) Contraindicaciones:

No vacunar aves enfermas.

No vacunar en aves durante el período de postura.

No vacunar durante las 3 semanas previas al comienzo de la postura.

**APROBADO
SAG****24-02-2021****e) Efectos adversos o reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto inmunológico:**

No se han descrito.

f) Advertencias y precauciones especiales de uso:

La cepa de la vacuna es altamente sensible a las quinolonas y presenta una sensibilidad incrementada a Eritromicina, Cloranfenicol, Doxiciclina, detergentes y agentes patógenos ambientales.

La diferenciación entre la vacuna y las cepas de campo se realiza por medio de un antibiograma. Al contrario que las cepas de campo, la cepa de la vacuna es sensible a Eritromicina (concentración recomendada 15 - 30 ug/ml).

Dependiendo del método analítico utilizado, la vacunación oral puede dar lugar a reacciones seropositivas bajas en aves individuales dentro de una parvada.

Dado que la monitorización serológica de Salmonella es sólo un análisis de la parvada, los hallazgos positivos deben confirmarse, por ejemplo, recurriendo a la bacteriología.
Las aves vacunadas excretan la cepa de la vacuna durante 14 días.
Mantener fuera del alcance de los niños.

g) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

No vacunar durante la postura.

h) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto inmunológico y sus posibles efectos en el animal tratado:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

i) Sobredosis:

No aplica.

j) Período de resguardo:

21 días.

APROBADO
SAG
24-02-2021

k) Precauciones especiales para el operador:

Use guantes cuando reconstituya la vacuna.

Abrir el vial bajo el agua para evitar los aerosoles.

Desinfectar y lavar las manos después de manipular la vacuna.

Evitar el contacto de la vacuna con la cavidad bucal.

Buscar asistencia médica ante la exposición accidental. La cepa de la vacuna es sensible a una serie de antibióticos, incluidas las quinolonas (Ciprofloxacino).

Se debe tener cuidado de lavar y desinfectar las manos después de manipular las heces de aves de corral, especialmente en los siete días después de la primera vacunación de las aves.

Personal con estado de inmunosupresión no deben manipular la vacuna.

5. Particularidades farmacéuticas:

a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado:

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto farmacéutico. El agua utilizada para la dilución de la vacuna debe estar libre de detergentes y desinfectantes.

b) Período de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la reconstitución y/o primera apertura del envase, según corresponda:

Vacuna liofilizada: 24 meses.

Después de reconstituida: 4 horas.

c) Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado, entre 2 - 8°C. No congelar. Proteger de la luz.

d) Descripción de los envases:

Estuche con 10 frascos de vidrio clase I, etiquetados, cerrados con tapón de goma de clorobutilo (tipo I) y sello de aluminio codificado, conteniendo 1.000, 2.000 ó 5.000 dosis. Incluye prospecto interno.

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar y el equipo utilizado para su administración:

Se recomienda incinerar frascos vacíos y toda la vacuna sobrante, así como los utensilios utilizados.

6. Condición de venta:

Venta bajo receta médico veterinaria.

7. Nombre y dirección completa de la empresa fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante:

Fabricado por:

Lohmann Animal Health GmbH.
Heinz-Lohmann Strasse 4
27472 Cuxhaven, Alemania

Importado y distribuido por:

Elanco Chile SpA.
Rosario Norte 615 of. 1502, piso 15
Las Condes, Santiago, Chile.
Tel.: 800 100 212

Bajo licencia de:

Elanco Animal Health Inc., USA.



24-02-2021

USO VETERINARIO

Reg. SAG N°: 2155-B