


FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA

Conceptos previos

Rodrigo Alcaraz de la Osa



Números de oxidación/de carga

Los **números de oxidación** (números romanos) están relacionados con la **capacidad** de un determinado **elemento** para **ceder** (nº oxidación **positivo**) o **captar electrones** (nº oxidación **negativo**). En el caso de **compuestos iónicos**, podemos también utilizar los **números de carga** (números arábigos seguidos de un signo).

1																	18
1	1															2	
2	3	4															10
3	11	12															18
4	19	20															36
5	37	38															54
6	55	56															86
7	87	88															118

NÚMEROS DE OXIDACIÓN/DE CARGA																	
Z		SINTÉTICOS															
Símbolo		Números															
de oxidación/		de carga															

13	14	15	16	17	
5	6	7	8	9	
B	C	N	O	F	
III	II IV	3- I II III IV V	1-2- II	1- I	
13	14	15	16	17	
Al	Si	P	S	Cl	
3+	IV	3- I III V	2- II IV VI	1- I III V VII	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	
3+	2+ 3+ 4+	2+ 3+ 4+ 5+	2+ 3+ VI	2+ 3+ 4+ VI VII	2+ 3+	2+ 3+	2+ 3+	1+ 2+	2+	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	
3+	4+	2+ 3+ 4+ 5+	4+ VI	VII	2+ 3+ 4+	3+ 4+	2+ 4+	1+	2+	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	
3+	4+	5+	4+ VI	3+ 4+ 5+ VI VII	2+ 3+ 4+ VIII	3+ 4+	2+ 4+	1+ 3+	1+ 2+	
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	
Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
3+	3+ 4+	3+ 4+	3+	3+	2+ 3+	2+ 3+	3+	3+ 4+	3+	3+	3+	2+ 3+	2+ 3+

89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No
3+	4+	4+ V	3+ 4+ VI	4+ V	3+ 4+ V VI								

METALES ALCALINOS

METALES ALCALINOTÉRREOS

LANTANOIDES

ACTINOIDES

METALES DE TRANSICIÓN

OTROS METALES

SEMIMETALES


NO METALES

GASES NOBLES

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA

Recomendaciones de la IUPAC de 2005

Rodrigo Alcaraz de la Osa



Óxidos E₂O_n

Compuestos binarios formados por un **elemento** (E), con nº de oxidación n, y **oxígeno**.

PREFIJO + ÓXIDO + DE + PREFIJO (meno=) + ELEMENTO

ÓXIDO + DE + ELEMENTO + (Nº OXIDACIÓN) (números romanos) ° (Nº CARGA) (números arábigos)

FÓRMULA	NOMBRE COMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICO	NOMBRE CON NÚMERO DE OXIDACIÓN/DE CARGA
Na ₂ O	monóxido de disodio	óxido de sodio
TiO ₂	dióxido de titanio	óxido de titanio(4+)
SO ₃	trióxido de azufre	óxido de azufre(VI)
OF ₂	difluoruro de oxígeno	

Peróxidos M₂(O₂)_n

Compuestos binarios formados por un **metal** (M), con nº de oxidación n, o **hidrógeno**(1+), unidos al **anión peróxido** O₂²⁻.

PERÓXIDO + DE + ELEMENTO + (Nº OXIDACIÓN) (números romanos) ° (Nº CARGA) (números arábigos)

FÓRMULA	NOMBRE
H ₂ O ₂	peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)
Na ₂ O ₂	peróxido de sodio
MgO ₂	peróxido de magnesio
Fe ₂ (O ₂) ₃	peróxido de hierro(3+)

Hidruros EH_n

Compuestos binarios formados por un **elemento** (E), con nº de oxidación n, e **H**.

PREFIJO (meno=) + HIDRURO + DE + ELEMENTO

HIDRURO + DE + ELEMENTO + (Nº OXIDACIÓN) (números romanos) ° (Nº CARGA) (números arábigos)

FÓRMULA	NOMBRE COMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICO	NOMBRE CON NÚMERO DE OXIDACIÓN/DE CARGA
LiH	monohidruro de litio	hidruro de litio
AlH ₃	trihidruro de aluminio	hidruro de aluminio
HCl	cloruro de hidrógeno	
H ₂ S	sulfuro de dihidrógeno	

Hidruros progenitores

FÓRMULA	NOMBRE	FÓRMULA	NOMBRE	FÓRMULA	NOMBRE
BH ₃	borano	CH ₄	metano	NH ₃	azano (amoniaco)
AlH ₃	alumano	SiH ₄	silano	PH ₃	fosfano
GaH ₃	galano	GeH ₄	germano	AsH ₃	arsano
InH ₃	indigano	SnH ₄	estannano	SbH ₃	estibano
TlH ₃	talano	PbH ₄	plumbano	BiH ₃	bismutano
H ₂ O	oxidano (agua)	H ₂ S	sulfano	HCl	clorano

Hidróxidos o bases M(OH)_n

Formados por un **metal** (M), con nº de oxidación n, y el grupo **hidroxi** OH⁻.

PREFIJO (meno=) + HIDRÓXIDO + DE + ELEMENTO

HIDRÓXIDO + DE + ELEMENTO + (Nº OXIDACIÓN) (números romanos) ° (Nº CARGA) (números arábigos)

FÓRMULA	NOMBRE COMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICO	NOMBRE CON NÚMERO DE OXIDACIÓN/DE CARGA
NaOH	monohidróxido de sodio	hidróxido de sodio
Ca(OH) ₂	dihidróxido de calcio	hidróxido de calcio
Cr(OH) ₃	trihidróxido de cromo	hidróxido de cromo(3+)
Pt(OH) ₄	tetrahidróxido de platino	hidróxido de platino(4+)

Oxácidos H_aX_bO_c

Compuestos ternarios formados por **hidrógeno**(1+), un **elemento central**, X, y **oxígeno**(2-). **X** puede ser un **no metal** o un **metal** en **estado de oxidación alto**, como el **cromo**(VI) o el **manganeso**(VI) y el **manganeso**(VII).

Ácidos modelo

FÓRMULA	Nº OXIDACIÓN X	NOMBRE <i>VULGAR</i>	TRANSFORMACIÓN
HClO ₄	VII	ácido perclórico	
HClO ₃	V	ácido clórico	Cl → Br, I
HClO ₂	III	ácido cloroso	
HClO	I	ácido hipocloroso	
H ₂ SO ₄	VI	ácido sulfúrico	S → Se, Te
H ₂ SO ₃	IV	ácido sulfuroso	
HNO ₃	V	ácido nítrico	
HNO ₂	III	ácido nitroso	
H ₂ CO ₃	IV	ácido carbónico	

Ácidos de Cr y Mn

FÓRMULA	Nº OXIDACIÓN X	NOMBRE (HIDRÓGENO)
H ₂ CrO ₄	VI	dihidrogeno(tetraoxidocromato)
H ₂ MnO ₄	VI	dihidrogeno(tetraoxidomanganato)
HMnO ₄	VII	hidrogeno(tetraoxidomanganato)

Ácidos meta y orto

ELEMENTO	ÁCIDO META	ÁCIDO+1 H ₂ O	ÁCIDO ORTO (+2 H ₂ O)
B	HBO ₂	H ₃ BO ₃ (ácido bórico)	–
Si	H ₂ SiO ₃	H ₄ SiO ₄ (ácido silícico)	–
P	HPO ₃	H ₃ PO ₄ (ácido fosfórico)	–
I	–	–	H ₅ IO ₆
Te	–	–	H ₆ TeO ₆

Ácidos di, tri, etc.

n moléculas de ácido pueden condensar perdiendo *n* – 1 de agua.

H₄P₂O₇ → ác. difosfórico; H₂Cr₂O₇ → dihidrogeno(heptaoxidodicromato).

Sales

Sales neutras binarias X_nY_m

Formadas por **dos elementos cualesquiera** (salvo H y O), X e Y, con nº de oxidación m y n, respectivamente. El elemento que está a la derecha se **termina en –uro** al nombrarse.

FÓRMULA	NOMBRE COMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICO	NOMBRE CON NÚMERO DE OXIDACIÓN/DE CARGA
NaCl	monocloruro de sodio	cloruro de sodio
MgF ₂	difluoruro de magnesio	fluoruro de magnesio
FeS	monosulfuro de hierro	sulfuro de hierro(2+)
NBr ₃	tribromuro de nitrógeno	bromuro de nitrógeno(III)

Sales neutras ternarias u oxisales M_a(X_bO_c)_n

Compuestos ternarios formados por un **metal**, M, con nº de oxidación n, un **elemento central**, X, y **oxígeno**(2-). **Derivan de oxácidos** sustituyendo todos los átomos de H por M y cambiando las terminaciones *ico* y *oso* de los ácidos por *ato* e *ito*, respectivamente.

FÓRMULA	ÁCIDO	SAL
NaClO	HClO (ác. hipocloroso)	hipoclorito de sodio
Fe ₂ (SO ₄) ₃	H ₂ SO ₄ (ác. sulfúrico)	sulfato de hierro(3+)
Ca ₃ (PO ₄) ₂	H ₃ PO ₄ (ác. fosfórico)	fosfato de calcio
BaCO ₃	H ₂ CO ₃ (ác. carbónico)	carbonato de bario

Sales ácidas M_a(H_bX_cO_d)_n

Compuestos cuaternarios formados por un **metal**, M, con nº de oxidación n, **hidrógeno**(1+), un **elemento central**, X, y **oxígeno**(2-). **Derivan de oxácidos** sustituyendo parte de los átomos de H por M. Se nombran utilizando la **nomenclatura de hidrógeno**, cambiando las terminaciones *ico* y *oso* de los ácidos por *ato* e *ito*, respectivamente.

FÓRMULA	ÁCIDO	SAL
Fe(HSO ₃) ₂	H ₂ SO ₃ (ác. sulfuroso)	hidrogenosulfito de hierro(2+)
NH ₄ H ₂ PO ₄	H ₃ PO ₄ (ác. fosfórico)	dihidrogenofosfato de amonio
NaHCO ₃	H ₂ CO ₃ (ác. carbónico)	hidrogenocarbonato de sodio
KH ₂ BO ₃	H ₃ BO ₃ (ác. bórico)	dihidrogenoborato de potasio

Iones

Cationes

FÓRMULA	NOMBRE	FÓRMULA	NOMBRE	FÓRMULA	NOMBRE
H ⁺	hidrógeno(1+)	Cu ⁺	cobre(1+)	Cu ²⁺	cobre(2+)
Cr ³⁺	cromo(3+)	H ₃ O ⁺	oxonio	NH ₄ ⁺	amonio

Aniones

FÓRMULA	NOMBRE	FÓRMULA	NOMBRE	FÓRMULA	NOMBRE
H ⁻	hidruro	H ₂ PO ₃ ⁻	dihidrogenofosfito	S ²⁻	sulfuro
ClO ₄ ⁻	perclorato	HCO ₃ ⁻	hidrogenocarbonato	NO ₃ ⁻	nitrato
O ²⁻	óxido	H ₂ BO ₃ ⁻	dihidrogenoborato	SO ₃ ²⁻	sulfito
CrO ₄ ²⁻	cromato	Cr ₂ O ₇ ²⁻	dicromato	MnO ₄ ⁻	permanganato

https://rodrigoalcarazdelaosa.me/