


LA MATERIA

Rodrigo Alcaraz de la Osa

2º ESO - 3º ESO



Propiedades generales: masa y volumen

Materia Todo lo que tiene **masa** y ocupa un **volumen**.

Sistema material Porción de materia confinada en una región del espacio.

Sustancia Forma de materia que tiene una composición química y unas propiedades características determinadas.

La **masa** y el **volumen** son **propiedades generales** de la materia, lo que significa que no nos permiten distinguir una sustancia de otra.

Masa

Es la **cantidad** de materia que tiene un objeto o sistema material.

En el SI se mide en kg.

Volumen

Es el **espacio** que ocupa un objeto o sistema material.

En el SI se mide en m³, aunque también se puede medir en L (1 m³ = 10³ L).

Propiedades específicas: densidad

Las **propiedades específicas** o **características** de la materia son aquellas que nos permiten distinguir una sustancia de otra.

Densidad

La **densidad** d de un objeto se define como la relación (cociente) entre su masa m y su volumen V :

$$d = \frac{m}{V}$$

En el SI se mide en kg/m³.

Ejemplo

El etanol tiene una densidad de 0.79 g/cm³. Calcula la masa contenida en una botella de medio litro.

Solución

Lo primero que tenemos que hacer es **homogeneizar** las unidades. Podemos convertir el volumen, 0.5 L, en cm³:

$$0.5 \text{ L} \cdot \frac{1 \text{ dm}^3}{1 \text{ L}} \cdot \frac{10^3 \text{ cm}^3}{1 \text{ dm}^3} = 500 \text{ cm}^3$$

A partir de la expresión de la densidad, podemos **despejar** la **masa**:

$$d = \frac{m}{V} \rightarrow m = V \cdot d = 500 \text{ cm}^3 \cdot 0.79 \text{ g/cm}^3 = 395 \text{ g} = 0.395 \text{ kg}$$

Estados de agregación

Los tres principales **estados de agregación** en los que podemos encontrar a la materia son:


Sólido Volumen y forma fijos. No se pueden comprimir ni fluir por sí mismos.

Líquido Volumen fijo, forma variable. Poco compresibles. Pueden fluir.

Gaseoso Volumen y forma variables. Se comprimen y fluyen fácilmente.

Cambios de estado

La materia puede **cambiar** de **estado** al **variar** la **presión** o **temperatura**, permaneciendo su masa constante mientras que su volumen varía. Además, **durante** un **cambio** de **estado** la **temperatura** permance **constante**.



Las **temperaturas** (o puntos) de **fusión** y **ebullición** (ambas aumentan con la presión) son, al igual que la densidad, **propiedades características** de la materia.

Modelo cinético-molecular

Sus **postulados** son:

- La **materia** está **formada** por **partículas** muy pequeñas, entre las que no existe nada (vacío).
- Existen **fuerzas** de **atracción** que mantienen unidas a las partículas.
- Las partículas están en **continuo movimiento**, siendo la **temperatura** una medida de la velocidad media a la que se mueven (a mayor temperatura mayor velocidad).




Figura 1. En un **sólido** la **interacción** entre las partículas es muy **fuerte**, y éstas están **vibrando**.




Figura 2. En un **líquido** la **interacción** entre las partículas es **intermedia**, y éstas además de **vibrar** pueden **rotar** y **moverse** ligeramente.



Figura 3. En un **gas** las partículas **apenas interactúan** entre sí y éstas se **mueven aleatoriamente** en todas las direcciones.

Mezclas

Al mezclarse dos o más sustancias distintas, no se obtiene una nueva sustancia, ya que las sustancias que forman la mezcla **conservan** sus **propiedades** y **pueden separarse** mediante procedimientos físico-químicos.

Tipos

Homogéneas Aquellas en las que **no** es posible distinguir sus componentes a simple vista.

Heterogéneas Aquellas en las que **sí** es posible distinguir sus componentes a simple vista.

Disoluciones

Son un buen ejemplo de **mezclas homogéneas**, cuyos componentes pueden ser tanto sólidos, líquidos o gases. En una **disolución** distinguimos dos **componentes**:

Soluto El componente que está en menor proporción.

Disolvente El componente que está en mayor proporción.

Podemos expresar la **concentración** de una disolución de varias formas distintas, entre ellas:

g/L Expresa el número de gramos de soluto por cada litro de disolución:

$$c \text{ (g/L)} = \frac{m_{\text{soluto}} \text{ (g)}}{V_{\text{disolución}} \text{ (L)}}$$

% en masa Expresa el número de gramos de soluto por cada 100 g de disolución:

$$c \text{ (% } m) = \frac{m_{\text{soluto}}}{m_{\text{soluto}} + m_{\text{disolución}}} \times 100$$

% en volumen Expresa el número de litros de soluto por cada 100 L de disolución:

$$c \text{ (% } V) = \frac{V_{\text{soluto}}}{V_{\text{soluto}} + V_{\text{disolución}}} \times 100$$

Métodos de separación

Decantación Método **físico** para separar mezclas **heterogéneas** de líquidos y sólidos no solubles (suspendidos) o de líquidos no miscibles de **diferente densidad** (con un embudo de decantación).

Filtración Método **físico** para separar mezclas **heterogéneas** de líquidos y sólidos no solubles a través de un medio poroso, llamado tamiz, criba, cedazo o **filtro**.

Destilación Método **físico** para separar mezclas de líquidos con **distinto punto de ebullición**.




Figura 4. Imagen de [OpenClipart-Vectors](#) en [Pixabay](#).

Cristalización Método **químico** para separar mezclas **homogéneas**, como sólidos disueltos en líquidos.