



ÁCIDO-BASE

Química 2º Bach

Rodrigo Alcaraz de la Osa



Teorías ácido-base

Teoría de Arrhenius

Propuesta por el sueco SVANTE ARRHENIUS en 1884, constituye la primera definición moderna de ácidos y bases en términos moleculares:

Ácido Sustancia que se disocia en agua formando cationes hidrógeno (H^+).

Base Sustancia que se disocia en agua formando aniones hidróxido (OH^-).

Teoría de Brønsted-Lowry

Propuesta en 1923 independientemente por el danés JOHANNES NICOLAUS BRØNSTED y el inglés MARTIN LOWRY, se basa en la idea de PARES DE ÁCIDO-BASE CONJUGADOS. Cuando un ácido, HA, reacciona con una base, B, el ácido forma su base conjugada, A^- , y la base forma su ácido conjugado, HB^+ , mediante el intercambio de un protón (catión H^+):



Ácido Sustancia capaz de ceder protones (H^+): $HA \rightleftharpoons A^- + H^+$.

Base Sustancia capaz de aceptar protones (H^+): $B + H^+ \rightleftharpoons HB^+$.

Esta teoría se considera una GENERALIZACIÓN de la teoría de ARRHENIUS.

Fuerza relativa de los ácidos y bases

En función de cuan ionizado/a o disociado/a se encuentre un ácido o una base, distinguimos entre **ácidos/bases fuertes y débiles**, términos que describen la **facilidad** para **conducir** la **electricidad** (gracias a la mayor o menor presencia de iones en la disolución).

Grado de ionización

También llamado GRADO DE DISOCIACIÓN, α , se define como el cociente entre la cantidad de ácido/base ionizado/a y la cantidad de ácido/base inicial:

$$\alpha = \frac{\text{cantidad de ácido/base ionizado/a}}{\text{cantidad de ácido/base inicial}}$$

Suele expresarse en tanto por ciento (%).

Ácidos y bases fuertes Totalmente ionizados/as ($\alpha \approx 1$). Conducen bien la electricidad.

- Ácidos: $HClO_4$, $HI(ac)$, $HBr(ac)$, $HCl(ac)$, H_2SO_4 y HNO_3 .
- Bases: Hidróxidos de metales alcalinos y alcalinotérreos.

Ácidos y bases débiles Parcialmente ionizados/as: $\alpha < 1$. Conducen mal la electricidad.

- Ácidos: $HF(ac)$, $H_2S(ac)$, H_2CO_3 , H_2SO_3 , H_3PO_4 , HNO_2 y ácidos orgánicos, como el CH_3COOH .
- Bases: NH_3 , NH_4OH y bases orgánicas nitrogenadas, como aminas.

Constante de disociación

Es una medida de la FUERZA de un ÁCIDO/BASE en disolución:

	ÁCIDO	BASE
EQUILIBRIO	$HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$	$B + H_2O \rightleftharpoons HB^+ + OH^-$
CONSTANTE	$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}$	$K_b = \frac{[HB^+][OH^-]}{[B]}$
COLOGARITMO	$pK_a = -\log K_a$	$pK_b = -\log K_b$

Equilibrio iónico del agua

El **agua** es una sustancia **anfiprótica** (puede tanto donar como aceptar un protón H^+), lo que le permite actuar tanto como ácido o como base (**anfoterismo**). El **equilibrio iónico del agua** hace referencia a la reacción química en la que dos moléculas de agua reaccionan para producir un ion **oxonio** (H_3O^+) y un ion **hidróxido** (OH^-):



La constante de equilibrio, denominada **producto iónico del agua**, y denotada por K_w , puede aproximarse por el producto:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-]$$

A 25 °C:

$$[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ M} \Rightarrow K_w = 10^{-14}$$

Relación entre K_a y K_b

Dado un ácido, HA, y su base conjugada, A^- , podemos multiplicar K_a y K_b :

$$K_a \cdot K_b = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]} \cdot \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]} = [H_3O^+][OH^-] = K_w,$$

por lo que (suponiendo $T = 25^\circ\text{C}$):

$$K_a \cdot K_b = K_w = 10^{-14}$$
$$pK_a + pK_b = pK_w = 14$$

Concepto de pH

Se define el pH como el cologaritmo de la concentración de iones oxonio, H_3O^+ :


$$pH = -\log [H_3O^+]$$

Análogamente se define el pOH en función de la concentración de iones hidróxido, OH^- :

$$pOH = -\log [OH^-]$$

A partir de la expresión del **producto iónico del agua**, K_w , tomando **logaritmos**:


$$[H_3O^+][OH^-] = K_w$$
$$\log [H_3O^+] + \log [OH^-] = \log K_w$$
$$-pH - pOH = -14$$
$$pH + pOH = 14$$



Traducida y adaptada de <https://www.coursehero.com/sg/cell-biology/ph-and-the-ph-scale/>.

Volumetrías de neutralización ácido-base

Una **valoración/titulación** es un método de análisis químico cuantitativo para determinar la concentración de un ácido o base identificado (**analito**), neutralizándolo exactamente con una disolución estándar de base o ácido de concentración conocida (**valorante**). Se utiliza un **indicador** de pH para controlar el progreso de la reacción ácido-base.



Traducida de <https://www.coursehero.com/sg/general-chemistry/quantitative-analysis-of-acids-and-bases/>.

Curva de valoración/titulación de 25 mL de ácido acético 0.1 M con hidróxido de sodio 0.1 M.

Indicadores ácido-base

Un **indicador** de pH es un compuesto químico *halocrómico* (cambia de color —*vira*— ante cambios de pH) que se añade en pequeñas cantidades a una disolución para poder determinar visualmente su pH (acidez o basicidad). El cambio de color se denomina **viraje**.

Tornasol

Mezcla soluble en agua de diferentes colorantes extraídos de LÍQUENES. Absorbido en papel de filtro constituye uno de los indicadores de pH más antiguos utilizados (~ 1300).

$$pH < 4.5 \quad \text{4.5} \quad \rightleftharpoons \quad \text{8.3} \quad pH > 8.3$$

Naranja de metilo ($C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$)

Colorante *azoderivado* que vira de rojo a naranja-amarillo en MEDIO ÁCIDO:

$$pH < 3.1 \quad \text{3.1} \quad \rightleftharpoons \quad \text{4.4} \quad pH > 4.4$$

Fenolftaleína ($C_{20}H_{14}O_4$)

Indicador de pH incoloro en medio ácido que vira a rosa en MEDIO BÁSICO:

$$pH < 8.3 \quad \text{8.3} \quad \rightleftharpoons \quad \text{8.3} \quad 8.3 < pH < 10$$

Indicador universal

MEZCLA DE INDICADORES (azul de timol, rojo de metilo, azul de bromotimol y fenolftaleína) que presenta cambios suaves de color en una amplia gama de valores de pH.

RANGO DE pH	< 3	3–6	7	8–11	> 11
MEDIO	ácido fuerte	ácido débil	neutro	base débil	base fuerte
COLOR	rojo	naranja/amarillo	verde	azul	violeta




ÁCIDO-BASE

Química 2º Bach

Rodrigo Alcaraz de la Osa



Hidrólisis de sales




Cuando una sal se disuelve en agua, se disocia en sus **iones**. Si estos iones son capaces de reaccionar con las moléculas de agua y formar ácidos o bases conjugados, decimos que se produce una reacción de **hidrólisis**.

Traducida y adaptada de

<https://www.coursehero.com/sg/general-chemistry/solutions-are-in-equilibrium/>.

Sales de ácido fuerte y base fuerte


Cuando los iones en los que se disocia una sal provienen de ácidos/bases fuertes, no reaccionan con agua (hidrolizan), pues tienden a estar completamente ionizados:



La DISOLUCIÓN resultante es NEUTRA (pH = 7).

Sales de ácido débil y base fuerte


En este caso el ion proveniente del ácido débil sí se hidroliza:



La DISOLUCIÓN resultante es BÁSICA (pH > 7).

Sales de ácido fuerte y base débil


En este caso el ion proveniente de la base débil sí se hidroliza:



La DISOLUCIÓN resultante es ÁCIDA (pH < 7).

Sales de ácido débil y base débil

En este caso ambos iones se hidrolizan:




$K_a > K_b \Rightarrow$ La DISOLUCIÓN resultante es ÁCIDA (pH < 7).

$K_b > K_a \Rightarrow$ La DISOLUCIÓN resultante es BÁSICA (pH > 7).

Disoluciones reguladoras

También llamadas **disoluciones amortiguadoras** o **tampón**, contienen concentraciones notables, sin exceso, de ácido o base débil y su conjugado correspondiente. Mantienen el pH de una disolución frente a pequeñas adiciones de ácido o base a la misma gracias a la neutralización del exceso de iones H_3O^+ o OH^- .

Tampón ácido débil + base conjugada



A partir de la expresión de la constante de acidez K_a :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]},$$

podemos despejar la concentración de iones oxonio, H_3O^+ :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \cdot \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

Tomando logaritmos y cambiando de signo:


$$-\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log K_a - \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a - \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{base conjugada}]}{[\text{ácido}]}$$

expresión que se conoce como ECUACIÓN DE HENDERSON-HASSELBALCH.

Tampón base débil + ácido conjugado



A partir de la expresión de la constante de basicidad K_b :

$$K_b = \frac{[\text{HB}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]},$$

podemos despejar la concentración de iones hidróxido, OH^- :




$$[\text{OH}^-] = K_b \cdot \frac{[\text{B}]}{[\text{HB}^+]}$$

Tomando logaritmos y cambiando de signo llegamos a otra forma de la ECUACIÓN DE HENDERSON-HASSELBALCH:


$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \log \frac{[\text{ácido conjugado}]}{[\text{base}]}$$

Importancia biológica del pH

Tampón $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ Regula el pH de la SANGRE $\rightarrow \text{pH} = 7.40 \pm 0.05$:





Tampón $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ Regula el pH en el INTERIOR de las CÉLULAS $\rightarrow \text{pH} \approx 6.86$:




Ácidos y bases relevantes

A nivel industrial

Ácido sulfúrico (H_2SO_4) El compuesto químico más producido del mundo, obtenido a base de hidratar SO_3 concentrado previamente del SO_2 . Su principal uso es para crear ácido fosfórico que a su vez se emplea en FERTILIZANTES.




Ácido nítrico (HNO_3) Empleado en la producción de abonos, explosivos y colorantes:




A nivel de consumo


Ácido acético (CH_3COOH) Presente en el vinagre, aunque principalmente usado en la fabricación de FIBRAS TEXTILES.



Amoníaco (NH_3) Empleado principalmente en la producción de FERTILIZANTES.



Hidróxido de sodio (NaOH) Empleado sobretodo en la fabricación de papel, tejidos y agentes de limpieza.



Problemas medioambientales

Lluvia ácida Causada por la emisión de ÓXIDOS DE AZUFRE Y NITRÓGENO, que, en contacto con el agua, forman ÁCIDO SULFÚRICO y ÁCIDO NÍTRICO, entre otros:

Óxidos de azufre (SOx)	Óxidos de nitrógeno (NOx)
$\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$	$3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$
$\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$	

Se considera lluvia ácida si pH < 5.5. Sus principales EFECTOS son:

- Acidificación de aguas (ríos/lagos) y suelos.
- Deterioro del patrimonio histórico (ataca rocas calizas, a base de CaCO_3).

Algunas SOLUCIONES serían:

- Sustituir combustibles fósiles por energías renovables.
- Uso de catalizadores en vehículos.
- Adición de un compuesto alcalino en ríos y/o lagos para neutralizar su acidez.
- Tratamiento de monumentos con recubrimientos adecuados, como el $\text{Ba}(\text{OH})_2$, que reaccionan con el ácido sulfúrico formando BaSO_4 , evitando la erosión.

Esmog Proveniente de la contracción de *SMOKE* y *FOG*, se refiere a una contaminación atmosférica debida sobretodo a ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx), AZUFRE (SOx), OZONO (O_3), humo y otras partículas. Se considera un problema derivado de la industrialización moderna, aunque es más común en ciudades con climas cálidos, secos y mucho tráfico.

EFECTOS:

- La presencia de ozono y óxidos de nitrógeno y azufre causa problemas respiratorios, especialmente en ancianos y niños/as.

Algunas de las SOLUCIONES propuestas son:

- Reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles.
- Reducir la contaminación.